




Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3990/A






Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3990/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3990/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3990/A

A, 10
12

Index
-
Medical
History

3990/A

A xxxiv. Mai

K₁₉¹³

APHORISMI,

RABI MOY.

SIS MEDICI ANTI-
 QVISSIMI AC CELEBERRI-
 MI, EX GALENO MEDICORVM
 principe collecti: nunc uerò ad usum
 studioforum Medicinæ ab interia
 tu uindicati, & iam primùm
 in lucem editi.

I T E M,

LOCORVM QVORVNDAM A-
 pud Galenum sibiipsis contradicen-
 tium castigatio & notatio:

N


DENIQVE,

IOANNIS DAMASCENI A-
 phorismi: utilissimi ad Filium.

Cum INDICE omnium rerum notatu dis-
 gnarum locupletissimo: v. p. v.

Cum Gratia & Privilegio. Cæs. Maiest.

BASILEAE, EX OFFICIN-
 A HENRICI PETRINI



Lectori S.



Oc opusculum
(Lector) cum
quidē per se iā
utile, tum uerò
tibi multò utili
us utriusq; au-
thoris sui nomen meritò iam o-
lim reddidit. Quòd Galeni prī-
cipis inuentum Rabi Moyſis di-
ſpoſitio tota ſit: quorū ille quī-
dem Græcus Pergamenus, hic
Arabs Cordubensis, uterque
πολλῶν ἀντάξι & ἄλλων, ὅς μάλιστα πολλὰ
πλάγχθη, ὅς πολλῶν ἀνθρώπων ἰδεῖν σῶμα
κατὰ τὸ νόσον ἔγω. Habet enim sum-
mi illius uiri definitas ſententi-
as, quas Ἀφορισμοὺς appellamus,
quaſi deciſiones quaſdam, & a-
reſta totius Medicinæ, ex quina
a a que

P R A E F A T I O.

que ingentibus eius uoluminibus ab hoc Moyse, homine paulò inferioris ætatis, sed non minoris fortasse doctrinæ, & quod maius est christianæ, aut certè legis diuinæ perito (quod ex 25. Sectione prospicies, ubi aduersus Galenum pro Moyse Legis diuinæ latore disputat) in fasciculū congestas, ac uiginti quinque summis capitibus, seu locis communibus digestas: quas cū multos iam annos intermissas ob rudioris ac minus politæ dictionis fastidium, boni hi uiri uiderent, utilitati medicorum cōsulescentes, poliendū ita & stylo, & typis curarūt, ut uides, quod utinā ex eorum uoto & animi tui sententia succedat. Vale.

V O.

VOCES BARBARAE IN
hoc libro propriè redditæ.

Aqua, morbus oculi, Hypo-
chyma.

Aqua hordei, Ptissana,

Aqua cum Melle, Melicratum uel
Mulsa.

Argihuen, marina purpura.

Barrachalis, Nitrosus.

Bunduchæ, Ponticæ.

Baruli, tumoris genus.

Bolismus, uoluulosus morbus.

Brodium, iusculum.

Clausura meatuum, styptatio.

Cauda soricina, *μύρπος*, pulsus immi-
nutus.

Consolidatio auri, Chrysocolla.

Chordæ, Tendones.

Crocum Aphricanum, Cnicum.

Cortices mali granati, malicorium.

Cortex æris, Squama æris.

Dumbeletus, abscessus.

Darlini, Calamyntha. al. Cynamo-
mum, al. Garyophyllas.

Ederula, Rubus.

a 3

Elle

Elleborum, ueratrum.

Far hordei, alica, al. ptissana,
Ficia, Cucurbita.

Formicæ, herpetes.

Fluctuatio, afflictio.

Gurgulatio, fluctuatio.

Gargarismus, Apophlegmatismus.

Galea, morbus capitis, Caros.

Ganeanangane, Gangrena.

Galea & Cheude, } Cephalea.

} Cephalalgia.

{ Vuae, cum fluit
sanguis.

Hemorrhoides, { Morales, sangui-
ne & cholera ru-
bicunda.

{ Verrucales, cum
fluit Melancho-
lia.

Hydropisis utria, ἀσχιζης.

Herma tobalia, Epiplocele.

Iectigatio, Palpitatio cordis.

Interpolata febris, Intermittens.

Lutum lentici, Propolis.

Lacertus, Musculus.

Mundificare, detergere.

Malum

Malum granatum, punicum.
Mentastrum, oryganum.
Meri, œsophagus.
Mefera, ulceris genus.
Mel aërium, manna.
Medicina consolitativa, Glutinato-
rium medicamen.
Medicina, porosa, Rarefaciens, Vol-
uulas Mercurialis herba.
Mirachia, Melancholia, Hypochon-
driaca.
Malus spiritus, *συννοία*, difficilis re-
spiratio.
Nucha, Spinalis medulla.
Nigellum, Melanthium.
Nascentia, Sinus.
Narcotica, Stupefacientia.
Olibanum, Thus.
Orobi farina, Erni far.
Oleum Cydoniorum, Melinum.
Porisaccoeides, Callus.
Pori pectoris, obstructio.
Petia lenis, linteum rarum.
Permixtio mentis, delirium.
Rubea, Erysipelas.
Rosea, Chymolis.

Reticula, Retiformis plexus.
 Reaptatum, Corroboratum.
 Siphac, Peritoneum, al. Tunica,
 membrana.
 Scrofa, Struma χοῖρα, Paristhmia.
 Saltus, ulcerosus sensus, concussio.
 Subasseila, Ala.
 Scissura, Coxendix, Ischias.
 Secanabis, Oxymeli.
 Saphena, Vena malleoli.
 Secacules, Spacelos, ut sideratio.
 Syphac corneum, Tunica oculi cor-
 nea.
 Syphac intest. Tunicae χιτῶν.
 Sisimbrium, Serpillum uel Spondy-
 lium.
 Sagine, Collium al. Panicum.
 Selicha, Melicratum.
 Schia, Coxendix, Ischias.
 Serapinum, inagapenum.
 Terra Francigena, Misij.
 Thuris farina, Thuris manna.
 Tornacinus, Reciprocus.
 Tinea, Achores.
 Tyria, Ophrasis.
 Theenia, Arabia.

Vitreo.

Vitreolum, Chalcitis.
Viuum racham, fuluum uel fla-
uum.

Vena pulsabilis, Arteria.

Vena non pulsabilis, Vena.

Zarbus, Omentum.

LIBRORVM CITATIO

nes Barbae.

- 2 Anatonis uiuorum. 7. de Placia-
ris Philos.
1 2 Pulsuum. 4. de Causis pulsuū.
Lib. Ingenij. Methodi.
Lib. Scientiarum. De locis af-
fect.
Lib. Miermiæ. De Comp. se-
cundum loca.
Mitro pulsuum. Introduct. ad
pulsuum cogn.
1 6 Depulsibus. 4. De Præcog-
nit. ex pulsibus.
5 Morb. & accid. 3. De Causis
symptomatum.

a 5

5 Ch

5 Ciborum. 1. De alimentis.
2 Megapuls. 2. De differentijs
puls.
Consilium sanitatis. De Sa/
nitate Tuenda.

F I N I S.

INDEX COPIO-

SISSIMVS AC DILIGEN-

tissimus, omnium rerum ac Vocabulo-
rum, morborum, curationum, herbarū,
aliarumq; rerum notatu dignissima-
rum in librum Aphorismo-
rum, Rabi Moylis.

A

A Bolita appetē-
tia quid 467

Abortus unde 353

Abortus causæ 354

Abortus duo putrefa-
cti 480

Abscessus 448.449

abscessus quomodo fi-
ant 59

abscessuum pro contē-
torum qualitate cura-
tio 329

abscessib. internis quæ
conueniant 229

abscessibus qualia ali-
quando insint corpo-
ra 63

in Abscessibus corpo-
ra animalibus similia
reperiri 477

abstergentia sine acri-
monia 422

abstinentia ad quid u-
tilis 155.359.385

abstinentiam aliquan-
do prodesse, aliquan-
do nocere 167

Absynthium tertianis
dandum 266

absynthij coma ad qd
profit 370. usus
414.415

accessionis pulsus indi-
cium 85

accessionum anticipa-
tio

INDEX.

siſio quid indicet	261	adolescentia quæ di-	
accipitrum ſtercoris u-		catur	42. omniũ
ſus	434	etatum optima ibid.	
accerbi ſapores	420	agris & ſanis ſigna cõ-	
acetum quibus parti-		munia	126
bus inimicum	409.	agrotare quid	459
potestate frigidũ	410	agrum eſſe ſuſtentandũ	
aceti qualitatis & u-		etiam nõ prouiſo ſta-	
ſus	408. 436	tu	164
achores quid	453	agylops quid	463
achoris origo	454	egyptij cur Diabeta la-	
acidi ſapores	420	borent frequentius	
acres ſapores	418	189. cur frequenti-	
actionis læſe cauſa quæ		us elephantiaſi labo-	
renda	196	rent	240
actionis tunicæ uehe-		æris & uentorum dif-	
mentis ſignum	15	ferentia	189. 190
actiones liberae uolun-		æruſinoſa bilis	33
tatis quæ 21. cor-		æſtate plus bibitur quã	
poris	124	hyeme	47
actionum uoluntaria-		ætas inclinans & ætas	
rum per ſomnum ra-		quid differant	42
tiones 13. quarum		etatum partitiõ & cõ-	
præcipuè homines		ſtitutio	ibid.
meminerint	15	affectio hepatica quæ	
adeps quid	472	dicatur	467
		affectus	

INDEX.

- affectus unde primum
 periculū, primus cu-
 randus 338. gra-
 uiores primum curā-
 do inspiciendos 172
 affectuum propria si-
 gna quæ 112
 affici quid 459
 albuginei humoris u-
 sus 19
 albumen cui ad quid
 proffit 435
 alexandrini Aegyptij
 cur elephantia si ma-
 ximè corripiantur
 240
 alexipharmaca mode-
 rantius exhibenda
 416
 alexipharmacarum na-
 tura duplex ibid.
 alimenta tenui uisus
 rationi aduersa fo-
 lio 411.
 medicamentosa cui rei
 conueniant 403.
 graffi glutinosiq; sue-
 ci 401
 alimenti & medicamē-
 ti differentia 385
 alimētorum species ex
 qualitate 388. cog-
 nitio ceteris prestan-
 tior 384. ratio ib.
 alimentis frigidis quo-
 modo utendum 402
 alimentū ualentius ue-
 speris comedēdū 387
 alliij usus 414
 aliorum usus 397
 allium agrestium the-
 riaca 427
 aloës usus 414
 alopecia quid & unde
 453
 alopeciæ curatio 429
 alopecijs quid proffit
 433
 alteratio quid 31
 alui solutio quibus pe-
 riculosa 181
 amari saporis 419
 ambro-

INDEX.

ambrosia quid	229	animal non semper præ	
ambulatio quomodo fit		uari, motu cerebro	
at	22	exciso 20. uiuere	
ambustus quid profit		cerebri uentriculo ali	
436		cno tatum læso 474	
amentia quid	455	animalia ociosa excre-	
amygdalæ inflammati-		mentosa	401
onis curatio	248	animalis & plantæ dif-	
amylum quid	389	ferentia	160
αὐξόμωσις quid	8	animalium partes per	
angina quid et eius spe-		se operantes	429.
cies 465. peritio		motus 21. alimen-	
sißima	207	ta 401. pedestriū	
anginæ curatio	207.	carnes quæ optimæ	
432		sint	389
angustia spiritus quid		anserini stercoreis usus	
466		434	
ani & uesicæ musculi		annus quot diebus con-	
quare continuo mo-		stet	459
tu non moueātur	11	anni tempora quando	
ani & uesicæ musculo		incipiant 47. &	
rum officium	11	diei partes respondē-	
animus imbecillus in		tes	189
corpore ualido	490	aphonia quid	439
animi morbi quomodo		aphorismi ioan. Dama-	
curandi	170	sceni ad filium	528
		aphtus	

INDEX.

aphtus quid 464

apij seminis usus 423

apnoea quid 439

apophlegmatismus qd

unde oriatur 75

apoplexia quid 442.

457. quid apud

ueteres 456. ex

decubitu supino 196

apoplexiæ qualitatis si

gna unde sumantur

97. tempora quæ

sint 278. causa 140

in Apoplexia & simili

bus uena celeriter se

canda 296

apoplexiam subito in-

terficere quare 125

apostasis emplastro cu-

rata 481

apostematum optima et

peßima quid 116.

curatio 228

appetentia canina quæ

dicatur 466. abo-

lita quid 466

appetentiæ curatio 213

gradus quinq; 55.

deiectæ cum febre cu-

ratio 215. deiectæ

ex diarrhoëa curatio

218

appetitionis deiectæ si-

gnificatio 122. uis

unde amittatur 116

appetitoriã uim inesse

in hepate exemplum

490

aqua leuissima 393.

394. glaciei peßi-

ma 392. fontana

& recens qualis 393

uino mista cur sitim

sedat 394. frigida

ante cibum quid ad-

ferat 392. optima

qualis 393

aquæ usus consuetis o-

ptimus, non consue-

tis contra 168. ut-

cia unde & quæ 393

quantum sine pericu-

lo bis

INDEX.

- ad bibere liceat 169.
 uitia & incommoda
 404. 405. tepide
 usus 423
 aquarum differentie 393.
 aquilarum stercoreis us
 sus 434
 arachnoidis oculi tuni
 ca 20
 arborum plantarumq;
 liquores quotiu. li
 ces 438
 arius peripateticus po
 tu aque interijt 167
 aromata cur purganti
 bus misceantur 307
 aromatica attenuare
 422
 aromatum semina mi
 xta quid iuuent 308
 arrhia stomacho conuul
 sa absynchide curata
 481
 arsenicum quid 471
 arteria inter indicem
 & pollicem septum
 transuersum curatur
 475
 arteria nulla sine uena,
 sed contra f. 3. Sect. 1.
 arterie contractio quo
 modo percipienda 90
 arterie asperae quae di
 cantur 444. ampu
 tate quare non rege
 nerentur 47. ue
 nae & linguae usus 9
 arteriae & uenae testicu
 lorum, & mammaru
 a longinquo ijs acce
 dunt fol. 2. Sect. 1.
 arteriae & uenae intesti
 norum quomodo nu
 triantur 53. ad quid
 secari profit 304.
 305. Reteformis
 plexus cum nervo pa
 tiuntur f. 3. Sect. 1.
 arteriarum sanguis quas
 lus 8. uenarum po
 sitio in collo fol. 2.
 Sect. 1. duritiei cau
 se

INDEX.

- sa* 144
arteriaca quæ dicantur 444
arthritis quid 439
arthrisconum Theriacorum præparatio 417
arthriditarum curatio 434
articularis morbi curatio 246
articulorum laxatorum curatio 217
In Ascite nec tympanite cauterio utendum 326
asinini lactis usus 406
aspidum uaria genera 482
assa frizaq; siccius quam elixa ad alimentum 390
assimilatio quid 31
asthma morbus quando sanetur 67
astmatici qui dicantur 465
astringentia etiam soluentia esse 191.
miscenda hepaticis f. 187
quibus non miscenda 188
astringentium sapes 421.
usus 217.
facultas 76
autumni initium 47
athanasia quid 229
atrophiæ curatio 367
atra bilis non fit ex pituita 40
atra bilis et excrementa nigra quid differant 37
atræ bilis generatio et signum 102
atræ bilis in excrementis significatio 101.
bilis excretionē noxiā mirari esse impediti medici 102
atram bilam ualidioribus quam flauā purgandam 309
atram

INDEX

attenuans ulcus ratio	tus causa & curatio
diuturnis affectibus	205
confert 166. 167	
attenuantia quæ sint	B
230. quibus non	Balneæ cur iuuentis
adhibenda sint 228.	380
optima 407. me-	Balneum heclicis quæ
dicamenta 529	le conueniat ibid.
attenuationis causa f.	febrientibus ex frigo
137	re 381. circa in fe
attractionis & expul-	bri quæ attendenda
sionis eadem uia, in	382. quibus semis-
uenis à uentre adie-	nibus conueniat 368
cur perductis 21. 22	ba'nei partes quatuor
attrahentis facultatis	380. usus in febr-
affectæ signum 106	bus 378. tempus a-
aurium inflammatarum	ptissimum in intermit-
& obstructarum cu-	tentibus 382
ratio 202. 436.	balneo quibus abstin-
ulceratarum curatio	dum 379. quando
203. doloris à fri-	utendum in putridis
gore curatio 203.	febribus 382
430. inflammatio-	balneorum uarius usus
nes, alio quàm cete-	378
rarum partium mo-	bdellij usus 415
do curari 69. soni	bestiarum morsus cura-
	tio 433
	bilis

INDEX.

- bilis quid appelletur 439. quæ secundum naturam & quæ contra 34. Porracea ubi gignatur 33. arsenica qualis 33. flaua nulla in uentriculo, quare 41. flauæ pallidæque discriminē 425. flauæ species 33. flauæ uires 38. atra generatio & signum 102. differentia in animalibus 425. Vtriusque natura 35. purgatio quomodo sit molienda 322. reliqua genera inter flauam & aliam ad media 35. biliosi cibi qui 41. biliosis alimenta conuenientia 401. Boëthi uxori suffocatione curata 356. Boletorum esus noxius bonis talus ad quid utilis 430. brassica an sit calida 497. bronchos, quid 444. bronchus quid 464. bruchus quid ibid. bubones unde 130. bubuli stercoreis usus f. 433. butyri usus 407.
- C
- Cacoëthe & Dysenteria pulonica distinguenda 450. Calce lota et emplastro quando utendum 335. calculus quando sanetur 66. cardialgia quid 467. calida primo gradu f. 423. calidis & siccis temperamentis quæ uictus ratio 369. siccisque affectibus balnei uti b 2 lib 26.

INDEX.

- | | | | |
|-------------------------|------|-------------------------|----------|
| litas | 383 | canini morsus curatio | |
| calor quottuplex sit | 59 | | 244. 245 |
| naturalis in primis cu- | | carnis stercus ad quid | |
| randus | 360 | prosit | 432 |
| caloris an sit eadem æ- | | canina appetentia quæ | |
| qualitas in pueris & | | dicatur | 466 |
| florentibus | 454. | capitis doloris curatio | |
| multi & humidi si- | | 327. dolorum dif- | |
| gna | 353 | ferentia 200. do- | |
| callo uulneris generan- | | loris à frigore cura- | |
| do quæ conueniant | | tio 202. doloris bi- | |
| | 249 | liosi indicia 123. do- | |
| caluities quid & unde | | lorum ex ardore cu- | |
| | 453 | ratio 201. uehe- | |
| cameli cerebrū ad quid | | mentissimi dolores f. | |
| utile | 429 | 200. dolori pro- | |
| camelinum lac an sit o- | | desse uomitum 212. | |
| ptimum | 495 | dolorem ad oculorū | |
| cancer morbus quid | | radices extendi 69. | |
| 452. unde 37. 235 | | purgationis med. f. | |
| cancris exulceratio ge- | | 536 | |
| neratio 451. cura- | | capite laborantib. quæ | |
| tio 241. 327. post | | pro sint | 383 |
| excisionem curatio | | capparis corticis usus | |
| | 328 | | 399. 414 |
| cancrorū curatio 246 | | caprilli stercoris usus | |
| | | 433. | Caræ |

INDEX.

- Carbunculus** quid & unde 447. 448
carbūculi curatio per chirurgiam 324
cardialgie cause 161
carnes quæ ualentius nutriant 391. suillæ humanis similes 488
carnes pedestrium animalium quæ optimæ 389
carni generandæ apta medicamenta 342
carnium preparatio f. 367. costarum differentie 390
caricæ aduersæ ueneris 412
cariei cause 140
caros quid 457
casei differentie 306
castorei usus 408
castrata animalia uberius alimentum præbent 484
cataplexis quid 458
cataplexis curatio 194
cataplasma imponendi & ligandi modus 339. ex caricis 427
cataplasmatibus quomodo utendum 206.
 apponendi tēpus 182
cataplasmata & emplastra simul apposita nō conferūt 232.
 quibus applicanda f. 228
cataplasmatum differentie 188. 189
catarrhi curatio 432
cavitatis uitiat cause 158
cauo hepatis afflicto nō conueniunt astringentia sola 226
cauorum & sinuum incute ulcerum curatio 325
causa quid 459. nulla efficaciore quā febris pestilentie cau-

INDEX.

sa	65	143. fluxionis cura
cauterio ubi sit opus		ratio 306. & uen-
324. 325. curan-		triculi confusi signu
di qui non sint	325.	105. purgationis
an utendum in artu-		medicam. 536. &
bus solum	499	cordis intemperiei sym-
cauterium non quibus		ptomata 31. oris &
uis adhibendum	325	uentriculi consensus
ceparum usus	397	160. posterioris
cephalea quid	457	partis affectae signa
cephaleae intensiones		105
uariæ 69. sympto-		cerebro compresso ar-
mata & cause	114.	elionibus uoluntarijs
curatio	434	priuatur animal 489
cerarum humidum ad		cerebro exciso non sem-
depascentia	416	per motu, nec sensu
cerebrum nutriri puro		priuatur animal 20
sanguine & spiritu		ceruini cornu usus 429
uenarum, atq; arte-		chirurgia quomodo
riarum suarum	58	morbi curentur 324
qualem motum ha-		choirades quæ sint f.
beat 16. & spina-		454
lis medulla quod if-		cholerae cause 155
ferant	17	chordapfos quid 468
cerebri ut instrumenti		chylus quid 438
vel similis affectio		chymus quid ibid.
		chyl.

INDEX.

chymosis quid 463
 cibandi hora in febris
 bus 276
 cibaria quæ siccius dēt
 alimentum 390. ni
 tiosi succi quottupli-
 cia 40
 cibus post exercitium
 quomodo capiendus
 361. post purga-
 tionē minuendus 313
 cibi sumendi scopus du-
 plex 360. celeriter
 tardēue transeun-
 tis causæ 385. et e-
 gestionis mediocrita-
 tem seruandam esse
 66. mensura 210.
 modus in acutis mor-
 bis 183. 184
 cibi quales prius su-
 mendi 385. humi-
 diores quales 386.
 singulis temporibus
 quales ibid. par-
 tims nutrientes qua-

les ibid.
 ciborū species ex qua-
 litate 388. suau-
 tas ad unctiōem uti-
 lissima 385. ratio
 in exhaustis & gra-
 uilibus 386. 387
 cibus mali succi abstinē-
 dum 363
 cibos & exercitia in
 tempore usurpanda
 364
 cicatricum curationis
 p chirurgiā triplex
 ratio 330
 cicuta necat 491. a
 uetula Athenis uesti-
 tur ibid.
 circuituū ordinem quæ
 peruertant 26. in
 alijs affectibus quàm
 febribus causæ 270
 citta morbus cōcipien-
 tium mulierum 353.
 & 354
 ciuitates orientales &
 64 occi-

I N D E X.

- | | | |
|--------------------------|-------|--------------------------|
| occidentales quæ di- | 430. | astringentia |
| cantur | 447 | non miscenda |
| ciuitatum salubris & | | 188 |
| insalubris situs | 50 | collectiua in æqualitas |
| cleopatra quo aspidū | | quando obuitia facul- |
| genere se interfecerit | | talis fit |
| 481.482 | | 81 |
| clyster quādo & quo, | | colli matricis constitu- |
| modo utendum | 224. | tio & usus |
| 314. | | 27 |
| ex aqua salis | | colliquationis causæ f. |
| 314.315 | | 129 |
| cruditas mali succi cau- | | color melongianus un- |
| sa | 39 | de |
| coctionis & decreto- | | 477 |
| riorum signorum dif- | | colores curationibus si- |
| ferentia | 103 | miliū humorum cō- |
| cœliacorum affectuum | | ferre |
| curatio | 434 | 220 |
| cogitatio læta tristitiā | | columbini stercoreis cu- |
| leuat | 171 | ratio |
| colatorij ossis usus & | | 434 |
| situs | 16.17 | columella quando ab- |
| colici & puncturæ cau- | | scindatur |
| sæ 156. | | 177 |
| doloris cu- | | columellarum laxata- |
| ratio | 427 | rum remedia |
| colicis quæ prosint f. | | 331 |
| | | coitus appetitus in mu- |
| | | liere unde 351. |
| | | uo- |
| | | luptas |
| | | 485 |
| | | comitialis morbus un- |
| | | de & quid |
| | | 143.455 |
| | | comitialis morbi cura- |
| | | tio |

INDEX.

- | | | | |
|------------------------|---------|--------------------------|------|
| tio | 429.431 | pellationes | 442. |
| compositionis medica- | | utriusq; causa | 147. |
| mentorum scopus tri- | | nomina pro partiā | |
| plex | 175 | affectione 458. si- | |
| concocta medicari nō | | gnificatio | 117 |
| cruda | 309 | convulsiones quæ cur- | |
| concoctio quid | 439. | rentur, et quæ nō | 68 |
| cōcoctioni perficiendæ | | convulsionum curatio | |
| puell9 admotus uētri | | 431 | |
| mirificè prodest | 491 | cōuulsis neruis quæ me- | |
| optima quæ | 281 | dicamenta conferant | |
| cōcoctionis signa quæ | | 332 | |
| 279. bonæ indici- | | constitutio corporis op- | |
| um | 281 | tima | 363 |
| concoctioni quæ imimi- | | constrictionis & laxa- | |
| ca sint | 385 | tionis causæ | 156 |
| concoctionem quæ ad- | | consuetudo in uictus ra- | |
| iuuent | 435 | tione quantum pro- | |
| concussio unde | 137 | sit 364. alterana- | |
| conualescentionum ui- | | tura | 491 |
| ctus ratio | 168 | continuae febris signa | |
| convulsio quid | 442. | 264 | |
| etiam infantibus acci- | | contractio arteriæ quo | |
| dit 250. qui plez- | | modo percipiēda | 90 |
| runq; obnoxij | 44 | contusio unde | 130 |
| cōuulsionis uariæ ap- | | coquorum condimen- | |
| | | b 5 | 14 |

INDEX.

- ta inimica concoctio
 ni 368
 sor ex affectione par-
 tiū uicina offendi 73
 & hepar nunquā o-
 mino destituūtur a-
 limentis 51. princi-
 pium animantis 441
 cordis citra thoracis cō-
 uulnerationem dete-
 ctio 474. signa in-
 temperiei 111. pul-
 sus maior quam arte-
 riarum 83. dexter
 uentriculus quib. ad-
 sit 22. & cerebri
 intemperiei sympto-
 mata 51. uentricu-
 lorum sanguis & spi-
 ritus 8.9. frigidi
 pulsus 87. palpita-
 tionis curatio 241
 corde etiam compresso
 non impediri actio-
 nes 489. affecto
 ceterae partes afficiū-
 tur non contra 57
 corneae tunica oculi u-
 sus 20
 corpus recreandu 531.
 ante suraptionem me-
 dicamenti putari de-
 bet 311. uiri & fo-
 eminae quale 42.43
 corporis humani usus,
 situs & forma f.1.
 Sect.1. actiones
 124. extenuatio un-
 de 7. partes leuissi-
 mae & tenuissime
 quae sint 9. faculta-
 tes quot 124. affe-
 ctio fit pro uirtutis
 ratione 64. consti-
 tutio optima qualis
 363
 corpora imbecillia cur-
 nunquā grauitur a-
 groient 44. vario-
 ramini morbis sunt
 subiecta 43. sicca
 quae citius moriātur
 46 cor-

INDEX.

- corporum graciliū im
becillium; curatio
161
- corruptele & interi-
tus duplices esse in
nobis necessitates 65
- corruptum quid 472
- coryze seu grauedini
quæ noxia, quæq; cō
moda 195
- coryze curatio 432
- coxēdicis curatio 434
- crescētes citō, citō mo-
riuntur 107
- crisis quid 459. post
quadagesimum diē
quomodo queritur
289. optima quæ
281. perfecta qui-
bus morbis fieri non
possit 288. febriū
unde petenda 268.
quo modo in febribus
utriusque querenda
289. in quib. die-
bus non fiat 285.
- presentis cognitio f.
282. per abusum
284. perfecta 282
imperfecta, incerta,
obscura, mala, quæ f.
287. ex calfacta do-
mo successit 473.
exitus quibus cogno-
scatur 74
- crisis bonæ indicium
281. perfecta co-
gnitio 289. 290.
modus p quid inuesti-
getur 95
- crisi duos dies attingen-
te quomodo utriusq;
distinguendum 286
- crises morborum quæ
280
- crisibus ubi nō sit opus
280
- croci usus 415
- crocodyli morsus ex ip-
sius carne curatur f.
418
- cruditas quid 466
- cruda

INDEX.

cruditas quomodo uacuanda 298
cruditatis signa & cause 152. *cause* 170
signa in febribus calidis 268
cruditate iam inflammata non est sanguis mittendus 306. *quæ ætas maximè abundet* 38
in Cruditate sanguis nunquam 293
crudos uacuare succos periculosum 182
crucoris eiectioni aut uomitum signa 120
cubiti uena quando secunda 302
cucumeris usus 397
cucurbitula occipiti admota oculis prodest 75
cucurbitulis quando utendum *ibid.*
cucurbita quando ap-

ponenda 306. *quibus morbis prodest* f. 182
curatio pro uirium ratione instituenda 164
quomodo sit instituenda 162
curationis precipuus scopus 163
curatio morbo quæ primò consideranda 162
cutis per se nullis nervis est prædita 60.
sensu prædita ut uiscera *ibid.* *dense remedia* 241. *qualis* 448. *secundum naturam qualis* 58

D

Daemonia quid 456
Dactylorum usus 399
Deambulantes dormire quid faciat 479
declinatio in febre quæ 272
decretorum & cetero
Ratio

INDEX

Ationis signorum dif-	fol.	524
ferētia 104. decubi	depravationis causa f.	
tus supini signa ib.	157. 159	
deficientes pulsus qui	derivatio	181
445	dextrae partes cur fini-	
deiectionis stomachi cu-	stris robustiores sint	
ratio	129	218
deligaturae ratio	diaphragmatis doloris	346
deliquiorum animi cau-	causa	152
sa	diaphragmatis caput	128
delirantes ex frigido et	f. 1. Sect. 1.	
humid.	diabete quid	540
delirium unde	diabetes rariss.	141.
quid 45. quos af-	diabetes quibus in re-	
fect9 saepius sequatur	gionibus frequentius	
146. in egroto	accidat	189
quid significet	diabete morbi signifi-	99.
ardentium febrium	catio	94
symptoma	διαιτητικὴν ἀρσιν quib.	104
delirij signa	constet	97
dentes forati & liuidi	diarrhoia quid	468
unde	diatrion	214
dentium dolorum cu-	dies quid 459. decre-	
ratio 435. doloris	torij 284. duode-	
causa	cimus et decimus sex-	
de Deo error Galeni	tus 285. boni qui	
	sint	

INDEX

sint 286. nō decre
 torij ibid.
 diei & anni partes re-
 spondentes 189
 dierum morborum di-
 scretio 284. indi-
 catoriorum numerus
 quis seruandus 289
 digerentib. nisi uacua
 to corpore non fiden-
 dum 179
 digitorū signa 115. 116
 discutientibus emollien-
 tia miscenda 184
 dyspnœe causa & sig-
 na 108
 dissolutionis corporis
 signa 533
 distensionis à sanguinis
 copia curatio 176
 distributionis ratione
 misceri purgantibus
 contraria 77
 diuretica medicamen-
 ta ex quibus confici
 debeant 317

do'ere quid 459
 dolor punctorius &
 membransrum 142.
 ex humore quot mo-
 dis fiat 137. ab in-
 flammato hepate f.
 142. 143
 doloris capitis ex ardo-
 re nec non à frigore
 curatio 201. 202
 biliosi capitis, & do-
 loris ab ardore & fri-
 gore indicia 123. ca-
 pitis curatio 195.
 omnis causa 130.
 aurium à frigore cu-
 ratio 203
 dolorem flatulentū cu-
 curbitulis miraculo-
 se curari 173
 dolorem capitis ob ca-
 brietatem curatio f.
 199. differentia
 & cause 142. ex
 medicamentis ortorū
 curatio 318. capis

INDEX

tis differentie 200
 dormientes nō esse om
 ninō sensus expertes
 12.13. unde spirent
 12. ambulantes qd
 faciat 479. quarū
 actionum præcipuē
 in somno meminerit
 14.15
 dormientibus quæ figu
 ra corporis accidat
 11
 dormientium animam
 non quiescere 12.
 actionum uoluntaria
 rum rationes 131
 dysenteria quid 458
 dysenteriae causæ 155.
 curatio 432
 dysenterici qui dicun
 tur 467
 dysentericis quæ pro
 sint 430
 dysepulotica & cacoë
 the distinguēda 450
 dulcia qualia 420

B

EBrietatis curatio f.
 199.200
 Ebrijs dormiētib. quæ
 figura corporis acci
 dat 11
 Efflatio quid 56
 Efflatio unde fiat 12
 egestionis & cibi mea
 diocritatem seruans
 dam esse 65
 elephas unde 235
 elephantiasis unde mo
 riatur 37. & can
 cri curatio 241, in
 Germania rarissima
 240
 emollientia medicamē
 ta 422
 emplastica quæ 462,
 & 471
 emplastrum ex caricis
 427. ad splenetico
 cos & hydropicos
 221. ad ischiadi
 cos 248
 emplas

INDEX.

emplastro & calce la-	quid 450.	frigida
ta quādo utendū 333	curatur	252
emplastra & cataplas-	erysipelatarum cura-	
mata simul apposita	tio	76
non conferunt 232	euacuationis species f.	
ephemeras balneo cu-	186	
rari 379	eupatorij usus	4
epidemia quid 440	euulsio quando necessa-	
epilepsia quid 442.	ria	166
457. 458	exaspirationis cause	
epilepsia unde fiat f.	157	
143. 373	excrementū aquosum,	
epilepsie curatio 193.	pingue, & glutino-	
196. 435. effectus	sū quid indicet 120	
199. morbi que sint	excrementi incocti si-	
tempora 278. pro	gnum 118. optimi	
fuit uomitus 212	significatio ibid. ui	
epileptica cōuulsio un-	ridis & nigri signum	
de & eius curatio	ibid. frequentior	
536	eiectio, quā cibi as-	
epilepticis quid prosit	sumptio perniciosum	
409	signum ibid. foeti	
epiplocele quid 454	di, stridentis, spinosi,	
erosio quid 468. un-	& uarij significatio	
de 130	120. 121. nigri sig-	
erysipelas oedematum	nificatio 121. 122	
	excrementa	

INDEX.

excrementa aestate quā

hyeme plura 46.

si diutius morantur

putrescant 39. pi

tuitosa in uentricu

lo qualia 41. nigra

non nocent uentricu

lo 40. nigra quid

ab atra bile differant

37. impleri uentri

culum inopia nutri

menti 59

exercitandi tēpus 372

exercitationes quomo

do fieri debeant 372

exercitationis definitio

et tempus 375

exercitationum utilissi

me quē 372

exercitiū omissum quid

generat 373. sani

tatem seruare 359.

à repleto corpore f.

373. in quartana

376. quāle debeat

esse 379. ante cibū

quid profit 372

exercitia duplicia 376

et cibos in tempore

usurpanda 364.

post crapulam 374.

acuta nocent ibid.

qualia ante et post

cibum esse debeant

375. acuta et tar

da 374

exercitiorum usus 376

expulsionis impedita

cause 155. et at

tractionis eadem uia

in uenis à uentre per

ductus ad iecur 22

expiratio quid 556.

et inspiratio quomo

do fiant 11

extensionis membrorū

cause 10

extenuatio corporum

unde fiat 7

extremorum refrigera

tionis in febre cause

255

c Index

INDEX.

Βουζατορ quid 461

F

Facultatis attractricis
affecta signum 106

Facultatē augētia et de-
primentia quot 128

Facultates omniū quot
sint 178. naturales
quæ 30

facultatum alexiphar-
macarum natura du-
plex 416. & spi-
rituum usus 67

famelici unde fiant 99

fames unde 55

farinæ triticeæ usus f.

423. hordeacea

usus 428

fatigatis dormientibus,
quæ figura corporis
accidat 11

fatuitas quid 455

fauus quid 454

febricitantes quantum

aquæ sine periculo bi-
bere possint 169

febricitantium uictus ra-
tio 276

febricitantibus quando
balneum profit 379.

quibus cōcedatur fri-
gida lauatio 253.

quæ uictus ratio 169

febris quartana unde
oriatur 37. ardens

an sit in uenis 497.

continens & conti-

nua quæ sit 445.

aliquando ex fluxio-
ne in partes imbecil.

62. putrida & he-

ctica quæ 450. con-

tinua est acuta 258.

non temerè repurgā-

da 277.

febris curatio 215. &

297. calidæ malū

signum 268. pul-

sus, quādiū febris est,

nō est naturalis 360

quartanæ per theria-

cam curatio 272.

putridæ

INDEX.

putridæ signa 259.
 putridæ et diariæ ge-
 neratio 255. arach-
 nis solutio quibus ex-
 cretionibus fiat, item
 tertianæ, quotidianæ,
 phrenitidis 282.
 tertianæ & quartanæ
 signa 262. 63.
 calidæ symptomata
 quot 269. quoti-
 dianæ signa 263.
 continuæ signa 264.
 tertianæ & quartanæ
 causa 149. quar-
 tanæ curatio 139.
 hecticæ curatio 316.
 cum phlegmone in ie-
 core curatio 223.
 a dentis curatio 276.
 principū quibus parit-
 bus contineatur 256.
 hecticæ generatio et
 curatio 271. diffe-
 rentia ex urinae scia-
 mine 93. calidæ ge-
 neratio et symptomata
 269.
 febri ex stypatione pro-
 deesse balneum quan-
 do 381.
 in Febri quæ attenden-
 da circa balneū 382.
 in Febre uacuationis
 observatio 254.
 febres putridas ex ta-
 ctu dijudicandi ratio
 259.
 febrium periodi quibus
 de causis uarietur f.
 254. rigoris indi-
 catio 266. duæ spe-
 cies 445. putridarum
 optimum reme-
 diū 275. intermit-
 tentium species 257.
 258. putridarum
 pulsus 81. 85. 86.
 continuorum species
 & curatio 268. uari-
 æ causæ 25. 269.
 hecticarum causæ &
 62. quæstio

INDEX.

- quando grauiores fi-
ant 274. ex crudi-
tate causa & cura-
tio 256. 257. pu-
tridarum causæ & cu-
randi genera 252.
periodi quot horis ex-
pleantur 260. ar-
dentium generatio f.
258. intermittens
tuum ex partium lesio-
nis causæ 266. tu-
morum Crises un-
de fiant 281. crises
unde petenda 268
febriles qualitates al-
terare, quàm uacua-
re utilius 184
febris putrida quan-
do conducat 253.
continentibus quan-
do aqua sit exhiben-
da 251. calidis quā-
do frigida dāda 269
in febris attenden-
dum cōcoctione 251.
utriusque quomodo
crisis sit querenda f.
289. continen-
tibus sanguis mitten-
dus 299
ferarum morsuum re-
medium 411
ferinæ seu agrestium car-
nes ualentius nutri-
unt 391
fibræ intestinorum &
uentriculi 31
ficus & pruna quibus
profint 367
figura media corporis
quibus dormientibus
accidat 11
fistula quid 447.
quādo aperienda 337
flatulentū dolorem cu-
curbitulis miraculo-
se curari 173
flaua bilis, pallidaq; di-
scrimen 425
flexionis & extensio-
nis membrorum cau-
sa

INDEX.

se	10	res ad coitū sint	358
fluxuationis causa f.		foeminae qua in parte	
153		generatrices sint	54
fluxionis radici prius		foeminae sinistro utero	
medendum quam ul-		nascuntur	354
cus	179	foeminae corpore, uiri	
fluxiones quibus parti-		corpi purius	42
bus incumbant	130.	foetus in utero quo p.	
quibus partibus se-		cto nutriatur	55.
pius accidant	61	quando phlegmone	
fluxionum pro partiū		tentatur	355
situ & ratione cura-		foetus formationis tem-	
tio	238.	pora	ibid.
deriu-		foetus bene uel male	
tio quomodo facien-		habentis signum	355
da	183	foetum causa	55
fluxionibus quando in-		foliata unguenta	370
tendenda sint discuti-		formae deprauationis	
en.ia	239	causae	157
fluxus uentus curatio		formicans omnium mi-	
312.		nimus	90.
cōmodus non		pulsus	
supprimeadus	313.	qui	88
ē naribus quomodo		formationis foetus tem-	
reuellendus	304	pora	355
foemina quando gigna-		fracturae curatio	346
tur	55	fracturae indicatio un-	
foeminae cur appetitio		c 3 d:	

I N D E X

- | | | |
|---------------------------|-----|----------------------------|
| de petenda | 345 | 500. crassi errores |
| frictio | 376 | de Deo & mūdi crea- |
| frictiones siccae dolores | | tionē 518. loci ali- |
| prohibentes | 184 | quot sibiipsis contra- |
| frigida quando noceāt | | rii 492. opinio de |
| 49. quando dan- | | act onibus uoluntate |
| da in febribus calidis | | rijs per somnū 13.14 |
| 269 | | gall. iracundi |
| frigidam recusari quæ | | 489 |
| febres non noscunt f. | | gall. nacei stercoris usus |
| 253 | | 434. testium om- |
| frigidorum morborum | | nium suauissimi 390 |
| cause | 140 | gangrena quid |
| fructus horrhei quales | | 449. |
| 398 | | 453 |
| fumus fuligo quid | 381 | garrulitas & delirium |
| functiones vitales | 21 | in egrotio quid signi- |
| furfura earum urina- | | ficient |
| rum in diuini | 94 | 99 |
| | | generatio quid |
| | | 38 |
| | | genitalia Masc. & fœ- |
| | | min. quid differant |
| | | 350 |
| | | genitalis seminis copia |
| | | laborantes quomodo |
| | | curandi |
| | | 361 |
| | | genu inflammati cura- |
| | | tio |
| | | 172 |
| | | in Germania elephanta- |
| | | tiasis |

G
 Galenus Moysen p.
 phetam reprehendit
 519. 400. aure-
 os pro curata suffo-
 catione accepit 358
 Gal. crassi errores 499

INDEX.

tiasis rarissima 240

glandes castaneæ ad qd

utiles 485

glandula quæ nervos

habent f. 4. Sect. 1.

glutinatoria & itē in-

durantia medicamen-

ta qualia 343

gonorrhœa quid 442

gracilium imbecillūq;

corporum curatio f.

161

gracilibus quæ medica-

menta danda 532.

lac asininum dandum

406

grauedini quæ noxia,

quæq; commoda 195

grunorum præter na-

turam in corpore cō-

tentorum signa 122

gutturis inflammatio-

nis curatio 248. &

433. tumorum cu-

ratio 432

gustus unde fiat 18.

deprauationis cau-

sa 159

H

HAemodia quid 443

Hæmoptoici morbi cu-

ratio 295

Hæmoptoicorum cura-

tio 208. 209

Hæmorrhœis quid 451

hæmorrhoides narium

quando sanentur 67

halitus & vapores f.

540

hæcticæ febris genera-

tio & curatio 272

hæcticæ febres quæ sol.

460

hæcticarum febrium in-

sultus post cibum cir-

citer horam sūt gra-

ues 274. febrium

cause ibid.

hæcticis balneum pro-

dest 380

hellebori albi usus 412

hemicroniæ curatio fo-

c 4 lio

INDEX.

- lio 434
 hemicronie differētiæ
 & signa 105
 hemicranicum auxiliū
 194
 hemytriteæ febris 283
 hepatica affectio quæ
 sit 467
 hepatici qui dicantur
 467
 hepaticis astringentia
 miscenda 187 quæ
 sunt miscenda 225.
 quod uirum sit utile
 392. medicamen-
 tis astringentia aro-
 matica miscenda 187
 hepar & cor nunquā
 omnino destituuntur
 alimentis 51. et uen-
 triculus 531
 hepatis indurati cura-
 tio 221 clauo affli-
 cto non conueniunt
 astringentia 226.
 inflammati sympto-
 mata 114. intens
 peratiæ curatio 224
 imbecilli signum 119
 hepatis imbecilli reme-
 dia qualia 223. 225
 hepatis an neruus adsit
 492
 herba iecur dissoluens
 476
 hernia unde fiat 156
 herpes exedēs qd 452
 herpetis curatio 239.
 qui in summa est cu-
 ratio 240
 herpes quæ dicantur
 447
 heræ usus 415
 hirundinis cerebri usus
 429
 horror & rigor unde
 149
 humidi plerunq. lon-
 gæui 45
 humor & qualitas con-
 uitantur 137. cru-
 dus quid à puro diffe-
 rat

INDEX.

- rat & unde fiat 37
 humoris uacuandi ra-
 tio 162. crudi duo
 genera ibid. albu-
 ginei usus 19
 humores numero quot
 siue 32. crassi qui-
 bus euacuandi medi-
 camentis 165e pa-
 riter affecti in corpo-
 re sunt quatuor 40
 humorum mordacium
 quatuor species 38.
 confusio unde oria-
 tur 32. qualitates
 36. signa & lin-
 guæ calore 101 pur-
 gatio quādo & quo-
 modo faciēda 166.
 descriptio & parti-
 tio 32
 humoribus quando cor-
 pora abundant 533
 hydrocele quid 454
 hydrocelæ nascitæ quæ
 medicamenta conue-
 niant 333
 hydropes 452
 hydropis causa & cu-
 ratio 221.222.233
 hydropiseos hepaticæ
 principium ignotum
 279
 in Hydropica muliere
 ex menst. suppressa
 sanguis mittendus 305
 hydropicis quid proffit
 434
 hyemis initium 47
 hyeme plus editur quā
 æstate 47
 hypochondriaca melā-
 cholia 456
 hypochondriacæ me-
 lancholiæ signa &
 causa 112.137.151
 hypochondriacæ melā-
 choliæ curatio 212
 hypochondriorum af-
 fectus quomodo cog-
 noscendus 116
 hypodriacis Theriaca
 5 con-

INDEX.

confert	237	ileos quid	468
hypoglottides	211	imbecillitatis caus. 178	
hypopius quid	463	imbecilles quomodo	
hyposarcæ curatio f.		uacuandi	166
219		imbecillia corpora cur	
I		nūquam grauitè æ-	
Icterus necessariò pur		grotent	44
gandus	220	impostores uiperas ci-	
ictericis quæ prosint		curantes	483
430		Ioan. Damasceni apho-	
Ictericorum per indi-		rismi ad filium	528
cationē curatio	220	inæqualitas quid	89
curatio	219	inæqualiter & inæqua-	
ictus pulsus quid pro-		lia quæ	444
prie	82	inanitionis & lienis in-	
iecur œdematenunquā		durationis causæ	136
infestari 71. herba		indurantia medicamen-	
dissoluens	476	ta qualia	343
iecoris doloribus quæ		infantis pulsus qualis	
uena secanda	302.	80	
inflammati indicia f.		infantes exulcerantur	
113. inflammati cu-		nutricibus malè affe-	
ratio 222. phleg-		ctis	486
mones curatio	223	infantib. quomodo me-	
iecore affecto quæ ue-		dicamentum dandum	
na secanda	303	314. etiam conuul-	
		sio	

INDEX.

sio accidit 250
 inflammatio unde 265
 inflammationes quan-
 do scarificande 341
 inflatio & œdema qd
 differant 455
 inspiratio & expira-
 tio quomodo fiant 11
 instrumenta contuma-
 cia quomodo fiât 82
 intemperantiæ hepa-
 tis curatio 225
 intemperantibus non
 medendum 312
 intemperies inæqualis
 duobus modis incidit
 50. humida facili-
 or curatu 185. om-
 nis morb. à quo sym-
 ptomata 177. inæ-
 qualis quæ 64. ue-
 hemens deijcit uires
 50. sicca quæ 185
 intemperiei cordis si-
 gna 111. sicca spe-
 cies 185. calida fri-

gida bona 213. cui
 uenus conueniat 361
 interitus & corrupte-
 la duplices esse in no-
 bis necessitates 65
 intermissio in febre qd
 272
 intestina uulnerata
 quâ facilius curen-
 tur 72. cur sint cō-
 uoluta 53. ab atra
 & flaua bile affecta
 quæ curantur 117.
 duplici modo nutriri
 24. duabus tunicis
 uestiuit natura, qua-
 re 486
 intestinorum affectorū
 curatio 232. uul-
 nera curatu difficilia
 231
 intestinis exulceratis
 clysmi & qui conue-
 niant 316
 ira quibus dominetur
 489

ischias

INDEX.

ischias quid 439
 ischiadicorum curatio
 247
 ischiadibus nil prodest
 scarificatio 302
 ischiadum dolorib. que
 uena secanda ibid.
 ischurie cause in pue-
 ris & curatio 234
 inguli & diaphragma-
 tis dolorū cause 152
 iuuenes non nisi mag-
 nis ex causis lædun-
 tur 65
 iuueni panis conueni-
 ens 389
 iuuenum pulsus qualis
 80

K

Κηρίον morbus qui
 dicatur 454
 Κυρτοκήλη qd 454

L

Lac ad quid utile 347
 La sistit & deijcit f.
 406. sero, um opti-

mum 395. gignen-
 tia & menstrua mo-
 uentia atque urinam
 qualia 424. came-
 linum an sit optimū
 495. cacochymū
 394. utile pectori
 395. ex mammillis
 haustū optimū 406.
 ad quid utile 394
 lactis igaoto sero cal-
 fa ti uires 406. sub-
 stantia triplex 395.
 noxa & correctio f.
 396
 lactuce usus ibid.
 læthargie curatio 197
 lapathi foliorum usus
 411
 lapis quibus nascatur
 partibus 122
 larynx quid 464
 lauacrū quale & quan-
 do exercitatis 378
 lassitudo quid 461.
 tensiua 413
 in Lase

INDEX.

in Laſitudine ex crudi-
tate non uomendum
319

luxationis cauſa 156

lepra quid & unde f.
37. 235. 452

lepræ curatio 433

lethargi effectus 158.
283

lethargios medicamen-
ta conuenientia 158

lien ſeu ſplen qualis &
eius uſus 26

lienſ aff. ſi ſigna 118
imbecilli purgatio

quomodo fiat 227.

indurationis cauſæ
136. ſcirrhoſi cu-

ratio 227

lieni quando conferant
aſtringentia 226.

medicamenta ſcirrho-
ſo conuenientia 227

liene affecto quæ uena
ſecanda 303

lienofi qui ſint 467

lienofiſ detrahendus ſan-
guis 306

lienteria quid 466.
468

lienteriæ cauſæ 155

ligamenta inſenſilia f.
3. Sect. 1. & tendo-

nes ab ignariſ putan-
tur neruiſ f. 3. Sect. 1

& uirga quid diſfe-
rant 28. 29. durifi-

ſima quæ 6

ligamentorum uſus ib.
color 6

ligendi ulceriſ modus
337

lingua quam uim habe-
at 18

linguæ paraclyſiſ quid
439. uſus 9

lippitudo ægroto ma-
lum ſignum 106

lippitudinum curatio
204

longæui maximè quæ
ſunt humidi 48

long

INDEX.

loquela organa	19	marasmus duplex	441
ludus ad quid utilis f.	373	mares dextro utero na-	
lumbrici quibus nascā-		scuntur	354
tur partibus	122	masculus quādo gigna-	
lumbricorum curatio		tur	55
430. genera et cu-		masculorum & foemi-	
ratio	233	nar genitalia qd dif-	
lumbricis quid profit		ferant 350. dextras	
434		partes, sinistras fœ-	
lupini stercoris usus f.		mimarum generatri-	
432		ces esse	54
M		masculos gignātesque	
MAcor ob pblegmo-		signa	478
nas quando fiat	72	matellæ hydrops quid	
Macilētus quomodo me-		469	
dendum	315	matres pueros debere	
Mammæ totidem quot		lactare	356
matrices	27	matrix & vesica in mu-	
mammarum inflamma-		liere qd differāt 28.	
tarum curatio	436	quid & aliquādo ner-	
mania unde	141	uus dicitur	440
manicæ mulieris signū		matricis os et uentricu-	
356		lus qd differāt 469.	
manus tactura pulsū		suffocatio quando na-	
qualis	90	scatur	347
		matrice nulla pars ma-	
		gis	

INDEX.

gis dilatari, aut con-
trahi potest 49

matrices quot, totidem
et mammae 27

matricibus exulceratis
quid conueniat 315

medicæ artis studiū et
methodus 529

medicamentum profu-
isse quomodo uideat

tur 312. infantib.
quomodo dādū 314.

quādo propinandū
313. ex inæquali

ter ualentibus nil ua-
let 307. effectus

quo ordine sequatur
310

medicamenti propinā-
di ratio et obserua-

tio 315

medicamenta propinā-
di tempus 52. sin-

gulis morbis parata
meliora 188. poly-

chresta non iuta ib.

diuretica ex quibus
confici debeant 317.

læthargicis conueni-
entia 198. ualidio

ra aut remissiora quib.
danda 313. qua-

lia adhibenda corpo-
ri 191. purgantia

cum iudicio exhiben-
da 309. uaria pro-

uarijs partibus sorti-
ta 411. per se ope-

rantia 429. poly-
chresta q̄ dicta 470.

purgantia quæ dicā-
tur 192. calida qua-

lia adhibenda 178.
salubria cur inuenta

403. salubria et
sanitatem conseruan-

tia ibid. emollien-

tia 422. menses cō-
entia non omnib. pro-

sunt 349. alia alijs
partib. noxia uel uti-

lia 412
medis

INDEX.

medicamentorum per se operantium cata- logus 430. purgā- tium ordo in purgan- dis humoribus 191. 192. cōpositionis scopus triplex 175	medulla spinalis & cē- rebrū quo differāt 17
medicāda certa & pau- ca usurpanda 532	melācholia Hypochon- driaca 456. quid & unde 104. 455. & pituita epilepsia 36. non uomitu cu- randa 320
medicina quid 451	melancholię signa 99
medicinę pars q̄ prę- stantiſſima 384. ſtu- dioſo quę ſint neceſ- ſaria, & quę obſer- uanda 529	hypochondriacę cau- ſę 151. hypochon- driacę ſigna 112. curatio 197. hypo- chondriacę curatio 212. aliud genus 456
medicinam percipien- dam quę ætas ſit opti- ma 42	melancholiām ex epi- lepsia fieri & ē con- trā 143
medicus morbi euentū pro dicere debet 132	melancholicę aliena- tiones 141
medici officium 164	in Melācholia mitten- di ſāguinis ratio 305
medici duo ex melle ut putabant interie- runt 488	melancholici cur ple- runq; mortem appe- tāt 212. morbi 37
medicis uoluptuarijs non credendum 529	melan-

INDEX.

melancholico ex sanguine qui morbi ori- antur 37	mensium suppressorū signa 348. prouo- catio quomodo fiat 347
melancholicorum acti- ōnes 170	miraculōsorū aliquot exempla 473
melanthij usus 431	mœstitiæ causa 141
melonum usus 397	mola quid 470
mēlicratum quid 472	mors sæpe sine crisi 73
meline quid 471	mortis in febre signum 269. præsentis si- gna 85. 103. 117. 125. 149. tres mo- di 74. signa ex quē- busdam partib. 102 expectationis causæ 141
membrorū iactatio in cardiacis & stoma- thicis syncopis undē 12. flexionis et ex- tensionis causæ 10	morbis ante Galeno non uisus 487. acu- tus & peracris quid 288. simplex per accidentia etiā quæ- rendus 267
meninx dura quare fo- ra minulenda 16	morbi magnitudo quos modis efficitur 181.
meningis utriusq; ac- cessio ad cerebrū ib.	frequentis significa- tio
menonis dictum 132	
menstrua quid prouo- cet 424	
menstruorum suppres- sio 351. curatio f. 433. 478	
mensis quot dieb. con- sistat 459	

INDEX.

- ti 533. redundan-
tiæ unde oriatur 66.
tempora quatuor f.
273. principium
quid 279. euentū
medicus prædicere
debet 132. augescen-
tis signum 261.
tres ordines & speci-
es 162. causa unde
petenda ibid. cogni-
tio ex coniectura, cu-
ratio ex scientia 123.
calidi & frigidi refi-
ciendi tēpus par. 186
morbo curādo quæ pri-
mū cōsideranda 162
morbi maligni quomo-
do pro ætate muten-
tur 67
morbi animi quomodo
curādi 170. ex te-
nui & ex crassa flu-
xione orti 40. pa-
rentum in filios deri-
uantur 530. calie-
di 531. qui sine cri-
si sanctur 280. pes-
simi q̄ ex uētriculi flu-
xione 68. sicci q̄
curentur ibid.
morborum signa 97.
frigidorū causæ 140.
uariæ significatio-
nes 101. curatio p̄
chirurgiā 324. cau-
sæ quando afficiant
corpora 154. con-
coctio 166. indicia
ab accidentibus 111.
specialiū causæ 127.
curatio cōmunis 168
acutorum cibus 183.
definitiones, & quo-
rundam ambiguorū
distructio 437. cu-
ratio per medicamen-
ta 307. causa effi-
cacissima 65. signa
ex corporis & animi
affectibus sumi 110.
111. curatio parti-
cula-

INDEX.

- | | | | |
|------------------------|---------|-------------------------|-----|
| cularis | 193 | mulieris mania signum | |
| morbis quibus sanguis | | 356 | |
| tutò detrahi possit f. | | mulieres menstruis la- | |
| 299. extremis & | | borâtes quomodo cu- | |
| extrema remedia f. | | randæ 306. cur | |
| 168 | | appetitio res ad coi- | |
| morbos acutos cognos- | | tum sint | 351 |
| scendi ratio | 287 | mul'se usus | 407 |
| mores uictum & exer- | | mundum esse recensita | |
| citia sequi | 363 | creatum à Deo, & | |
| morū corruptio à qui- | | Deum aliquando mū- | |
| bus | 365 | dum fuisse | 524 |
| morsus animalis cura- | | murium capita ad quid | |
| tio | 244.245 | profint | 429 |
| motus & agens sensus | | musculus magis motus, | |
| patiēs 60. sine mu- | | quàm sensus | 6 |
| sculis fi ri nō potest | | musculi qui in Tendo : | |
| 6. animalis quot 21 | | nem desinant ibid. | |
| motuum musculorum | | qui mollius et qui dis- | |
| differentiæ | 10 | rius tentantur | 30. |
| moysen Prophetā Ga- | | temperales læsi quæ | |
| lenus reprehēdit | 519 | symptomata inducāt | |
| muci curatio | 195 | 67. ani & uesicæ | |
| mulier ut cōcipiat | 484 | quare contrario mo- | |
| duos abortus putrefa- | | tu non moueantur | 11 |
| ctos edidit | 480 | musculorum motuum | |
| | | d 2 diffen- | |

INDEX.

- differentia 10. uesi
 ce & ani officiū 11.
 mustela cerebri usus f.
 429
 musculus omnib ut una
 actio, ita unus motus
 30
 mystrarò elephantias
 laborant 240
 myuri pulsus qui dican
 tur 444
- N
- Narcissi radix uomi
 tioni commoda 321
 Nasus primū est instru
 mentum ad respira
 dum 48
 Natura cuiusq; cōside
 randa 173. iuuan
 da 531. rerum uar
 ria 532. 533
 nature concedendū in
 quacunq; specie ua
 cuationem immet
 100
 naturales facultates
 quæ 30
 nausea & deiectionis
 stoma h curatio 218
 nauseabundis balneum
 non prodesse à cibo
 383
 nervus an hepatis adsit
 492
 nervo uulnerato mittē
 dus sanguis 300.
 uulnerato frigida no
 cent 49
 nervi puncti curatio f.
 327. 328. Et 180
 nes quot modis ossib.
 cohereant 8. qui
 bus sint partibus exi
 les, & quibus maio
 res, & quare 29
 nervorum situs in mu
 sculis f. 1. sect. 1.
 Tendonum & liga
 mentorū figura f. 5.
 Sect. 1. colore 6.
 testiculi usus 63.
 mollium & durorū
 ratio

INDEX.

ratio 60. conuul-
 forum curatio 332
 neruis quæ partes care
 ant f.4. Sect.1. cō
 tuis conueniens cata
 plasma 243
 neruos natura longius
 productos corrobo-
 rat 29
 nigoris et palloris cau-
 sa 153
 nocti ambulos quid fa-
 ciat 478
 nomæ per chirurgiam
 quomodo curentur
 324
 nubes regie quæ dictæ
 sint 471
 nucū uariæ species ib.
 nutricis ualidæ signa
 355
 nutriendis ægris modus
 quis 161
 nutrimenta quo ordine
 fieri debeant 25
 nutrimentum animalis

530. partium hu-
 miditas ceuros p eas
 sparsa 185
 nutrimenti & alimen-
 ti differentia 385. &
 medicamenti differen-
 tia ibid. quantitas
 uel qualitas minuen-
 da ubi 66
 nutritionis ordo in tria
 tempora dist. ibutus
 25. quarta species
 26

O

Obesitas aut macilentis
 quomodo meden. u.
 315
 obesitatis uel incrassa-
 ti corporis curatio f.
 237
 Obstructio quid 460
 quibus faciliè accidat 7
 Obstructionis remediū
 226
 ocularia medicamenta
 qualia & quæ 206
 43 oculi

INDEX.

- oculi conuulsi curatio 400
- 332. purulentia quo modo purganda 331.
- corneæ tunicæ ususf. 20. arachnoidis tunica ibid.
- oculorum doloris remedium 75. dolorum curatio 431. tunicæ forma & usus 19. fluxionis curatio 70. 179. doloribus quæ uena secanda 302. suffusionum curatio 429
- oculis quæ conueniant medicamenta 332
- odora semper eligenda 412
- œdema quid 452. & inflatio quid differat 453
- œdemate nec thoracē, nec iecur infestari 71
- olerum cibus 396
- olīna stomachum iuuat 400
- olīuarum usus 399
- omentum quid 23. uitæ non necessariū 26
- ophiasis quid & unde 453
- ophthalmia quid 463
- ophthalmiæ curatio f. 204. 207
- ophthalmicis quid proficit 435
- opium medicam. 175
- organa uocis quæ 444
- organorum respiratio nis auxilia 210
- oris uentriculi morborum causæ 151
- oris uentriculi à cerebri consensus 160
- ore non est opus ad respirandum sanis 48
- orientales & occidentales ciuitates quæ dicantur 447
- orthopnoici qui dicantur 455

INDEX.

os matricis quid 469
 os uentriculi quid 466
 ossis colatorij usus &
 situs 16.17
 ossa quæ citius glutinē
 tur 345. nervo præ
 dita quæ f.4. Sect.1.
 puellorum sola uniri
 posse 345. quan-
 do reponenda 345
 ossium perforatio 115
 fractorum c rati f.
 248. humanorum
 usus 435
 oua dura quæ dicantur
 472
 ouorum usus 435. ua-
 riæ species 472
 ouilli stercoreis usus f.
 434
 oxycratum potus 304
 oxygala quid 472
 oxymeli optimum epi-
 leptico 409. ad
 uacuationem quo no-
 do sumendum 169

P

Palma uerticis usus
 399
 Palmarum usus ibid.
 Palloris et nigroris cau-
 se 153
 Palpitatio quid 443
 palpitatio quibus acci-
 dat partibus 61
 palpitationis cordis cu-
 ratio 241
 panis conueniens iuue-
 ni 389 purissimi
 confectio 388.389.
 genera & usus 388
 papaueris usus 398
 paralysis quid 454.
 lingue quid 439
 parenchyma q l 460
 parentum morbi in fi-
 lios deriuantur 530
 paristhmiorū curatio
 432
 parotides quādo et quo
 modo suppurandæ f.
 70

d 4 partes

INDEX.

- partes instrumentales
à similarium affecti-
one lesæ quomodo
curandæ 341. for-
tibus proximis ab ijs
uim accipiunt 62.
neruis carentes f. 4.
Sect. 1. leuissimæ et
tenuissimæ corporis
quæ sint 9
partium pro salubrita-
te affectus ratio 191.
nutrimentum, humi-
ditas ceuros per eas
sparsa 186
partibus laxioribus et
infirmioribus fluxio-
nes sepius accidant 61
partus unde 353
pastinacæ syluestris u-
sus 397
pectore affectio quæ ue-
na secanda 303
pedum stuporis causa
157
pelliculæ & ligamen-
ta ut differant f. 5.
Sect. 1.
pepones & similes quæ
profiunt 397
periodi febrium quare
uariantur 254
peripneumonicis quæ
conferant 310
peritoneos quid eius-
que forma, situs &
natura 23. 24
pestis medicam. 484.
in Antiochia quomodo
dicamento curata f.
417
pestilentia uel pestis un-
de 440
pestilentia febris causa
nulla efficacior 65
phagocæ tunicae for-
ma & usus 19
philoniū medicam. 175
phlegmon absq; pleni-
tudine quādo fiat 43.
an re uulsione sit ua-
cuanda 496
phleg-

INDEX.

- phlegmone quid 448
 phlegmone suppurans
 quomodo & quando
 secanda 341. iecur
 pulmonē, & pectus
 inuestante quæ uena
 secanda 303. qui
 facile tenentur 45
 occipitis quæ uena se
 ca 309
 phlegmones iecoris cu
 ratio 223. arthri
 tidum curatio 249
 phlegmonis curatio f.
 430
 phlegmonū causæ 130
 phrenitis quid 456.
 unde 141
 phrenitidis febris solu
 tio quibus excretioni
 bus fiat 282. cura
 tio 197
 phrenitidos differentia
 & signa 104
 phrenitidis signa 107
 phrygi lapidis usus f.
 431
 phthisis quid 440
 picra ad qd utilis 370
 pilæ exercitiū ad quid
 utile 372
 pinguedo quid 471
 piper utile cradis suc
 cus 413
 pipercon 2
 pisces saxatiles ad qd
 utiles 365
 pituita an in hepate co
 quatur 493. & me
 lancholia in epilepsia
 36. crassa qd 437.
 quæ corpori utilis 35
 pituitæ causa & origo
 40. aliæ species et
 genera 36. diuersæ
 diuersas affectiones
 producant 99. qua
 tuor species 34
 pituitosa excrementa in
 uentriculo qui 41
 pituitosi humoris in
 thorace contenti in
 d 5 di-

INDEX.

dicia	110	434. generatio f.
plantæ & animalis dif-		439
ferentia	160	pæoniæ radicis usus f.
plantarū liquores quot		431
tuplices	438	polychrista quid 470
plato quid apoplexiā		polychresta medicami-
appellārit	455	na non tuta 188
plenitudo quoad uires		polypus quid 464
quomodo dignosca-		in Polypo & similib.
tur	298	excidi cū affectu par-
plenitudinis utriusque		tes 331
purgatio quæ fol.		pomorum coctorū u-
310. utriusq; quan-		sus 398
titas et qualitates qui-		poplitum uena quando
buz definiantur	98	secunda 302
plethoricæ plenitudi-		porri usus 397
nis signa	ibid.	prægnantium signa ex-
pleuritidi quando non		pulsus 354. proflu-
danda priffana	228	uia unde 353
pleuritidis signa	110.	præteritorum cognitio
	127	128
pleuritides incoctæ q̃		principium morbi qd
dictæ	446	279
pleuritida & insepara-		principij exacti signa
bilia symptomata	113	280. in acutis mor-
podagræ curatio	431.	bis cognoscendi ra-
		tio

INDEX.

- | | | | |
|-------------------------|-----|------------------------|--------------|
| ratio | 287 | do utendum | 253. |
| prodigiorum aliquot | | ad quid utilis | 308. |
| exempla | 473 | 364. quando non | |
| profluvio intersecan- | | dāda pleuritidi | 228. |
| dam uenam cōtingen- | | pro medicamen. | 410 |
| te quid faciendū | 295 | ptissanae modus uomi- | |
| profluvium sanguinis | | tui ciendo | 321 |
| uena secta sedari | 303 | ptissanae usus | 405. |
| sanguinis pręgnanti | | confectio | ibid. |
| um unde | 353 | pudendi partes neruo | |
| profluvia sanguinis ex | | sissimę quare | 63 |
| profundo quomodo | | puelli stercus ad quid | |
| curanda | 339 | prosit | 432 |
| proptosis quid | 463 | pueri conuulsioni ob- | |
| pruna & ficus quibus | | noxij | 44. crudita- |
| pro sint | 367 | te pleni | 38 |
| prurigo unde | 137 | pueris uinum non utile | |
| pruritus causę | 154 | 365. quando uinū | |
| pseudopleuritis quid f. | | utile | 402 |
| 446 | | pueros elegantes gig- | |
| psorophthalmia quid | | nendi exemplū | 482. |
| 463 | | 483. matres cur | |
| pterygium quando per | | debeant lactare | 356 |
| chirurgiam curan- | | pulmo & dexter cor | |
| dum | 331 | dis uentriculus quib. | |
| ptisana in febribus quā | | adsint | 22 |
| | | pul- | |

INDEX.

pulmonis intemperiei
utriusq; indicia 109
affectus plerosq; è ce-
rebro ob consensum
oriri 477. affectus
non omnes esse pleu-
ritidas aut peripneu-
moniam 108
pulmone affecto quæ
vena secunda 303
pulmonum doloribus
quæ uena secunda 302
pulsus mortis indicium
85. febris, quã diu
febris est, non est na-
turalis 260. neti-
tus excretiones indi-
cans 87. febriũ pu-
tridarum 84. 85. 86
durus & uehemens
quid differant 92. 83
tremulus quid 87.
in hecticis nunquam
magnus 86. cordis
maior, quàm arteria-
rum 83. 84. uer-

micans qui 89. for-
micans 88. uentri-
culi affectibus uariis
85. pro mollitie uel
duritie instrumento-
rum 88. uehemens
uires robustas indi-
cat 80. frigidi cor-
dis 87. differentie
secundum ætates 80.
differentie secundum
intermissionem 79.
acceptionis indicium
85. raritas pericu-
lo, a sola uehementia
utilis 81. inequa-
lis collectiui quid &
quæ causa 81. ictus
quid propriè 82.
priuatio quid 86.
q̃ inter se coire pos-
sint 83. facultatis so-
lutæ et expressæ qua-
les 84. myuri quid
444. myuri q̃ 89
pulsus quæ facultas
matet

INDEX.

mutet 494
 in Pulsu geminus mor-
 tus & gemina quies
 79
 pulsum usus duplex
 79. inaequalitas
 accessionibus quid in-
 dicet 85. uaria ge-
 nera 445
 punctura uentriculi cau-
 sa 156
 purgandi ratio per san-
 guinis missionem 290
 purgantia quae dicantur
 1. 2. cum in-
 dicto exhibenda 308
 purgantium medicamen-
 torum ordo in pur-
 gandis humoribus 192
 purgatio quo pacto fie-
 ri debeat ubi sanguis
 mitti non potest 296
 per uomitum quomo-
 do fieri debeat 319.
 utriusque plenitudinis
 310

purgationis capitis me-
 dicamentum 536
 pus laudabile 62
 putredo quid 439
 putrefacientia medi-
 camenta quae dicantur
 471
 putrescentibus medica-
 camentis apta medi-
 camenta 326
 putridae febres quae sunt
 460
 putridarum febrium opti-
 mum remedium 275
 putridi humores quomodo
 curandi sint sunt
 165

Q

Qualitas & humor
 commutantur 137
 Quartanae febris exer-
 citium 376. febris
 curatio per sangui-
 nis emissionem 305.
 per theriacam cura-
 tio 278
 quara

INDEX.

quartus dies iudex se-	usus	26	
ptimi	284	repletio quid	437
quies in pulsu quomo		repletionis duo gene-	
percipiatur	83	ra	373
quotidianæ febris solu		repurgantia quæ	470
tio quibus excretio-		resolutio quid	458
nibus fiat	282	respirationis organo-	
quotidianæ febris sig-		rū auxilia 210. gra	
na	263	dus quot sint 55.56.	
		difficilis causæ & si	
R		gna 108. organa f.	
Radicum usus	397	22.48. difficilis	
Rarefaciens quid	470	causæ in anguia	149
Ramex uariosus quid		respirationem nō à no	
454. carnosus qd		bis fieri exemplo pro	
454		batur	480
raphani usus	397	retiformis plexus ubi	
reciproci pulsus qui f.		locatus, eiusq; forma	
445		& usus	17
regij morbi curatio f.		reuulsio	181
219		reuulsionem lōgissimē	
renes bilem attrahere		à particula affecta	
cum lotionē & alijs		molienda	74 75
quām emulgentibus		rhythmus in quib. pul-	
non egēre	54	sibus dignoscatur	8.
renum ulceratorum in		in pulsu quid	79
dicia 120. sius &		rigens	

INDEX

rigentium causa & cu-
ratio 139

rigor & horror unde
149. quid 443.

& tremor quid dif-
ferant 442

rigoris in tertianis &
quartanis cause 149
iudicatio in febris
286

risus ex auditu causa
nulla 160

ruptio unde 130

rusticorum iheriaca 427

rys quid 463

S

Salina ad quid pro-
sint 435

Sa si sapores 422

Sanguificatio quomo-
do fiat 52

Sanguis in uenis & ar-
terijs qualis sit 8.
uentriculorum cordis
9. ubi celeriter sit
emittendus 296. in

quibus morbis tuto
detrahi possit 299.

in quib. uenis sit mis-
tendus 300. quo-
modo mittendus ue-
re ineunte 290. di-
citur confusio humo-
rum 32. in crudita-

te nunquam mitten-
dus 293. probus
unde & ex quibus fe-

at cibis 39. in sy-

nocho quando detra-

hendus 275. quan-

do mittendus in lasi-

tudine ulcerosa 293.

partu relicto quomo-

do euocandus 355.

mittendus si uires co-

stent 299. necessa-

rio mittendus quan-

do 296. Serosus ue-

hiculum puri sangui-

nis 52. purus nul-

lus in corpore 437.

pro clima. um ratio-

ne dea

INDEX.

ñe detrahendus 533.
 quibus detrahendus
 295. ærugineus f.
 438. quando non
 mittendus et amfio-
 minia suadeant 291.
 292. quādo mitter-
 dus 301. nusquam
 melior, quā qui in
 mammillis conficitur
 54. in feбри conti-
 nenti mittendus 299
 quibus, quando, et
 quantus detrahendus
 291
 sanguinis fluxus ē nari-
 bus curatio 430. flu-
 xus signū 107. flu-
 xionib. quomodo suc-
 currendū 242. flu-
 xus ē naribus curatio
 207. 208. suppres-
 sioni apta medicamē-
 ta 335. ante missio-
 nem quæ consideran-
 da 294. redundan-

tia quando uenæ se-
 ctione curanda 180.
 profluuiū ex profun-
 do quomodo curāda
 340. missio ad li-
 bras quinque 297. ef-
 fectus in corpore 57.
 crassiciui 139. e-
 iecti aut uomiti signa
 110. ex pulmone re-
 iecti tria signa 119.
 missio quid præstet
 pharmacis purganti-
 bus 297. per nares
 eruptionis curatio
 193. mittendi ratio
 ubi habenda 297.
 missio quando diffe-
 renda 296. fluxus ē
 naribus alia curatio
 194. serosa pars se-
 cūdū magis uel mi-
 nus noxia 33. redun-
 dantiam non ubique
 postulare uenæ se-
 ctio-
 nem 298

sanguis

INDEX.

- sanguini supprimendo
 optimū cataplasma
 339
 sanguinem detracturo
 quæ sint expendenda
 298
 saniei collectio quan-
 do fiat 73
 sanis & ægris signa cō-
 munia 125
 sanitatis tuendæ ratio
 359. regula 360
 sanitati quæ exercitia
 prosint 359. 360
 sanitatem quid seruet
 359. conseruantia
 medicamenta 403
 sanitate q̄ plerūq; uten-
 tur 45
 sapores acres 419
 saporum in cibis diffe-
 rentia 402. uaria
 genera 418. 419.
 differentia 418
 ex sapore morbi signū
 101
 σαρκόκλοι qui dicā-
 tur 454
 scabies unde oriatur f.
 37. 235. quid 452
 scarificatio quid prosit
 302. profundior
 quando cōueniat 342
 scarificationis curatio
 182
 scarificatione quando
 in ulceribus utendum
 336
 scilliticum medicamen-
 tum epilepticis pro-
 dest 196
 scirrhus quid 449
 scirrhus confert suffu-
 migatio 220
 scirrhi species 451
 scirrhum facillimè con-
 trahere, hepar, lienē
 & renes 72
 scirrhosorum tendonū
 curatio 245
 scolopendri usus 414
 scythæ iracundi 489.
 ε
 εντ

INDEX.

cur raro elephantia-	fit uel quomodo uita
si laborent. 240	ri possit 368
sedis ulcerum quib. cu-	sensus lesio an sit à ner
rentur 234	uo leso 498
semen ut concipiat mu-	sensuum purgationis
lier 484	medicam. 536
semen in utero quomo-	septimus dies inter de-
do augeatur 473	cretorios præcipuus
semina herbarum quæ	284
optima 398	septimum diem qui imi-
senectus & inclinans	tetur 284
ætas qd differant 42	septi transversæ curatio
senis pulsus quilibet 80.	nis exemplum 475
senes plerunq; debiles	septi transversæ seu dia-
44. cui morbo ma-	phragmatis caput f.
ximè obnoxij sint f.	1. Sect. 1.
128	serapij ex aceto usq; .
senū exercitia qualia,	409
& ad qd utilia 377.	sermo unde 56
uictus ratio 366	sermonis & uocis or-
senibus quibus balneū	gana 19
conueniat 368. uinū	serosa pars sanguinis
optimum 366. ui-	secundum magis uet-
ctus humectans 367	minus noxia 33
senium humidū esse 42	serpentis exuuium ad
quomodo pducî poss-	quid utile 435
	serto-

INDEX.

rtoma & uertigo un de	105	periculosus ubi	111.
xti et septimi diei dis similitudo	284	causa et curatio	209
ca temperatura om- niū pessima	45.	singultus indicatio	121
pora quæ citius mori- riatur	240	sinus quid	448
cæ partes quæ dican- tur	462.	sinuum & calorum in cute ulcerum curatio	
rici species	185	fitis causa	153. (325
carum & contraria rū temperaturarum causa	47	fitis remedium	394
ci morbi qui curen- tur	68	fiticulosi unde fiant	99
ccis uigiliæ infestissi- mæ	168.	solidarum parium nu- trimentum	48
balnei utilitas	583	somnus quibus ægrotis utilis aut inutilis f.	
ccitatis gradus quot	185	170. quibus mor- bis utilis	171
ccitati corporum suc- cedit frigiditas quan- do	46	somni effectus	154
gnum quid	106	somnolenti unde fiant	99
ngultus quid	458.	sonitus aurium causæ & curatio	205
		spasmi causæ	147
		spasmo quæ ætas ple- runq; laboret	44
		sphacelos quid	453
		spicata unguenta	370
		spicanardi usus	415
		spina & guttur per cō- e 2 sensum	

I N D E X.

sensum offenduntur	211.222	
114		spondylarum humiditas crassa & uiscosa
spinæ partes quo altiores eò prestantiores	48	
18		spui pauci in magna iussi causa 150
spinalis medulla quid et quomodo à cerebro differat	17	stabilis pulsus q 445
spiratio quid	439	stercus canis ad quid profit 432
spirationis defectus qd significet	125	sternutatio bona quando 98
spiritus angustia quid		sternutationis uomitus & iussus usus & causa 144
466. in uenis et arterijs qualis sit	8.	sternutamenti usus & mouendi ratio coryza 344
quibus de causis amittatur	97	stætæ usus 431
spiritus cohibitio quibus affectibus profit		stomachi doloris curatio 211
478		stomachus qui dicatur 466
spirituum & facultatum usus	67	strabilismus quid 442
splen seu lien qualis, et eius usus	26	stridor dentium quid f. 442.458
splenetici qui dicantur		strumæ quæ sint 454
467		struma-
spleneticorum curatio		

INDEX.

- strumarā curatio 329
 στυφνὸν quid 335
 stupefacientia quando
 fluxum sistentibus mi-
 scenda 211. qua ra-
 tione sanguinis reie-
 ctionem miscenda
 174
 stupor quid 443
 stuporis pedum causæ
 157
 succi mali causa 49.
 vitiosi cibaria quot
 triplicia 40. crassi
 glutinosi q; alimenta
 401
 succorum crudorum re-
 medium 413
 sudor & uapor quid
 differant 438
 sudoris frigidi origo et
 signa 115
 ex sudore morbi signa
 101
 sudorū qualitates 116
 suffocatio ob repletio-
 nem 352
 suffocationis uteri cau-
 sæ 348. curatæ ex
 emplum 356. cura-
 tio 356. 357
 suffocatione pro cura-
 ta Galenus accepit
 400 aureos 358
 suffusionis causæ 158
 suffusionum causæ 195
 suilla an ciborum opti-
 mus 495
 supfluitas cuius q; par-
 tis dispositionis est f.
 103
 surdastri qui 464
 syderatio quid 453
 symptoma prius cura-
 re quam morbū quan-
 do conueniat 176
 symptomatum differen-
 tiæ quot 177
 syncope quid 132. qui
 maxime periclitentur
 77. 78
 syncopes curatio 215.
 e 3 uomi-

INDEX.

- vomitu curāda 320.
 seu deliquiorum ani-
 mi causæ 128. ge-
 nera & species 133.
 causæ quot sint 131.
 ex flatulento spiritu
 curatio 243
 Syncopen uitare quib.
 rationibus conueniat
 135
 synochorū species 275
 generatio & qd 271
 curatio 275
 T
 Tabes quid 440.
 uel marasmus duplex
 441
 Tabis species & cura-
 tio 235
 Talpe uisus qualis 160
 taurinum cornu ad qd
 utili 430
 temperatura quæ peſsi-
 ma sit 45
 temperaturarum cōtra-
 riarum causa 47
 tempora morborū quæ
 & quot 278. 279
 temperies seruāda 530
 tendonis generatio &
 usus 48
 tendones & nerui quot
 modis ossibus coha-
 rent 8. medij in-
 ter ligamenta & ner-
 uos f. 4. sect. 1.
 tendonum scirrhosorū
 curatio 245. color 6
 terebynthine usus 415
 terræ intestina ad quid
 prosint 436
 tertianæ febris curatio
 265. solutio quib.
 excretionibus fiat f.
 282. & quartanæ
 febris signa 262. 263
 tertianos balneo cura-
 ri 379
 testiculi neruorum u-
 sus 63
 testiculorum qualitates
 54. uenæ & arte-
 riæ

INDEX.

- ria à longinquo ijs ac
 cedunt f. 2. Sect. 1. 477
 theriaca quomodo u-
 tendum 371. qui-
 bus utilis 416. 417
 theriacæ usus 237.
 compositio & usus f.
 229. 417. propi-
 nandæ quantitas 416
 thoracæ œdemate nun-
 quam infestari 71
 timidi quomodo inci-
 dendi 345
 timoris causa 141
 tinesmos quid 469
 tityi fabula 490
 tonicæ actionis uehe-
 mentis signum 15
 torpor quid 443
 trachoma quid 453
 tremor & rigor quid
 differant 442
 tremoris causa & cu-
 ratio 146. 148
 tremoribus quando ue-
 næ sectio conveniat

- trifolium decoctum ad
 quid utile 411
 tristitiâ quid læuet 171
 triticeæ farinæ usus 423
 triticum mansum ad
 quid proffit 435
 tumoris excidendi de-
 liberatio 348
 tumores variari pro
 fluentium humorum
 differe ijs in parti-
 bus similaribus 178
 tumorum qui facilius
 curentur 311
 tumoribus nullis adhi-
 benda attenuantia 218
 tussis differentiæ & cau-
 se 108. generatio
 ex intemperie 208.
 curatio cōmunis 150
 208. usus & cau-
 se 144

V

- Vacuandum quando
 sit 312

I N D E X.

Vacuare crudos succos periculosum 182. corpus non repletum quando licet 179	uenæ usus 9. sectio tremoribus et hydro pifibus quando con= ueniat 477.478
Vacuatio quando ne= cessaria 165	uenam nullam esse in oculi partibus 59.
uacuationis in febre ob= seruatio 254	secandi scopi duo f. 290
uacuationes cur facien= de 368	uenæ quando sint ape= riendæ 291. & ar= teria testiculorum et mammarum à lōgin= quo ijs accedunt f.2.
uapor & sudor quid differant 438	Sect.1. amputatæ regenerantur, & nō
uari quid 462	arteriæ quare 47.
uarices quid 455	q̄ sint secandæ 300.
uatij quid 462	& arteriæ quib. uijs ingrediantur in me= dullam sp̄malem 59
uehiculum puri sangui= nis quod sit 52	uenarum sectiones quā do fieri debeant 290
uena quæ quibus affe= ctis partibus secanda 301. ubi celeriter sit secanda 296. & ar= teria in cæteris cohæ= rent; in cerebro diuer= tunt f.2. Sect.1. sem= per in directo secan= da 304	uide sanguis. coar= ctatio 488. spiri= tus qualis 8
	uentiones ad quid uti= les

INDEX.

les 373
 uenenū acutissimū 482
 ueneni remedium 413
 uenter durus quib. mol-
 liendus 315
 uentris solutio in seni-
 bus quib. faciēda 358
 uentriculus quibus ci-
 bis saturetur 24
 uentriculi cras morbo-
 rum causæ 151. do-
 loris curatio 211.
 ex fluxione morbi
 pessimi qui 68 for-
 ma, situs & usus 23.
 intemperies an facile
 curetur 495. & ce-
 rebri confusi signum
 105. affectioni pra-
 uæ medicamentū con-
 ueniens 216. 217
 uētriculo imbecillo ex
 diarrhoēa remedium
 218. imbecillo cō-
 ferentia 213
 uentriculum & intesti-

na duplici modo nu-
 triri 24. cordis san-
 guis & spiritus 9
 uentus uulneribus ad-
 quid agendum 334
 uentorum & aëris dif-
 ferentia 189
 uenus cui conuenit in-
 temperiei 361. sic-
 cis inimicissima 45
 ueneris usus & scopus
 360. effectus 155
 ueneriei usus illiciti in-
 commoda 241
 ueris principio uacuā-
 dum 312
 ueris initium 47
 uere incunte quomodo
 sanguis mittendus f.
 290
 uermicans pulsus q 89
 uertebraarū humiditas
 crassa & uiscosa 48
 uertigo unde 105
 uertiginis curatio 194
 uesica & matrix in mu-
 liere

INDEX.

- liere qd differant 28
 uesicae utriusq; constitu-
 tio et usus 26. 27.
 et ani musculi quare
 contrario motu non
 moueantur 11. et
 ani musculorum offi-
 cium ibid.
 uesparum morsus cura-
 tio 433
 uetula Athenis Cicuta
 uescens 491
 uictus humectans seni-
 bus 367. ratio quæ
 manet et sero 168.
 364. ratio duplex
 360. ratio post et
 exercitium 361
 uidue utero suffocate
 curatio 352 cur ali-
 quando grauius labo-
 rent 352
 uigilia prohibere quo-
 modo 195. 196
 uigilia q. et quæ no-
 ceant 50
 uincula non iniicienda
 parti inflamata, sed
 illi opposita 71. qui-
 bus uipera sit pro-
 praefocata, tumoris
 gutturis conferre 432
 uinum astringens 404.
 optimum senib. 366.
 pueris non utile 365.
 dulce et nigrum ad qd
 utile 391. hepati-
 cis utile 392. immo-
 dicis exolutionibus
 utile 171. pueris
 quare utile 402.
 uenenis aduersarium
 413
 uini dotes 404. me-
 diocritas quid profit
 391. uarie speci-
 es et differentie 391
 uina aquosa ne aceſcant
 430. 431
 uiperae quomodo cicu-
 rentur 483
 uiperarum morsus uis
 et

INDEX.

- & curatio 487.
 morsus curatio 433
 uir quidam mente cap-
 tus per tredecim di-
 es, & postea sana-
 tus 479
 uiri corpus purius foe-
 mine corpore 42
 uirge constitutio &
 quid differat à liga-
 mentis 28
 uiriū substantia ex qui-
 bus constet, & qui-
 bus conseruetur 51.
 signū certissimū 101
 uirtus ratio 539
 uirtutes naturales una
 sunt 530
 uisus restitutio 486
 uiscerum affectibus ua-
 lentiora medicamen-
 ta conueniunt 190
 uita humana brevis f.
 529
 uita omnis ex cordis tē-
 periei tendet 73
 uitæ longioris signa f.
 103
 uitrea pituita q̄sit 34
 ulcerosus affectus un-
 de 137
 ulcus quibus sit abluen-
 dum cum opus est f.
 326
 ulceris maligni curan-
 di ordo 344. ma-
 ligni curatio 337.
 in carne facti curatio
 244. ligandi mo-
 dus 337
 ulcera ad uinum quan-
 do excidi possint f.
 337. cacoëthe quæ
 460. capitis an sint
 uomitu purganda f.
 498. ex pituita nō
 esse aperienda 235.
 maligna quæ dicantur
 450
 ulcerū curatio per sca-
 rificationē 336. in-
 ueteratorum cura-
 tio

INDEX.

- No 432. ambustorū
 curatio 434. causæ
 140. ueterū cura-
 tio 176. sedis quib.
 curentur 234
 ulceribus putrescenti-
 bus apta medicamen-
 ta 326. malignis
 quæ medicamēta ad-
 hibenda 326
 unctio 376
 unguenta foliata & spi-
 cata 370
 unguis quid 463
 uocis & sermonis or-
 gana 19. 22. 444.
 acute & grauis cau-
 se 150. cassitate cau-
 se 151. intensio qui-
 bus morbis p̄sit 183
 uoluntariarum actio-
 num per somnū ra-
 tiones 13
 uolatilium carnes quæ
 optime 390
 uomitus quando sit cui-
 tandus 533. in sym-
 cope quibus ciendus
 320. epilepsie pro-
 fuit 211. quo pacto
 ciatur. 322. causa
 156. sterminationis
 & tussis usus & cau-
 se 144
 uomitui commoda quæ
 321
 uomitum singulis men-
 sibus præcipiebāt ue-
 teres quare 319
 in Vomitorijs quæ ui-
 tanda 320
 urina pessima quæ 92
 laudabilis unde fit
 62. optima quæ sit
 91. omnium opti-
 ma quæ sit 96
 urine indicationes 51.
 cognitio 540. pin-
 guis significationes
 94. uariæ indicatio-
 nes 95. profluij
 definitio 469. sedi-
 mentum

INDEX.

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|------|
| mentum album quid | ob inaniitionem | 351 |
| significet 56. turbida | suffocationis curatio | 350. |
| triplex differentia et | suffocatio in | |
| effectus praesignifica | tuidis ex seminis re | |
| tio 92. quib. febr. | tentione 352. dolo- | |
| bus plurimum subsi- | res ex ocio | 349 |
| dentia habeant | utero inflammato quæ | |
| urinam quid prouocet | uena potius secanda | |
| 423. qd mouat | 351 | |
| 436 | uuarum passarum usus | |
| urinarum crudarū pes- | 400 | |
| sima 93. fursuracea | uulneri receti quid ma- | |
| rū significationes 94 | xime profit | 335 |
| quæ sit optima in æ- | uulnera intestinorū cu- | |
| grotis 92. descri- | ratu difficilia | 231. |
| ptio | epiploi uel peritonei | |
| 91 | integro altero facilia | |
| urinæ quædam pilis si- | 231 | |
| milia | uulneratis in uentre q- | |
| 475 | situs esse debeat | 334 |
| urinas spectandas in fe- | uuulosarum dispositio- | |
| bribus | num curatio | 216 |
| 91 | uuulus quid | 468 |
| ursæ generatio | | |
| 483 | | |
| uteri suffocationis cau- | | |
| se 348. offensiones | | |
| unde 353. cōuulsio | | |

Finis Indicis Aphorismorum.

ERRATA QVAE NOBIS IN-
uitis, Can lide Lector ob obscurum & barbarum
autographon irrepserunt, sic emendabis.

Nota, prior numerus paginam,
posterior lineam denotat.

Pap. 2. linea 8. leg. contrarijs ibid. lin. 11. pro
ducta ib. 16. pectoris 3. 21. qui 5. 16. quæq; 6. 12.
nullus 11. 25. particulam 11. 2. ijs. ib. 26. uentris
13. 4. uariè ibid. 5. bra, & quum 14. 16. tungitur
ibid. 23. sanis 16. 3. firmitus ib. 5. cogitationi ib.
15. sanis. ib. 18. purgentur 19. 23. læ locum 20. 8.
quæ ib. 16. cornu 22. 5. dele quæ 23. 6. simus fieret
item oblongus 25. 7. ijsq; ib. 8. affigitur. ib. 13. uen-
trculus ib. 27. alterationem ib. 21. affixionem 26
25. re. pur. 27. 18. citra noxā ib. 23. Singularis 16
24. fuit 28. 22. tiā, tūm 29. 3. sensus 32. 15. scarif.
34. 19. horrerent 35. 5. morem ib. 18. elaboratum
ib. 22. factus 37. 10. præter ea 38. 22. de ib. 25. f.
cū 40. 9. renum 42. 23. senium 44. 22. qui 46.
6. marasmus 47. 3. spermatis ib. 12. fiat ib. 26. effi-
ci 50. 19. alterationem 51. 26. cum 52. 25. partē
53. 6. de lema. ib. 12. intestinum ib. 23. quidā 54.
15. præd. 56. 15. bus insunt 57. 5. in sang. ibid. 22.
sanguinis. ib. 25. perpatitur 58. 13. sanguine puro
ib. 14. pro ib. 19. locus 60. 8. particulis 61. 2. pal-
pitatio 62. 6. participant 63. 21. differentiis ib. 13.
Glauc. 64. 25. dictus 65. 18. modicū ib. 19. exces-
sum

sum 68.23. percuratu 69.12. cephalea ib.26. influant 70.12.
 tenuātia 71.17. caputūe ib.21. sin.73.23. Nemo 75.12. cauē
 da 76.21. crys.77.13. medicamētis 79.19. differēt ib.26. qe=
 tis 80.18. senis i.23. simus est iuuen.81.18. comitatur sēp cor
 dis ib.21. cōpressio 84.20. ordinis 85.5. differēt.86.20. distē
 sionis 87.12. paruos 89.8. differētia ib.16. emarcuerūt 92.3.
 nephrit.94.4. uenose i.14. Diabete ib.18. hordeaceæ 99.26.
 uerō 100.1. euacuat.101.14. ardētissimū 102.12. quacūq; ib.
 18. amurice 105.9. lues nau.107.12. dolorifico i.15. ē narib.
 108.25. oportet 109.16. spiratio 111.8. inconst. ib.12. hepati
 112.25. laborat 113.16. ouor.114.22. peruranij 116.2. autem
 ib.7. saporem ib.12. sū'ne 118.6. ait 120.5. Phoenicium 122.
 15. sanguinis 128.3. cibus 129.8. patiuntur 130.14. scilicet
 131.23. uertar 132.12. nouit ib.22. reprehendar 133.8. scil.
 ib.11. cū aut diuturnitate 134.12. est 135.23. auxiliēis 136.
 19. perferri 139.19. mento 140.10. arodendi 141.24. exter
 nis 142.21. membranarum 144.3. aut ob ib.11. arden
 tes ib.14. different. ibid.25. prioris 145.8. dolere 148.9.
 part. ib.12. sitq; 149.14. est. 152.15. internis ib.17. im
 pensius ibi.18. supernis, ib.19. tunc. 153. replent ibid.15.
 splen. 154.7. incidat 156.12. quo 160.2. manuum ib.3. ridi
 cularū 161.12. imbecillia 162.12. prior uenies 163.17.
 minuas ib.22. conferues 164.22. facta 165.12. perniciosi
 167.24. sanitati & 25. Ario 168.5. gustare 169.25. pro
 pinatur 170.16. interiores ib.18. uiresq; 171.4. internis
 & externis ib.9. cogitio ib.16. siccis 173.8. dissolutionem
 175.8. stupefaciat ib.23. penetrat 177.29. cæcolor 178.6.
 arc.

are. 178. 22. illa cibis 179. 5. dele à astrin. ib. 6. intemp. ib. 11.
 antiosus 180. 15. abundantis 185. 3. communia 191. 16. si 193.
 18. nare prorumpat 195. 25. sedantur 197. 8. redundante ib.
 18. detractone 198. 13. diffecet 199. 2. uimorū. ib. 11. cremore
 ib. 20. faciat 200. 3. Brassicæ folia 201. 17. fœminis ib. 23. im-
 maturarū ib. 25. cydonij 202. 7. affuso ib. 18. substantia 205.
 9. diffecātibus 206. 20. hæmatites ib. Stibium 207. 15. calidē
 208. 14. du. b. 210. 1. pueris 211. 3. cōfl. ta 214. 11. leni 217. 4.
 os 218. 9. uinciri 219. 12. dele & 220. 8. uomitu ib. 15. omni-
 um q; 223. 7. exquisitiss. ib. 11. sine 226. 23. astringentia 229.
 1. alio ib. 22. quæ 231. 11. numeratur 233. 25. ex sang. 235. 9.
 ciliis 236. 15. ministrato 239. 9. medicamento 240. 1. caninē
 ibid. 12. cutem 241. 26. quam 248. 2. coxend. 249. 9. callos
 255. 13. tenuium cor. ibid. 20. offici, oportet. 259. 7. percip. ib.
 8. penit. ib. 19. mordaces manu tan. 260. 14. & quies duab.
 261. 19. significant 264. 14. intumes. 265. 16. inguinis 266.
 1. eros. 267. 17. dicitur 269. 7. uigere ib. 8. appareant ib. 19.
 salsa 271. 5. si hæ. 272. 3. actamd. 280. 24. sine 285. 2. maxi-
 mē 286. 12. attingat 287. 20. nephritis 288. 8. sunt ibid. 19.
 perfecta 289. 3. hi 9 missionem 295. 2. hæmoptoicis 304. 11. c̃
 di. 305. 24. arbitraris 311. 26. uimolentos 365. 13. seruatur
 383. 12. Quos 395. 5. Thoracis 396. 22. oleraceis 397. 13.
 porri. 410. 3. oxymeli 429. 26. cerumi 431. 8. domum ib. 20.
 comitiale 433. 25. uesparum 434. 8. ulcera ambusta 435.
 21. bullium 436. 8. albumen 437. 2. dele quibus 447. 9.
 leyxice 485. 11. fame.

Cetera diligens Lector facile proprio
 Marte emendabit.

RABI MOYSIS APHORISMI, EX

Galeno collecti.

SECTIO I.

De situ, forma & usu partium cor-
poris humani.



VSCVLIS om-
nibus, aut in i-
psū caput ner-
uus infigitur,
à cerebro, uel
spinali medul-
la facultatē sen-
tiendi, ac mo-
uendi adferēs:

aut omnino in earū partium aliquā,
quæ capiti subsunt, aut certē non in-
fra medium corpus. Ad caudam au-
tem nunquam: alioqui principium
ea esset Musculi & non finis. Gal. 7.
de us. part.

2 Caput septi transuersi, ad quod
annectuntur fibræ: & in quod nerui
ipsi descendunt, in medio eius consi-
stunt: extrema autē, seu fines sunt, quæ

A cit

circumscribunt ipsum or. 13. de usu
part.

3 In cæteris corporis partibus, a
deò propinquæ sunt semper uena &
arteria, ut mutuò sese contingant, ac
uena semper arteriæ incumbât: at in
cerebro quod satius esset ex locis di-
uersis, aut potius contrarius uasa in
ipsum inseri, à corde sursum per collū
uenæ atq; arteriæ ad ipsum usq; ca-
put simul prodantur, inde hæ quidē
ad plexum retiformant. Illæ autem
ad summum capitis uerticem diuer-
tunt. 9. eiusdem.

4 Maior pars totius arteriæ ad iu-
gatum tendens, ossi medio pectoris
iungitur. Vena autem caua illi subdi-
tur, ex quo arterijs positio compara-
tur opportunissima: ut quum per col-
lum diuisum feruntur arteriæ quidē
in profundo sint: uenæ autem ipsis
incumbant. 16. eiusdem.

5 Venæ atq; arteriæ in suū quæcūq;
ut sibi est proximum organum fun-
duntur, ad testiculos autē atq; mam-
mas natura eas, à longinquo porre-
xit,

xit, multipliciterq̃, priusq̃ inserta-
ret, inuoluit, ut diutius in eis uasis
sanguis moraretur, & lac atq̃ semen
exactim coquerentur. Ibidem.

6 Natura ossibus exiguas adeo tri-
buit uenas, ut ne clarè quidē cernan-
tūr. Nusquam autem uena ab arteria
relinquit̃, sed ubi uas arteriosum ui-
deris, ibi necessum est uenam etiam
adesse: at uenę sine arterijs, quanquā
pauce admodum: in corpora quæ ad
cutim pertinent. Veluti in cruribus
& anterioribus atq̃ externis brachij
partibus disseminantur. Ibid.

7 Retiformis plexus ascarotiti-
bus arterijs ad basim cerebri conuo-
lutis oritur, quo circa neruo lēso aut
conuulso, lēduntur simul & arteriæ.
10 de pulsib.

8 Vbi teretes syndesmi tendones-
que uisunt̃, p̃ dissectionū sunt ignari
neruos eos imaginant̃: potissimū &
q̃ tēdones multo duriores eos ner-
uis esse non intelligant. At ubi lati
sunt eos à neruis diuersos esse, pu-
tant: cæterum ipsos à sese discernere

A 2 non

non ualent, neque nos asserimus, nisi ex dissectionis ratione: omniū quę isthic continentur partium naturā didicissemus. 6. methodi.

9 Nullus neruus, neq; in ossa, neque in cartilagine, neq; in ligamentata, neq; in quasuis glandulas, quarū duplex est natura, inseritur, quę motu uoluntario aut sensu non indigēt. Glandulæ uerò ad succos animanti utiles comparatæ, quemadmodū arterias & uenas, ita & neruos habuerunt unius sensus gratia. Et ex ossibus omnibus, solis dentibus neruus mollis inest, tū quod nudi ijs, quæ accidunt sint expositi, tū quod una cū lingua sentire oportuit sapores ac diiudicare, non aliter quàm cæteras oris particulas. 16. de us. part.

10 Tendones tātò sunt duriores neruis, quantò ligamētis molliores: quin & mole corporis tales, ut qui ex ambobus maximè farti sint. Multisq; locis neruos sexcupla, multis etiam decupla crassitudine superant, & meritò, siquidem nerui & ligamēti usum

et usum exhibere eos oportebat.

Item est ligamentū quidem omne insensibile, nervus autem omnis sensu præditus: tendo uerò neq; insensibilis qui est nerui particeps, neq; ita sensibilis ut nervus, non enim est nervus tum. 1. de motu Musc.

11 Tria sunt instrumenta corporis, forma prorsus similia, nervus, ligamentum, & Tendo. Quorum hic quidem alligat Musculos subiectis ossibus, in quorū capita munita cartilagine inseritur, estq; nervosus: utpote ex nervo, & ligamento compositus, ac nervus omnis rotunda est figura, quoq; diuersa ratione. Tendo non item, sed sunt quidam rotundi, alij latè. Ligamenta autem pleraq; lata & ampla sunt sicut pelliculæ. 1. de placitis Hipp. & Plat. qui nondum extitit.

12 Omnes pelliculæ sunt tenues, & molles, ligamenta uerò ratione alterius magis uel minus crassa & dura. Item Ligamentorum quedam media sunt inter nervum, & cartilaginē.

A 3 Cæte

Cæterorum autē duriciem, nec mem-
brana, nec neruus, nec durissimus,
neq; tendones attingunt. Ibidem.

13 Neruus, ligamentum, & tendo-
tria sunt organa, alba solidaq; pariter
& sanguinis expertia, quæ in fibras
soluta scinduntur, præter ligamenta.
Ea enim, ob duritiē, nullō modo re-
solui possunt. Ibid.

14 Musculus est instrumentū non
sensus, sed motus, etiam si utriusq; sit
particeps, quia nullus motus volun-
tarius potest sine Musculis fieri, &
sensus inest uniuerſis particulis, que
nerui sint participes. i. de motu Mu-
scul.

15 Ligamenta per quæ ossib. Mu-
sculi colligantur, coalescuntq; mem-
branas circa ipsos gignunt, & quas-
dam intro propagines in ipsam car-
nem Musculorum demittunt. Ibid.

16 Omnis tendo, in ossiū aliquod
omnino inseritur, non tamen om-
nis Musculus, in tendonem desinit,
In nullo enim Musculorum mouen-
tium linguam (constat autem ex ua-
rijs

rijs Musculis) tēdo nascitur, quæ nul-
lum os erat lingua motura. Similiter
mouentium labra, oculos, faciē nul-
lus in tendonem desinit: Item eorum
qui quippiam aliud, quam os mouēt
nonnulli, ueluti in oculis lingua, te-
stibus porri, laryngæ, &c. ceteri uerò
omnes desinunt. Ibid.

17 Quibus uasa, à natura astrictos
meatus sortita sunt, facile in iecoris
& renum obstructionem incidunt.
Quippe in uenis, quæ per caua ieci-
noris, aut per mesareon feruntur, re-
dundans humor necessario, uel pu-
tredinem contrahit, uel continentes
particulas phlegmone afficit. Gal.
de Euthym. & cacothym.

18 Extenuata corpora fiunt ex in-
equali membrorum temperatura, ue-
luti si quibus uentriculus calidissi-
mus, cerebrum uerò frigidissimum,
uel contra fuerit: aut si quibus pul-
mo & pectus frigida, uentriculus ue-
rò calidus, eodem modo etsi hepate
calido, reliqua sint frigidissima, atq;
ita in cæteris. 3. de alimentis.

19 Ossa maiora, quęcunq; neruo aut tendoni necessario cohærent, uel perforantur, uel membranis cooperiuntur, & neutro participant, quę nuda fuerint. Vbi igitur hęc, quę membranis cooperiuntur, nerui, uenę, aut ligamenta iunguntur, ibi duriores sunt earum membranarum partes, ut ab hęc conseruentur. 2. de us. part.

20 Sanguis & spiritus in uenis, & arteriis sunt calidi, at sanguis arteriarum multo subtilior & uaporosior est, eo qui in uenis continetur. Quemadmodum a contrario uenarum spiritus id quidem paucum atq; caliginosus est, eo qui in arteriis habetur.

Communis est autem utrisq; *ἀναστόμις*, hoc est, mutua quędam oscillorum apertio, ubiq; in corpore per quam exactis quibusdam & angustis uis sanguinem ac spiritum sibi uicissim, communicant. Gal. 6. de us. part.

21 Itaq; cordis ipsius uentriculi, pulsantes, quidem ambo apparēt aperto thorace, non tamen ex æquo
in u-

APHORISMI,

in utroq[ue] sanguis & spiritus contine-
tur, abundat enim in dextro quidem
sanguis, in sinistro uerò spiritus. Ibid.

22 Leuissimum eorum, quæ sunt
in corpore, est spiritus, secūdū hūc
halitus: tertio sanguis exactē certus
absolutusq[ue]. 3. de uirtut. naturalib.

23 Quædam sunt re ipsa duo seu
gemina, quæ unum tamen uulgò es-
se existimantur, ea sunt cerebrum,
lingua, maxilla, pulmo, matrix, & hu-
iusmodi: in his enim, dextræ sinistris
partes sunt, & numero partes, & ma-
gnitudine, & colore, & uirtute, liqui-
dem uenarum & arteriarum, adeoq[ue]
neruorum, quantum in una est earū,
tantundem, & in altera reperitur. Ga-
len. 6. de opificio Dei, qui nondum,
quod sciam extitit.

24 Lingua duas habuit in seipsam
insertas arterias: utrinq[ue] uidelicet u-
nam: duas itidem uenas: at neruorū
coniūgo eius duas, mollem unam, al-
teram uerò duram: ac mollem quidē
in extremam ipsius pelliculam, durā
uerò in eius Musculos distributam:

A s ut

ut illa sapores discernere, hac uerò uoluntario motu moueri possint. II. de us. part.

25 Quatuor omnino differentia motuum reperiuntur, in musculis: nā aut contrahuntur, aut extenduntur, aut transferuntur, aut tensi manent. I. de motu Musc.

Addit Moyses.

Ex his uerbis & alijs Galeni in eodem libro de motu Muscul. summam collegi, ut complicitur membrū, animali facultate iuuante, contrahi ad caput suum oportere: ut uerò extendatur, externum. Quod si neuter tonum animale habuerit, æquipollentem partis ipsius motum fieri ueluti latitudinem quandam habentē. Si uerò omni uirtute destitutus fuerit, mortuum esse.

26 Si externum incideris Musculum, flecti membrum ultra mediam figuram uidebis. Pariq; modo si internum incidas, extendi particulas plus medio. Ibid.

27 Sola figura simpliciter media, Muscu

Musculos omnes quiescentes exhibet. Eaquæ ius tantum accidit, qui ob ebrietatem, aut fatigationem, aut uirium infirmitatem eius corporis partes omnino exolutas habentem in mediam eas figuram reducere dormiendo, Musculis permiserunt. 2. de motu Musc.

28 In Musculo ani & uesicæ, & diaphragmatis aliter quam in Musculis linguæ res habet. Nam cum singulis harum partium unicus tantum sit rotundus, sine ullo opposito Musculus, in contrarios deduci motus, non æque facile possunt. Musculi autem qui est ad uesicam & anum officium est, non excernere superflua alimenti, sed retinere, nisi forte per accidens, quum desierint agere & phrenes, atque omnes Musculi epigastrii intestina uentriculumque presserint. Ibid.

29 Expiratio & inspiratio phrenibus fiunt, hæc quidem his agentibus & in seipsos coeuntibus: Illa uero cōtensis & ab oppositis Musculis propulsis, aliis Musculis uentus agentibus,

bus, aliās intercostalibus, & his quidem solis. Ibid.

30 Quum expirationi cōtraria sit inspiratio, efflationi uerò uehemens inspiratio, priorem quidem oppositionem solę phrenes efficiunt, alterā uerò intercostales cum Musculis, qui ad thoracem ex collo scapulisq; perueniunt. Ibid.

31 Musculi os sibi annexum quasi lapidem grauem sustinēt, si sint ualidi grauitatem ponderis non sentiunt: Si sint infirmi, tunc sentiunt, & auguntur cupiuntq; onus abijcere, & figurā mutare, nec possunt. Quo fit, ut quamuis impotētes simus ad motum, si præmimur dolore, aliās alio iactemus membra, figuram dolore carentem quærentes, sed nil inuenire potentes. 1. de mot. Musc.

32 Homines per somnum spirant reliquis Musculis omnibus præter eos, qui ad thoracem pertinent, tunc ferientibus. 5. de loci aff.

33 Dormientium anima non quiescit, neq; enim penitus expertes sensus

ius sunt dormientes, quanquam eorum actiones non omnes sunt naturales, sed multæ ex his animales, ueluti, quumuarij transferunt membra quum loquuntur, quod mirandum non est, siquidem neq; palpebrarum motui, neq; manuū ac pedum actionibus animum semper adhibemus dum uigilamus. Eadem autem est causa in uigilantibus, & graui somno oppressis. 2. de mot. Musc.

Addit Moyses.

Galenus in eo libro, à proposito digressus causam rei, neq; reddit, neq; quæstionē soluit inductam. De dormientium enim actionibus tantum difficilem esse quæstionem fassus, tacet. Ego igitur aliquot rationes huic adferam, quas docēde actiones dormientium, non sine causa uoluntarias esse utiles probaui, quarum prima est, quòd uoluntas mouetur ex recodatione & memoria uisorum, quemadmodum si quis ex inspectione stellarum, somniet ex his aliquam cernere, aut semen mittat imaginatione amica

amicæ ductæ, aut saliat ueluti pulueris ictū sentiens. Secunda quòd imaginationis effectuum tempora sunt somni: tunc enim cæteris rebus obliuioni relictis uoluntas, ad id quod obijciunt primum mouetur. Tertia quod animal somni tempore, ipso etiam Galeno afferente, sentiat, quanquā id quidem remissius, & ueluti quid ab opere fatigatus sentire potest. Ex his ergo perspicitur, quicquid Galenus de his actionibus retulit, ad imaginatricem uim & sensibilem referri: ut cum primum ad oculos dormientis accedit lumen, aut ad aures sonitus ingens, aut ubi aculeo iungitur, aut uehementi calore, uel frigore, uel fame affici contingit expergiscatur. Hunc autem motum à natura sensus proficisci. Neque uerò quod conturbare debent apoplectici & ebrii, nullo modo expergiscunt. Sententia enim in annis & in imbecilibus intelligi debet. Quòd igitur edormientes & uigilantes obliui quid fecerint, alij ambulēt, alij coquantur, & actiones

nes

nes uoluntarias exercean, id ex impressionibus rerum priorum imaginatione conceptis, & firmitus asseruatis, uoluntatiq; in somno, uel praesenti cogitatione obiectis. haecenus Moyses.

34 Meminimus semper actionem quas sani & his intenti fecimus, at earum quas uel ira, uel curis, uel ebrietate, uel phrenitide, uel metu capti agimus, non item. 2. de motu Musc.

Causa huius aphorismi (inqt Moyses) est memoriae uirtus labilis ac imbecilla genere, non nisi quae praecipue placeant, & cupiam consecutrici memoriae committit, ea uero in sanie diligenter seruat, & tuetur.

35 Sunt qui paruum aliquod corpus, flexis digitis etiam dormientes seruant. Id autem signum est tonicae actionis uehementis. Sicut & in maxillis coniunctis, & in meatuum excretoriorum musculis, qui ne in dormientibus quidem permittunt, quicquam excerni, priusquam ratio iusserit. Ibid.

36 Nat

36 Natura congenitam quādam motionem cerebro, cum corde tribuit qua inspirando se uentilaret, atque excitaret ad pulsum, expirando uerò pituitosa, & mucosa excrementa à se abigeret. Coarctatur enim cerebrum dum sese cōtrahit, quum uerò undiq; se dilatat funditur, atq; ita externus aër: illud, quum se retrahit, sequitur: cum uerò diffundit se efflatur. Gal. de instrumento olfactus.

37 Meninx tenuior in omnes cerebri partes se insinuat, totum ipsum contexens, extendensq;. Crassa uerò ab ipso est seiuncta, excidentibus tantū quibusdā uasis cohærēt. 8. de us. par.

38 Dura Meninx quæ cerebrum contegit, perforata est, ut per eius foramina purgantur pituitosa cerebri excrementa, & facilius uapor exeat, inspiratione & expiratione cerebri permixtus. Ibid.

39 Opposuit natura olfaciēdi sensorio, os quoddam uariē pertusum colatorium dictum, ueluti spōgiam quandam: simul ne aliud corpus dur-

rum

rum extrinsecus incidat, simul ne uiribus integris aer frigidus inspirando, in uentriculos cerebri irrumpat: Ibidem:

40 Retiformis plexus omnium; quæ circa adenes uisuntur maxima admiranda particula; collocatus est, inter os palati & cerebrum, complectens in orbem ipsum adenem pertingensq; retro longissime. Tota siquidem basi cerebri propemodum hic plexum subiicit ex maxima portione earum arteriarum, quæ à corde sursum ad caput feruntur contextus. Estq; non simplex rete, sed cuiusmodi sunt uulgaria piscatorum retea, si plura alia alijs cumulata superinijcias. Etenim ubi natura uult exacte materiam: conficere diuturnam ei moram, in coctionis instrumentis comparat. 9. de us. part.

41 Spinalis medulla est humiditas crassa & uiscosa à cerebro ducta; & in uertebis contenta ad motionis facilitatem conducens. Meningibus autem uestitur, cerebri inuolucra si-

B milia

militudine prorsus referentibus, nisi
quod crassa medullæ spinalis me-
ninx undiq; tenuem tangit, & com-
prehendit, cerebri uerò crassa à tenui
seiuincta, quoad ipsi, dum pulsat, sus-
cipiendo esset satis. Præterea cerebro
nullum extra crassam meningē aliud
operimentum fuit circūdatum: Spi-
nali autem medullæ, quæ ipsius ossi-
bus uehemens motus inesset, tertia
illi fortis atq; nervosa tunica data est,
cui etiam glutinosus humor est cir-
cumfusus, ne assiduo motu exicca-
tur. 13. de us. part.

42 Lingua tangendi & gustandi
uim obtinet, à neruis ex tertia coniu-
gatione ortis, in suam pelliculā disse-
minatis. Crebrius tamen læditur gu-
standi, quam tangēdi facultas, quod
huius sensorum crassissimū, illius te-
nuissimum existat. 4. de loci aff.

43 Spinae partes quò fuerint altio-
res, eò sunt præstantiores, quare quò
affectio fuerit inferior primis duab.
uertebris, eò inferet multò minorem
noxam. ibid.

44 Vox

44 Vox uocalium instrumentorū
est munus, loquela uerò eorum, quæ
sermoni deputata sunt, inter quæ lin-
gua principatū obtinet, cui non pa-
rum conferunt, nasus, labra & den-
tes, ut inter uocalia instrumenta gut-
tur, & ipsum mouentes musculi ac
neui, qui à cerebro ipsis mouendū
uim deferunt. 4. de loci aff.

45 Tunica oculi uuea est intrinse-
cus humida, & mollis instar spongię,
ne contactu suo humorem crystalli-
num affligeret, sed benignè ac molli-
ter excipiat: Ea uerò pertusa est in cē-
tro sui, & quā duntaxat foramen exi-
stet, nulla alia tunica inter crySTALLINū,
& cornicā media est, sed ueluti per te-
nue, & candidum eorū splendor in-
ternum cum externo, commiscetur
& communicat. Simulq; humorem
albuginem syncerum, & tenuem ob-
duxit crystallino. & spiritu aëreo om-
nem pupillę lacum oppleuit natura
non solum ut spacium uacuum ex-
pleret, sed et amne crySTALLINUS hu-
mor & portio uueę tunicę inter-

na exiccaretur. 10. de us. part.

46 Tunica arachnoeidis, araneis subtilior anteriores crySTALLINI humo-
ris partes uestit, in eaq; ipsius pupillae
imago, ueluti in speculo conspicitur
fulgens & leuis supra omnia specu-
la. Non tamen ambit totum crySTALLI-
num, sed ea parte, quam uitreus hu-
mor ad eum nutriendum inuehitur,
aperta est & detecta: qua uero foras
eminer, tota extenditur. Ibid.

47 Quod omniū est in oculo ex-
tremum operimentum ac propugna-
culum, tenue, album ac durum est,
quasi eorum: tenue quidem & albū
ut splendores ppter ea trāsmittat, du-
rant uero ut tutō conseruet. Ibid.

48 Exciso capitis osse, uiuente ad-
huc animali, & crassiori detecta mē-
brana, si utrobique medio rectitudinis
quā cerebro hāc plexu duplici incū-
bit, per hannulos eleuatam, aut solā
hāc partem exciderit aut totam, imo
si cerebrum ab ipsa quomodo cūq;
excindas, neq; insensibile, neque im-
mobile animal ipsum euadet priusq;
ad ali

ad aliquem uentriculorum ipsius, ipsa sectio pueniat. 7. de placitis Hippocr. & Plat.

49 Sensiles motus in sanis animalibus corporibus duplices genere existunt, alij enim fiunt uoluntatis imperio, quod à nervis & Musculis editos medici uocant actiones libere uoluntatis. Alij à corde & arterijs, & uocantur functiones uitales. Est & tertius in uenis, insensilis, de quo hoc loco non uidetur commodum dicere. Gal. de tremore palp. conuuls.

Addit Moyses.

Hic tertius est is, de quo (ut opinor) in 3. de naturalibus facult. loquutus est, his uerbis. Iam illud difficile compertum non est, tractum & expulsionem diuersis temporibus per eundem meatum fieri. Id enim in uesica fellis cernitur & præterea in utero, cuius stomachus sicut intro seminis, ita foras partus uia est. Quum igitur attractionem & expulsionem per unam eandemque fieri uiam cernamus non debemus mirari, si per quas uenas à

B 3 uentre

uentre in iecur facta est digestio, rursus ex iecinore in ipsum trahi aliquod nutrimentum longa inedia potest. Venæ siquidem illæ, quæ mediū spatium inter iecur et partes, quæ circum uentrem occupant duplex ministerium præstāt: nempe ut quum in his fuerit abundantia nutrimenti, per eas sursum feratur in iecur: quum autem uacua sunt, nutririq; indigēt, per easdem ipsas ex hepate rursus trahatur.

50 Ambulatio fit altero crure in terra firmato, altero autem circumlato. Sed firmari quidem, pedis, circumferri uerò totius cruris est actio. 3. de us part.

51 Pulmo uocis simul & respirationis instrumentum existit, trahit enim cor aërem externum non protinus per fauces, sed medium pulmonem, quem quasi spiritus promptuarium natura statuit. His autem quæ aërem per fauces, nares, & os inspirant, pulmo & dexter cordis uentriculus inest. Reliquis uerò quæ his carent,

rent, neq; pulmo, neq; dexter cordis uentriculus, qui gratia pulmonis est factus. 6. de us. part.

52 Ventriculus est rotundus, ut minime lēioni obnoxius & capacissimī fieret, inter oblongū, ut longius tenderetur. In dextraq; parte animalis consistit, & superius orificium inferiore latius habet. Ambit autem hunc hepar, quibusdam locis ceu digitis amplexum in regione dextra & superiori. Habet etiam ut ex sinistris lienem longē protensum a quo sinistrae partes calefiunt, sic retro sum spinam & Musculos, ut ab illa prohibeatur iniuria, ab his uerò molliter calor eius foueatur. In reliqua parte anteriori calefactionis gratia, omentū corpus densum & leue. 4. eiusdem.

53 Omentum ex duabus quidem tunicis densis atq; subtilibus sibi ipsius incumbētib; quā plurimis uerò arterijs & uenis pinē uedineq; nō pauca conflatum est. Ibid.

54 Est alia membrana peritoneos dicta uiscera omnia, quæ sub septo

B 4

trans.

transuerso sunt, tegens: citansq; ex-
cretionem aridorum excrementorū,
& ne uenter aut intestina flatibus distendantur prohibens. Siqui-
dem anterioribus ipsorum partibus
protensus est. Superiori uerò extre-
mitatē septo transuerso internè adhe-
rescit, & inferiori oībus pubis atq;
iliū: itaq; illa quidem hepar & uen-
tricus uestiuntur, hac uerò uesica
& intestina. Ibid.

55 Ad perfectam intestinorum &
uentriculi nutritionem natura primū
mesenterio & omento plures, inte-
xit uenas nutriendis illis dicatas,
nequaquam trañciētes alimētum ad
hepar, sed cremore quem ex eo con-
ficiunt eas partes nutriendas. Dein-
de in longiori inedia per easdem ue-
nas sanguinis benignioris retractio-
nem per quas prius distributio ad he-
par facta est. Ibid.

56 Vbi abundē saturatus est uen-
ter, benignioremq; ciborum substan-
tiam suxit, quod reliquum est ueluti
fecem onerosam reijcit, atq; idem in
inte-

intestinis, & cæteris partibus perpetuò fit. 3. de natur. facult.

57 Omni naturæ circa nutrimentum opera, in tria tempora distributa est. In primo quidem alimentum manet in uentriculo & concoquitur. In secundo transit ad intestina, usq; ipsis & iecinori ad saturitatem opponitur, quo tẽpore iam affligitur uentriculo quod in primo tempore fuerat appositum. In tertio, per omnes corporis partes digeritur & apponitur, quo tempore uentriculi iam nutritur, ijs, quæ affixerat assimilatis. Iecori uerò & intestinis affigatur, quæ ijs fuerat apposita. Ibid.

Sic ordine fiunt tres nutritiones, 1. in uentriculo, secunda in hepate & intestinis, tertia in omnibus particulis, & singulæ tres habent alteriores, appositionem cibi affixionem & assimilationem.

58 Est quidem quarta mutationis species dicta assimilatio, quæ quamquam nutritionis nomine latius patet, tamen unum & eundem, cum ipse

B 5

sa ef.

sa effectum habet. 3. de sympt. causis.

59 Omento seu epiploo ad uitam conseruandā aliqui non indigemus, sed quæ uenas & arterias ei tribuit natura, cauendum est, ne quid excidatur, quod si contingat ligetur superius, & quod prominet incidatur. 6. de us. part.

60 Splenis corpus est rarū admodum atq; laxum spongię instar: sic ut crassos & melancholicos succos facile trahat excipiatq;: quare illi arteriæ multæ & magnæ tributæ sunt, contractione sua illius expellentes excrementa fuliginosa. 4. eiusdem.

61 Renum alter quidem superiorem, alter inferiorem positionem sortitur. Quum uerò uterq; serum sanguinis trahat, neuter alterius tractui moram adfert. Nunc itaq; uterq; liberè agit, solusq; attrahit, quum nil sibi habeat à regione oppositum. 5. eiusdem.

62 Vtraque bilis & urinae uesica, quum attrahant sibi familiare purū, atq; ab alijs secretum excrementum, alia

alia à renibus uasa, alimentū sibi sup-
peditantia iure optimo habuerunt.
Vesicæ igitur quæ urinā excipit, ner-
uos à spinali medulla, quā parte latū
os situm est inseruit natura, uenasq;
& arterias à propinquis ipsi uasis in
eam disseminauit: alteri uerò quæ ad
iecur situm habet, arteriam quidem
& neruū ab ijs, quæ in uiscum ipsum
inseruntur, deduxit: paruum utrunq;
admodum & uix conspicuum, at ue-
nam satis amplam ab ijs, quæ sunt ad
portas, cum his duobus ad collum
eius, usq; in fundum productas pro-
duxit. 5. de us. part.

63 Collum matricis à natura factū
est neruosum simul ac durum medio-
criter, ut circa noxa contrahatur & di-
latetur. Vt autem matricis mulieri-
bus due in unum collum desinentes
sunt factæ: ita & ubera duo, utrunq;
suxæ matrici instar ministri boni sub-
seruiens. Singularia etiam prouiden-
tia ipsius naturæ fiunt, semper recep-
taculorum matricis numerum, æ-
qualem numero mammillarum præ-
scri-

scribi. 14. de uis. partium.

64 In mulieribus uesica matrice est neruosior: quò fit ut eius quoque ulcera duriora & magis feratilia quo ad pulsum fiant, nec illa ab hac alia re differt in muliere. Gal. introd. ad pul.

65 Quatuor organorum genera omnino duabus tunicis constant, æsophagus uenter, intestina & arteriæ omnes, præter eas, quæ in pulmone mutantur in uenosam. Quatuor, item, unica nempe felliculi felliculi, uesica, matrix & uenæ, omnes, præter eas, quæ in pulmone mutantur in arteriosas.

66 Virga ex ossibus pubis idque ex superioribus eorum partibus enascitur. Sic enim cum ab ano plurimum est dissipta, tum ad coitum locum opportunum nacta est. Ex osse emergit non aliter, quam reliqua omnia ligamenta, tum propter substantiam tuam quod ad ipsius actionem sic erat melius, ut rectum & stabile totum pudendum seruaretur, uidelicet à corpore stabili exortum. Solū autem ex omnibus

nibus est cauum, quò cito impleatur,
tendatur & induetur. Præterea in
partib. eius inferioribus, meatus sen-
sus (qui lotio est cum illo cōmunis)
medius constitutus est. Et incubat
hinc nervus cauus, qui spiritu refer-
tus tenditur, unde penis erigitur. 15.
de us. part.

67 Nervi renibus, hepàti, lienì, &
uesicæ fellis exiles omninò dati sunt,
quòd maiorem sensum non postula-
rent, utpote à proprijs excrementis
nil accepturi incommodi. At uesicæ
maiori, ut sensu essent prædita maio-
re, plures & maiores nervos natura
dedit, sicuti ualidiores, quàm alijs tu-
nicam, quòd passim distendenda es-
set & euacuanda, antequam à lotio
acriori noxâ pateretur. 5. de us. part.

68 Natura ubi per longū iter ner-
uum est ductura, aut motui Musculi
uehementi ministraturum, ibi substā-
tiam corpore crassiori quidem, cæte-
ra autē nervo simili intercipit, cuius
beneficio contingit nervo ipsi cras-
sescere atq; corroborari. 16. de us. pa.

69 Muscu

69 Musculi costarum pectoris & uentris quādiu quiescunt, perpetuò connexi sunt. Cum autem agunt, intrò cedunt, minusq; curui fiunt, contra quā faciei, manuum, pedum, & Musculi. His enim dura & renitentia subsunt ossa, illis uerò mollia & facile cedentia corpora. 2. de mot. Musc.

70 Omnis Musculus unum habet motum natura, alterum uerò per accidens. Siquidem operatur quisq;, trahens ad seipsum motam particulam, non operatur autem cum ab alio Musculo in contrarium simul cū mota particula abducitur. 1. de mot. Musc.

71 Proiecto in uterum semine, alteratrix naturæ facultas, quæ ex mēstruo sanguine hanc aut illam particulam generauit, generatio dicitur, & alteratio: quæ uerò compagem & formam fecit, efformatrix uirtus: quæ ars optima existens tam consultò & artificiosè compingit singula, ut aliter habere se melius non possint.

Item: Quæ in omnē partē eas particu-

ficulas simplices profert. Auērix.
& quę ei quod nutrit affigit, id quod
nutrimenti specie affluit, nutritio est.
Cuius causa fit prius appositio, tum
agglutinatio, deinde assimilatio, po-
stremo & expulsio. i. de natural.

72 Donec fœtus in utero est, au-
ērix, & nutrix facultates sunt ueluti,
alteratricis & efformatricis ministrę,
ubi uerò editum est animal, auērix
quidem usq; ætatis uigorē domina-
tur, à quo tēpore ad finē uitę nutrix
pręest subministrantib. ei reliqs. Ibid.

73 Omnium quę mouētur instru-
mentorum corpora pro fibrarum po-
situra motus habent. In singulis qui-
dem in testis circulares, in utraq; tu-
nica sunt fibrę, quod contrahantur,
duntaxat nec quicquam trahant.
At uenter aliās rectas habet, quibus
trahat, aliās transuersas, quibus con-
stringat. 3. de facult. nat.

74 Alteratio generationis & nu-
tritionis genus est. Sed in generatio-
ne quod os non erat, postea os factū
est. In nutritione uerò ei, quod iam fa-
ctum

ctum est, id quod affluit efficitur si-
mile, quare etiam propriè dicitur assi-
milatio. i. eiusdem.

DE HUMORIBVS.

Seçtio II.

1.



Vmorum omni-
um in corpore est
quædam confusio
& mixtio in hepa-
te genita, quæ à san-
guinis maiori co-
pia, & ueluti impe-
rio denominatur Sanguis. Reuera
autem non est sanguis, sed superflui-
tas illa, quæ sacificatione, aut uenæ
sectione uacuatur. Cùm autem hu-
mores quatuor numeramus, flegma
sanguinem, flauam bilem & atram.
Non ibi confusionem hanc omnium
simul humorũ intelligimus, sed san-
guinem purum & simplicẽ, qui non
nisi cogitatione & ratione ab alijs se-
paratus concipi potest. 4. in 2. epid.

2 In Sanguine sicut in lacte aquo-
sum

sum quiddam excernitur à qualitate naturali remotum, quod pro humoris abundantis natura magis, uel minus perniciosum est. Si enim ex melancholico sanguine abundanti fuerit, maximè nocet, sin ex flauo & tenui, minus: Si ex pituitoso multò minus: Si deniq; ex sanguine multò omnium minimè. 2. in 6. Epid.

3 Bilis flaua, siue pallida sit, siue flaua, siue uitellina, in uasis, id est, uenis & arterijs gignit. At in uētriculo quēdā alia gignit bilis, q̄ porri colorē refert: alia quæ ab æruginis similitudine æruginea uocatur: alia q̄ isatidis imitatur colorem. Gal. de atra bile.

4 Bilis quę porri similitudinem refert, plerunq; in uentriculo gignitur ex cibis difficilis cōcoctionis, cuiusmodi sint, cæpa, scylla, allia, porrū. Aliquando etiam fortasse in uenis ex calore naturali imbecilli: à quib. postea in uētriculum & intestina effunditur. Gal. in 2. prognostic. Hipp.

5 Est etiam bilis arsenico seu auripigmento similis, quæ interdum uo-

C

mitu

mitu rubicunda. Interdum etiam per inferiora eijcitur. 1. in 6. Epid.

6 Omnis frigidus atque humidus succus, ad pituitæ appellationem refertur. Cuius tamē quatuor sunt differentia. Vna usque adeo frigida, ut quum detinetur alicubi, dolores acerbissimos excitet, quam Praxagoras uitream uocat, quod uitro fuso sit persimilis. Altera non est exacte frigida, quam plerique cum screatu expuunt, sensibilemque habet dulcedinem. Tertia sentitur expuentibus acida, estque minus frigida quam uitrea, magis uero quam dulcis. Quarta est salta aut ob putredinem, aut ob serosæ humiditatis missionem, ex qua febricitantes non rigant, sed tantum horreat. 2. de diff. febr.

7 Quemadmodum in musto fermenti duo sunt excrementa, flos uini, qui est tenuior pars excrementi, & fex, quæ est magis terrea: Sic in sanguine generando, quod ferme humidum & fluidum est, flaua bilis dicitur naturalis, quod sœculentum & terreum, & atra bilis

bilis, uel æter succus naturalis est. Cū autem præter naturam se habent, bilis quidem perassatur: fitq; crassa ignea & uitellina. Atra uerò bilis, acris euadit in mores aceti; & corpus radit & terram fermētat si proijciatur. quū nimirum exustione quapiam ac putrescentia ueluti ciuis quidam redditur. Reliqua bilis genera partim ex eorum mistura constant, partim tanquam uig sunt ad harum tum generationem, tum inter se mutationem: 2. de natur facult.

8 Bilis genera naturæ aliquem usum utraq; cōferunt, ab ijs enim purgatur sanguis per lienem, & per uescicā fellis. Quod uerò relinquitur moderatissimē elaboratur per uniuersas partes digeritur. Requirit enim sanguis in non paucis animalis particulis crassitudinem. In nonnullis etiam flauū, qui tamen igneis ad extremū fructum non sit. Ibid.

9 Quemadmodum ex bilis generibus, aliud utile naturale q̃ in animalibus adest, aliud inutile & præternaturantur.

G 2

turantur

turam. Sic pituita quod dulce est, salutare animanti. Quod acidum salsumque est, inutile: hoc siquidem putruit, illud crudum manet. Ibid.

10 Interdum pituitosum in uentre humorem, interdum biliosum acervari contingit. Atque ipsius pituitosi alius acidus, alius salsus, alius dulcis, alius insipidus uel sensibilis, qualitatis expers. Rursus alius, liquidus, alius crassus, alius viscidus, alius dissipatus difficilis. Sic humoris biliosi alius est flauus, alius pallidus & pro maioris minorisque ratione. Atque id prodest etiam noscere ad aegrotantium alui excretionem, uel cohibitionem discernendam. 1. de alimentis.

11 Atra bilis sicca est & frigida: flaua, calida & sicca: ut pituita frigida et humida, ac sanguis denique humidus & calidus. 1. & 2. morb. de sympt.

12 In epilepsia, pituitosum humorem appello, in quo humiditas frigiditasque, ut melancholicum, in quo licetitas & frigiditas dominatur. Ibi quoque utriusque genera explicat. 3. de loc. aff.

13 Ex-

13 Excrementa nigra, cum talia sepius uomantur, qualia sunt & deniciantur, ab atra bile plurimum & qualitate, & facultate dissident. Nam neque acerbum saporem, neque acidum manifeste habent cum atra bilis, tum gustui, tum olfactui talis sit. Adhæc, illa terram non fermentant, ut atra bilis, quæ in hoc aceto est similis, quandoque acetum est tenuius. Protecta ab illis muscæ non abhorrent, hanc uero nulum animal ne gustare quidem sustinet. Atque ea est unde Cancri, carbunculi, elephantiasis & huiusmodi tumores accidunt. Gal. de atra bile.

14 Et in 3. de alimentis. Affectus melancholici sunt, cancer, elephas, scabies, lepra, febris quartana, & quæ peculiari nomine melancholia nominatur.

15 Crudus & crassus quidam humor, ex alimentis crassi glutinosique succi gignitur in ijs, qui ab exercitijs alienis utuntur: qualis humor, qui in urinis subsidet puri prorsus assimilis, nisi quod pus & graueolens est, &

C 3

lena

lentum, crudus uerò succus, non itē,
2. de aliment.

16 In pueris ferè & uiris in ocio a-
gentibus plurimum humoris crudi
colligitur: unde & multam habēt u-
rinæ subsidentiā. 1. de crisib.

17 Flaua bilis, uim possidet desic-
candi ut muria & maris salsum. Quā
obrem in ictericis tunicam arteriarū
indurādo & desiccādo, pulsum quo-
que reddit duriores, & minorem ac
proinde crebriorem, etiam cū nec
febris adest. lib. 4. de caus. puls.

18 Humorū mordaciūm repe-
riuntur quatuor species magis & mi-
nus dicuntur. Nam qui modicē mor-
dent pruritum inferunt, ut scilla, qui
uerò magis, rodunt, ut lepra, qui etiā
acrius mordent, horrorem excitant.
Cū uerò prorogatur atq; augetur
horror tum mordacissimi existunt, ri-
goremq; faciūt. Gal. dum plen.

19 Si in uentriculo humor uitio-
sus infederit, ac putruerit, malignior
euadit & sanē qui ingeruntur cibos
corrumpit. 6. morb. & sympt.

Excre

20 Excrementa singula, si moram in corpore diutius trahant, putrescunt: quare mordacia & acia, atque his quę ipsa continent infesta redduntur. unde & uesica, quę iecinori subest seu multitudine, seu qualitate succi offensa, expulsionē perpetuò desiderat, etiam si neruorum sit expers. 3. de natur.

21 Ventriculus, si quam nutrimentum postulat, neq; eius copia datur, excrementis biliosis, pituitosis, atq; sciosis impletur, quę utiq; trahentis iecur illi remittit. Ibid.

22 Nil in cibarijs omnibus ad boni succi generationem tam pertinet, quàm si probe concoquantur, qui igitur cibi in tumorem crescunt, dum in aqua coquuntur, omnes concoctiones facilius admittunt, & ad bonos humores gignendos sunt aptiores. Gal. de Euthym.

23 Quod autem uitiosi humores, morbos gignant cruditas assidua ciborum, siue bonorum, siue malorū in causa est: quāquam deterior est a-

lijs quam uitiosi succi cibaria effecerunt. Ibid.

24 Cibaria uitiosi succi sunt duplicia, tenuia quæ acutos morbos cum malignis febribus inuehunt, succo quæ in unam solùm partem decumbente tunc erysipelata hepates & calidæ affectiones aliæ oriuntur. Et crassa quæ articulorum & rerum uitia, podagras, anhelationes, lienis, iecinoriscque scirrhos affectus gignunt. Ibid.

25 Humores quâtitate pariter, & qualitate dominâtes in corpore sunt quatuor. Pituita bilis, melancholia, & sanguis serosus. Gal. in 1. Aphor.

26 Sola pituita ex humoribus facere atrum succum nequit, etiam si exustione magna afficiatur. Gal. in 2. de uetis. Hipp. quem neque extare adhuc nouimus.

27 Pituita ex imbecillitate caloris gignitur, cum enim uenter non potest coquere cibos ingestos, augeri ipsam uidemus. Gal. in Hippo. de dolorib. mulierum, quem neque habemus adhuc.

28 Nul

28 Nullam bilis portionem in uē-
triculum immisit natura, quæ mala
induceret iāta ut functiones ipsius,
ob acrem mordentem & omnia ra-
dentem facultatem, quam habet, fun-
dius deturbaret. At melancholicum
excrementum in ipsum excreuit, ceu
nullam illi noxam allaturum. Acer-
ba siquidem acidaq; cum sit atra bi-
lis contrahere ipsum constringereq;
non subuertere est nata. Quare non
modo non lædit, sed iuuat intendens
ipsum, contrahensq; ut cibos ad un-
guem amplectatur: quousq; fuerint
percocti. 5. de us. part.

29 Quia mordent absterguntq; ci-
baria biliosa sint, & cacothyma om-
nia. Ibid.

30 Pituitosum excrementum gi-
gnit quidem uenterculus, quia id ui-
tium adeo exile est, ut præsidio exter-
no abunde corrigi possit: Quanq; ubi
ex prauo corporis habitu copiosius
colligit: ileos lienterias linesmosq;
oīum q; uētriculo cōtingunt morbo-
rū grauissimos inducere solet. Ibid.

SECTIO III.



Lorescens etas omnium animalium, maxime in medio extremorum est 12. de temp. & in Hippo. de humana natura, adolescentia omnium aetatum temperatissima.

2 Adolescētia autem dicitur, quæ à decimoquinto anno ad uigesimū quintum agitur. In 5. Aphorif.

3 Vniuersa ætas quæ uigori succedit, frigida est & sicca. Manifesti autem fines inter eorum ætatem, qui iā declinant & eorum, qui senescūt, humidorum est excrementorum exuperantia. Vnde quidam decepti statuerunt serium esse humidum. Gal. de tabe.

4 Totum corpus uirile ad perspiratum est optime cōparatum purum excre-

excrementisq̃ uacuum neque compressum: foeminis autem contrario modo dispositum. Quare ut illorum ad magnitudinem sic horum ad paruitatem pulsus uidetur aptus. 3. de caus pulsum.

5 Rariora corpora, minorib. sunt obiecta periculis, itaq̃ facile morbos resoluunt, & intemperiem sedant, & excrementa noxia deijciunt. 2. de pre-cog. expuls.

6 Corporibus raris morbi ferè extrinsecus accersuntur, ex humoribus in corpore corruptis rarissimè. Densiss uerò & ualidis contra. Galen. de formis.

7 Sepe quidem dolor sanguinem ad se trahit, & partiū debilitas phlegmonem absq̃ corporis plenitudine contrahit, quum uidelicet partes fortiores p uenas, ceu per canales quosdam excrementa semper ad imbecillio-rem propellant, donec ad partem imbecillissimam omnium defluerint, & q̃ ex se amplius ppellere q̃ redundat in ipsa nequeat. Gal. de uenę sect.

§ Si in

8 Si in aliquo carneum ac adiposum particularum genus, aut etiam humores uiribus interim eosdem fines seruātibus, adaugeantur, necesse fuerit motiones imbecilliores fieri, motu nimirum aucto, mouēte uerò æquali permanente. Gal. de plenitudine.

9 Spasmodum seu cōuulsionem patiuntur citiùs pueri, quàm reliqui: habent enim adhuc debiles neruos, qui minori impetu conuelluntur. Sed ipsis quoq̃, quàm alijs minus noxius adest. Gal. in 1. Epid.

10 Qui habitu sunt ualente, diuq̃ à morbis immunes fuerunt, periclitantur si eis prahendantur. At imbecilli qui ob raritatem corporis ad omnes obiecti causas, facillimè restituntur, quum nimirum à qualibet uel minima re offensi, magnam causam non expectant. 3. de præcog. expuls.

11 Eorum quæ in senili ætate constituti sunt nulli robur adest. Qui uerò eadem ratione pueros imbecillos putarunt, à uero errarunt. Gal. de uenæ sect.

12 Erit

12 Erit maximè diuturnum quicquid erit minimè siccatum. Proinde qui maximè sunt humidi, n̄ maximè longevi sunt, & sanitate, ubi corpus ad robur peruenit, plus ueteris fruuntur. Maximè si excretioni recrementorum & exercitationi operā manet: 6. de sanit. tu.

13 Pessima omnium meritò sicca temperatura est: quippe quod temporis spacio senibus accidit, id ijs statim à principio contingit. Prodest itaque exercitatio modica, nutrimentū humectans & calidum; calidi uini portio, somnus liberalior & excrementorum quotidie excretio. At uenus huiusmodi siccis temperamētis semper inimicissima est. Ibid.

14 Qui plethoricus est uel uitiosis succis premitur, uel acris est sensus, uel eorum quibusdam omnibus afficitur, si cutis tantum acupuncta sit, phlegmone tentabitur, quare non est quidē medicamen quod glutiet, imponemus cuiusmodi sunt anharmonia illa, quæ recentibus uulneribus applicantur

plicantur, sed molle & blandum quod dolorem mitiget, & ne fieri in particula phlegmone prohibeat. 6. Method.

15 Qui uehementer cordis sicca intemperie affecti sunt, celeriter arefcunt: atque is marasinus breui morte affert. Proximè huic, qui ab iecinore est affectus, mox qui à uētriculo. Qui uerò ab alijs particulis ortum habet, tantò sanè tardius, quantò quælibet harum minoris est præstantiæ, quàm illa. Si uerò leuiter cordis corpus siccatum sit, senescunt quidem celeriter: cæterum plures annos trahunt, quàm qui uehemēter sunt lesi. 7. Methodi.

16 Scire licet, solidorum corporum siccitatibus si perdurēt succedere necessariò frigiditatem celerrimè, namque ex nutrimenti defectu refrigerantur partes: propterea quòd ex calido sanguinis succo nutriuntur. Ibid.

17 Superflua pauca sunt hyeme utpote frigore repulsa intro: æstate uerò multa à calore liquata. Atque hyeme quidem idcirco editur plurimū,
sicut

sicut æstate bibitur. Gal. in 1. de uentis Hipp. quem nondum uidimus.

18 Sprenatis & sanguinis temperatura alia hyeme est atq; estate. Sperma enim æstate calidius est & siccus: hyeme uerò frigidius & humidius. Propterea & diuerse sunt his & illis temporibus genitorum animalium natura. Gal. in 3. de uentis, Hipp.

19 Amputatas uenas ac rursus generatas in magnis ulcerib. uidimus, id quod fita raro tamen, conspirante in unum robustissima facultate cum materia spermatica copiosa. Arterias uerò aut neruum nemo unquam uidit regeneratum, ob materiae defectum, quam huiusmodi uasorum generatio copiosam, & ualide facultati inuictam requirit. Gal. de semine.

20 Aestatis principium faciunt gemini ascendentes, hyemis uerò descendentes: quemadmodum etiam ueris pisces cum sole orientes: autumnii uerò occidentes. Gal. in 1. de uentis.

21 Solidæ partes, quæ uerè solidæ sunt ac primæ nullo modo affici humido.

midiores possent. Intercepta autem in ipsis spacia hac uel illa humiditate complere possibile est. Hoc uero est proprium partium similarium alimentum, quod ex appositione fit, & non per uasa attrahit. Gal. in arte Medic.

22 Spondylę omnes ab ea connectione, quam parte anteriore habent, retrò pgressi, paulatim à se diducuntur locum omnem medium refertum habentes humiditate crassa & uiscosa, quę motionem conducit. 13. de us. part.

23 Tendo primum instrumentum est motus, Musculus autem ad constituendum ipsum fiunt comparatus, carnisq; coagmentę, & ex fibris nervorum, & ligamentorum inter se mixtis compositę animali contra iniurias extrinsecas prębet utilitates. Siquidem cadenti uel discumbenti, uel percusso ipsi sunt molle stratū & propugnaculum. 12. de us. part.

24 Nasus primum ordine, respirandi instrumentū est, os uero, si nullius affectus infestet animal: hoc est, nisi quid

quid asthmate multò ac uehementi urgeatur. Nullo pacto respirandi est instrumentum. 11. de us. part.

25 Quinetiam & alia quædã sunt (præter membranam, quæ ambas matrices copulat) ipsis matricibus, cum ijs corporib. quæ dorso mulieris adiacent, uincula laxa: qualia ne in alia quidem particula reperiuntur. Nulla enim cæterarum esse quæ dilatari plurimum & rursus ad minimum contrahi possit, præter hanc matricem. Vnde & omne fibrarum genus eius tunicæ est inditum & per ligamenta illa soluta, & laxa circumiacentibus corporibus alligata, ut tensioni ipsius & concidentia facile cederem ac obsequerentur. Eam uerò minimè auelli aut deturbari permitterent. 14. de us. part.

26 Eorum quæ uulneratum neruum contingunt, nil esse frigidum debet, quando quidem ea pars maximè sensibilis est, & principum partium primati continua, & temperamēto suo frigida. Quorum omnium occasio-

D ne

ne facile à frigido offenditur, & suam
offensam impertit cerebro. 6. Me-
thodi.

27 Ciuitates ab orientalibus uer-
tis, aut frigidis, aut calidis perflatae
sunt minimè omnium salubres. Gal.
1. de uentis.

28 Omnis intemperies uirtuti na-
turae inimica est: eamque si sit uehe-
mens, destruit ac omnē eius uim de-
cit. 3. de caus. morb. & sympt.

29 Inæqualis intemperies aliàs in
toto animalis corpore fit, ueluti in ea
hydropis specie, quam anasarca uo-
cant ac ferè in omnibus febribus ex-
ceptis quas appellamus hecéticas: in-
terdum in singulis partibus. Idcirco tū
ob fluxionem, ut cūm fiūt tumores,
tum ob qualitarum alteriorem. Gal.
de ineq. intemp.

30 Vigiliæ duobus modis fiunt,
aut enim in negotijs occupati spon-
te uigilamus, & hi non nocent, aut
coacti à causa quadā externa, hæ ue-
rò attractricem uim & concoctricē,
adeoq; omnes naturæ actiones ual-
de im-

le impediunt. 4. in 6. Epid.

31 Morbosam cordis intemperie,
sive ex se sit illa, siue ex alia particula
inducta, sequitur spiritualis uirtutis
diminutio. Sicut & cerebri intempe-
riem, animalis & obstructione men-
tis suffocatio. 4. de præcog. expul.

32 In curandis morbis, unus ac pri-
mus scopus est uirtutis custodia.

Quoniam autem uirium substantia
tum ex spiritu, tum ex carnosa specie,
tum ex solidis ipsis completur, ex ijs
quæ similia sunt, moliri cuius custodi-
am oportet, Spiritui, ex respiratio-
ne, transpiratione & uapore, qui ex
sanguine attollitur: Solidorum uero
generi ex solido nutrimento: Carno-
so per eam naturam, quæ in medio
humidorum ac de solidorum corpo-
rum est. 11. Methodi.

33 Cor quidem, (cui est ualentis-
sima attrahendi facultas) cum sit o-
rigo pulsuum & arteriarum, quem-
admodum hepar uenarum & sangui-
nis, nunquam moderatis alimentis
destituuntur, nisi enim ualida sangui-

D 2 nis

nis penuria uniuersum occupauerit corpus. Quare ubi corpus ex longo morbo extenuatum fuerit, putandū non est cor quoq; atq; etiā iecur, esse pro aliarum partiū proportionē extenuata. Gal. de Marasmo.

34 Alimentum à uētriculo elaboratum, ubi ad hepar traxerunt uenæ, ibi rursus feruet & concoquitur alteraturq; in sanguinis generationē. In ebullitione autem hac ex ipsis excrementis, quod feculētum quidem & crassum est subsidet, quod uerò tenue existit & leue innatat, & ueluti spuma quēdam in superficie sanguinis fluitat. Excipit autem quod flauum & tenue est uesica fellis ad hepar posita, quod crassum & limosum Lien quem in sinistris uentris partibus subdidit natura. Quod reliquū est rubrum quidem illud & purum à uena cava in gibbis hepatis orta excipit, eaq; ueluti aqua ductu sanguinis pleno, ad utramq; animalis partes fertur superiorem & inferiorem. (Nam illa per totum corpus in uarios scissa

os scissa ramos disseminatur) liquido tenuiꝑ & aquoso humore, qui adhuc in hac reliquus est, ueluti uehiculo ductum: donec ad dextrum cordis uentriculum peruenit, ubi hunc Renes excipiunt, & ab his uesica maior per quam eijcitur. 4. de us. par.

35 Intestina conuoluta sunt plurimis cōuersionibus orbiculatis ne alimentum ocyus elabatur. Nam que animalia simplex & rectum à uentriculo usꝑ ad anum intestrium sortita sunt, insatiabilia omnia & gulosa existunt. Ibid.

36 Intestina innumerabilem uenarum multitudinem ex hepate sibiꝑsis habent insertam, quibus omnem in uētriculo coctum succum sursum mittunt. Sicꝑ humor nutriendo idoneus nullus ab animali labitur, quādo naturaliter se habent corpora. At uerò orificia uenarum quæ in intestina se aperiunt modicum, quod & nutrimentū assumūt, plurimum uerò uenæ. Nam sanguis naturaliter cōtinetur etiam in arterijs. Ibidem.

D 3

37 Re

37 Renum uterq; plurimum sibi
bilis conciliat, multum etiam tenuio-
ris & humidioris sanguinis. At ijs ad
sui nutrimentum tertio quopiam alio
uase opus non fuit, præter duo ma-
gna, quorum alterum oritur ab arte-
ria, quæ spinæ incubat, alterum à ue-
na caua. 5. de us. part.

38 Nulla in parte corporis melius
conficitur sanguis, quàm in mammil-
lis, siquidẽ ex uena caua sursum per-
cor ad eas delatus, rursusq; deorsum
tendens, exagitatusq; à motu thora-
cis sic incalcescit, & in uasis perpetuo
motu perditis moratus, perfectã nan-
ciscitur concoctionem. 7. eiusdem.

39 Partes dextrę testiculorum in
masculis & matrices in foeminis sunt
calidiores sinistris, quia sanguinem
purum recipiunt, sinistrae uero humi-
diores, quia impurum sanguinẽ, ex-
crementosum, humidum & serosum
excipit. Quod quidem si uerum est,
ac præterea masculus calidior est fœ-
mina, probabile utique fuerit, partes
quidem dextras masculorum; sini-
stras

stras autem foeminarum esse genera-
trices, ut Hipp. dixit. Si dexter testis-
culus attollatur, id est, si ualētiōr fue-
rit masculum gignet: sin uerō sinister
foeminam. 14. de ul. part.

40 Ipsorum foetuū causa est prin-
cipium uenarum, matrices ipsas nu-
trientium, ac mammas cum eis colli-
gantium. Sola enim hæc instrumen-
ta per uasa coniungi expediebat, ut
quando in matricibus augeretur foe-
tus atq; conformaretur illi soli uenæ
communes ex utrisq; partib. alimen-
tum affunderent: quando uerō in lu-
cem editus esset: manib. rursus to-
tum alimentum su. reperet Ibid.

41 In facultate uentriculi qua pe-
nuriā sentit, primum symptoma o-
mnium est inanitiō. Secundum ina-
nitarum partium naturalis appeten-
tia. Tertium, uenarum, quæ per uen-
triculum porriguntur, suctio. Quar-
tū suctionis sensus, qui est fames. Po-
stremō ipsa animalis appetētia. 4. de
morbo. & sympt.

42 Quinq; sunt circa respiratiōē

D 4

& uo-

& uocis efformationē actiones, consequentia quadam inter se conuenientes, exspiratio, efflatio citra strepitum. Efflatio cum strepitu uox & loquela: quarum si prima laedatur, reliquas omnes laedi necesse est. Ultima uerò laesa reliquæ, haudquaquam leduntur. Semper enim ex præcedentibus offensio, posterioribus adest, nō contra. Ibid.

43 Expirationē efficiunt uniuersi thoracem contrahentes Musculi: Efflationem (quæ uehemens exspiratio est) Intercostales maximè strepētem efflationem, ij qui faucibus: insunt, uocem uerò ipsam, gutturis Musculi absoluunt. Loquela postremò lingua articulatim uocem distinguens: item dentes, labra, narium foramina, palatum, gurgulio & linguæ ipsius uinculum, quorum aliquo uitiato uitiari sermonem contingit. Ibid.

44 Hypostasis urinæ alba est inter saniam & naturalem humorem media: fit autem ex cibo, non cocto à natura, neq; in sanguinem cōuerso ob affe-

affectionem contra naturam. Gal. in
Prog. Hipp.

Sic Moyses, Idem quicquid mihi
(inquit) uidetur & sic coniectio, ex ci-
bis naturali calore hepatis & sangui-
nē uerti non potest, id esse quod cras-
sioris humoris cernitur in urinis eti-
am sanorum. Quod uerò in urinis æ-
grotantium & aliquando sanorum,
in imo confidit, id esse quod in mem-
bris ipsis à natura non potuit ex san-
guine in alimentum conuerti.

45 Sanguis non solū nutrimen-
tum animantis partibus est tributus,
sed caloris etiam naturalis conserua-
tio. Itaq; ipsi⁹ corporis calor, interdū
quidem seipso minor efficitur, aut
propter sanguinis copiam à qua ni-
mirum extinguatur, aut propter in-
gentem inopiam, aut propter frigidā
qualitatē: Interdum uerò maior pro-
pter calidam sanguis qualitatem, aut
propter exiguam inopiam. Quicquid
autem cor in caliditate, frigiditateq;
propter, eius quoq; & aliæ corpo-
ris partes sunt participes. At quæ par-

D 5 ti alie

si alicui accidunt caliditates, aut frigiditates, eas quæ parti quidem affecte uicinæ sunt unâ alterant, in totû tamen extendi corpus priusquam cor immutent non possunt. Galen. de sang. miss.

46 Totum cerebri corpus, cum arterijs plexus retiformis multipliciter diuisis contextum sit, & uenis ex eius uertice descendentibus: his quidem in ipsius uentriculos superflua excernentibus. Illis uerò respirantibus, relicto uenarum sanguine fruïtur oro nutrimento, & arteriarum spiritu uegetatur. 9. de us. part.

47 Cutis quidem certè, ubi secundum naturam se habet, laxa est in ijs, qui crassi non admodum existunt: Et cocus medius, cui incumbit ipsa, uacuis. nec secus ea, quæ in carne sunt spacia conspiciuntur inania. Omnia autem hæc per inflammationes replentur sanguine ex uasis quidem per eorû tunicas resudante, in omnibus, quæ carnis partibus ad modum roris permisto: quem si uicerit natura, extra

tra carnem pellitur à facultate expul-
trice : si uerò incumbens cutis dura
tensaq; extiterit, ibi pus detinetur &
abscessus gignitur. Gal. de tum præ-
ter natur.

48 Caloris duo sunt genera in ani-
mali, unus quidem naturalis, qualis
in sanguine cernitur: alter uerò acqui-
situs seu foris petitus, cuiusmodi in
febris esse solet. 4. comm. in 6. E-
pid.

49 Nulla uena est in his humoribus
oculi crystallino uitreo albugi-
neo, quemadmodum nec in cornea
tunica. Ex quo perspicuum est nutri-
ri eos, quidem per accessionem ex u-
no in alium, ueluti crystallinum ex ui-
treo, uitreum ex ambiente corpore
retiformi quod plenum quibusdam
arterijs & uenis, cernitur. Cornea ue-
rò tunica ex eo quod ab uuea defluit
10. de us. part.

50 Venæ & arteriæ medullam spi-
nalem ingrediuntur iisdem uijs, qui-
bus egrediuntur nerui, q; fit eodē mo-
do in cæteris partibus 4. de us. part.

51 Ner-

§ 1 Neruorū ratio huiusmodi est. Quibus mēbris minimo sensu opus fuit, molles, quibus uoluntario duri quibus utroq; utriusq; etiam generis nerui dati sunt, at quibus nullo omnino, nulli. 1 6. de us. part.

§ 2 Cutis per se nullis neruis est prædita, sed particuli quibusdam neruorum subiacentibus Musculis colligatur, à quib. sensum accipit. Ibid.

§ 3 Sensus ad cutim etiā pertinet quamlibet proprii nerui expertem, non minus quā ad membranas tunicas, arterias, uenas, matrices intestina, uētriculum, uesicam, & uiscera reliqua omnia. Ibid.

§ 4 Nemini debet esse mirū quod sensu cutis amisso, subsistentis Musculi motus maneat. Nervus enim p musculū sparsum adhuc integer est, particule uero quibus ei alligatur cutis læsæ sunt. Quod si cutis ipsa excorietur, Musculus tamen non minus mouebitur, quamuis non sentiat: at sentire quin moueatur nunquam poterit, motus enim agentis, sensus uero pa-

rō patientis est. 4. morb. & sympt.

55 Palpitio quæ est dilatatio præter naturam, omni parti, quæ dilatationem suapte natura admittit maximè accidere potest, aliarum uerò nulli: At dilatari nata sunt omnia, quæ naturaliter mollia existunt. Quamobrem cuti palpitatio, subiectisq̃ illi musculis & uisceribus uentriculo, uelicæ, matr. intest. hepatis, spleni & maximè cordi accidit. Ossibus autē & cartilag. quæ non dilatantur, quid duriora sunt non item. 5. morb. & sympt.

56 Glandulæ fluxionibus excipiendis maximè omnium partiū sunt idoneæ, tum ob substantiæ laxitatē, tū quia inter cæteras partes minimè robustas facultates (excepta alteratrice) sortiūtur, sicuti & pinguitudo. Post has pulmo, deinde Lien, tertio cerebrum. Quibus igitur hæc naturæ sunt robustiora. In his ad glandulas carnesq̃ deueniunt fluxiones ubi totus habitus est infirmus, ut in rheumaticis accidit. Galen. de uenesect.

57 For-

57 Fortiores partes ad proximas imbecilliores vires suas extendunt. Ex quo fit ut illa membra duplici uirtute, una quidem per se, altera per aliud, nempe per uicinum membrum participem. Gal. in Hipp. de uict. rat. in morb. acut.

58 Fit etiam nonnunquam ut ociosa corpora febrim ex huiusmodi fluxione forte contrahant, nonnunquam uerò ut exiccentur, uidelicet membris debilioribus malo cibo nutritis. Gal. de somno & uigilia.

59 Pus quidem in inflammationibus abscessibus atq; tuberibus, eandem habet rationem quam & humorum putredo in uasis: Siquidem utraque probè tum perficiuntur, cum alterandi ac concoquendi uis superat in illis. Pus enim optimum sic efficitur, album & crassum, ac undiq; sibi simile aspectui, tactui læue & præterea minimè foetidum. Urina quoque optima albam, læuem, æqualem & minimè foetidam habēs hypostasim. quod contrà omnino utrobique fit quan-

quādo imbecillis illa uis est. 1. de do-
minis febr.

60 Spacium uacuū in medio cor-
porum quibus abscessus fieri solet,
substātiā aliquā spirituosā, aut
humidā, aut mistā comprāhen-
dit, quæ ubi diutius hæsit, uarias al-
terationes suscipit. Nā & lapidibus,
& arenis, & testis, & lignis, & carbo-
nibus, & limo, & permul is alijs id
genus similia corpora in abscessibus
sæpe contineri inueniuntur. 2. ad
Glanc.

61 Virga masculi, & matricū sto-
machus, & alia quæ sunt circa puden-
dum ipsum membra, quia sensu exa-
ctiore indigebāt propter uereream
copulationem, optima ratione mul-
tis neruis & musculis sunt a natura
donata, quorum qui circa pudendū
ipsum sunt positi insigniores & ma-
iores, qui uerò alijs genitalium parti-
bus insiti fuerunt, subtiliores, & fe-
rè quales in hepate & renibus uiden-
tur. 14. de us. part.

62 Quoniā pendent testiculi ma-
sculo,

sculo, propterea & musculus utriq;
ex regionibus iliorum peruenit, ut n;
quoq; participant motu, qui fit im-
petu coitus. Ibid.

63 Humorem in partes organi ua-
cuas effusum, si uirtus integra est, in
sanguinem uertit: sin deficit aut im-
becilla est, in putredinem abit, non a-
liter quàm in corpore mortuo. Om-
nino enim ut ipsa se habet uirtus, ita
est corporis affectio. Gal. in Progn.
Hippoc.

64 Vbi calida fluxio procubuit in
musculū ac maiores arteriæ uenæq;
oppletæ distenduntur: deinde mino-
res, postremoq; etiam minimæ, & in-
de ubi per ipsarum ora una pars, per
tunicas alia transcolata est ad exteriora,
spacia uacua, quæ inter prima cor-
pora sunt, & sic nerui ligamenta, mē-
branæ caro ipsa, arteriæ & uenæ in-
calescunt. Maximè uerò uenæ, quæ
interius distenduntur, exterius uerò
præmuntur, morbus fit phlegmo-
ne dictum, quæ musculi intemperies
est inæqualis. Distatq; eò ab æquali,
quòd

quòd in omnibus intemperanter affecti corporis partibus, non insit æqualiter. Gal. de inæq. intemp.

65 Causarum morbos efficiētium nulla citius corpus contaminare potest, quàm uitiati aëris inspiratio (que causa pestilentis febris est) in corpore humores ad putrescēdum paratos habente. Nulla uerò causarum sine patientis aptitudine agere potest: alioquin ex æquo omnes afficerentur ab eadem causa. i. de febr.

66 Corpora diu sana, firma & bene affecta permanentia, nullis ex inuolidioribus causis mutātur. Quare nec inuenibus ualdē nocet ingurgitatio & ingluuies: At senibus uiris, & languidis uel modicis quantitatis atq; qualitatis in cibo excessis maximum adfert detrimentum. Galen. de sanit.

67 Affectio quæ appellatur senium ipsi marconi plantarum proueniēti ob siccitatis excessum quadam proportionē respondet, unaq; est omni genito corpori corruptelæ inter-

E ritusq;

ritusq; connata necessitas. Altera autem quæ præcipue in ipsis animalibus cernitur, totius substantiæ, fluor quem insitus calor excitat. Hæc incōmoda nullum quod genitum sit corpus effugere potest. Reliqua uerò quæ hæc sequuntur, & quæ ad unius rationem pertinent prouidentia consilioq; certè potest. 1. de sanit. tuēda.

68 Redundantiæ morbi oriri solent ubi quod exhalat à corpore minus est ijs quæ accipit. Quare prospiciendum est, ut eorum quæ eduntur & bibuntur respectu eorum quæ expelluntur, seruetur conueniens mediocritas. 6. de sanit.

69 In morbis redundantia ut seruetur modus detrahimus de nutrimenti, uel quantitate, uel qualitate: de quātitate quemadmodum dematur notum est: de qualitate demitur cum unius maximè alentis cibi loco, alius exigui nutrimenti apponitur. Ibidem.

70 Inueteratorum morborū, quales sunt asthma, calculus, hæmorrhoides

des narium, ulcera maligna, & huiusmodi alia sanantur partim in pueris quidem & infantibus ad quadragessimum diem, aliquando ad septimum mensem, nonnunquam etiam ad septimum annum. Partim uero sanantur pubescētibz genitalibus in masculis, in puellis certē mēstruis incipientibus. part. 6. de sig. mortis.

71 Temporales muscoli si læsi fuerint cōuulsiones, febres, sopores, deliria, symptomataq; lætalia maximē omnium inducunt, utpote cerebro existentes proximi, & per plures nervos, quā alij muscoli ipsi cerebro hērētes: quā ob causam capitis etiam ossibus abdidit natura. 1. 1. de us. par.

72 Quoniam corpora nostra perpetuò mutantur, nec in eodem statu manent: propterea data est ei à natura ad instaurationem eorum quæ ex quantitate sui effluunt, nutriendi & alterandi facultas, ad ea uerò quæ ex qualitate abeunt, spiritus duo, quorū unus pectoris motu, alter pulsu efficitur. 5. in 6. Epid.

E 2

73 Dis

73 Difficilis connexio est quoties uel in calidum uentris frigida, & pituitosa sanies defluit, uel in frigidum calida. Atq; harum duarum alteram semper expertus sum magis ad curandum rebeilem, nempe in qua frigidi pituitosiq; succi in calidum decidunt uentrem: pessimam uero, ubi praeter id, alius natura etiam solubilis non sit, nec uomere ex facili homo possit. 6. de sanit.

74 Conuulsiones quae ex plenitudine neruorum partium uel ex humore mordente, uel denique ex ingenti frigore oriuntur curari possunt. Quae uero ex neruorum particularum ariditate proueniunt nullus certe ipsis ad sanitatem est locus. 1 2. Methodi.

75 Qui ob siccitatem uehementem distenduntur & discrutiantur, si curari non debeant, humectationem desiderant. Sed si is affectus sit febris occasione contractus, percurata est difficilis, uel potius curationem non recipit. Ibid.

76 Quibuscumque cephalea intra calua

caluariam est, ijs usque ad oculorum radices dolor extenditur, propterea quod oculorū tunicæ ex cerebri inuolucris suam ducūt originem. 2. de comp secundum loca.

77 Cæphalea ex calore uel frigore semper grauis est, ex siccitate, leuior: ex humorum copia propè nulla nisi si meatus obstruantur. Nam pro quantitate obstruentium & replentium humorum nasci semper cæphalia potest: alioqui si absit obstructio, grauedo tantum. Ibid.

78 In parotidibus, quæ fiunt glandulis secundum aures affectis, nō utimur curatione reprimente, repulsoria ue, sicuti in partibus inflammatis. Sed pharmacis attractorijs, humores ex alto elicientibus, aut his nil efficientibus, cucurbitulas affigimus, aut fomenta assidua adhibemus, infestū humorem ad cutim trahentes præsertim si affectio in capite hæreat. 3. eiusdem.

79 In parotidibus si uehementi impetu redundantes influat humores,

E 3 nil

nil nos curiosius agentes omnia per-
mitteremus naturæ: quæ si eos nō dis-
cusserit supputatibus, pharmacis ute-
mur, ut frumenti farina cum oleo &
caricarum decoctio: aut eo quod ex
polline & fermento conflatur: At si
discusserit & suppuratae sint paroti-
des tunc aut per sectionem pus elice-
re oportet, aut per pharmacū absces-
sum rumpere: quale est similitum uo-
catum, & quod ex alijs constat: aut p
attractoria & remantia discutiemus,
bis in die ñsdem ablatis, & fomentis,
admotis, donec dolores remiserint.
tumq; semel tantum solutis, postea i-
pſis pharmacis permittere, siquid re-
liquum in profundo hæreat. Ibid.

80 Pompholyge lota (quæ est o-
mnium pharmacorū leuissima, utimur
ad tenues & acres oculorum fluxio-
nes, sed uacuato prius capite & uni-
uerso corpore. Capite quidē, i. garga-
rismo apophlegmatismo, corpore ue-
rò, uenæ sectione & purgatione. Vti-
mur etiam reuulsionibus primū qui-
dem ad infernam corporis partem:
dein

dein etiā ad occiput, & ad capitis cutem. Item sectionibus arteriarum, earum interdum quæ retro caput iuxta aures exporrectæ sunt, interdum uerò temporalium, postremò & collyrijs ipsi oculo proprijs. 4. de comp. secundum loca.

81 Thorax & iecur itemq; septū transuersum & cor nunquam œdematē pituitoso, neq; crasso sanguine affliguntur, propter densitatem corporum. Quapropter si quæ in ea fluxiones decumbant, omnino uel flauē bilis, uel calidi sanguinis, & tenuis sint oportet. 4. de puls. præcog.

82 Vbi pectus aut uētriculus, aut partes circa collum caput ne laborāt phlegmone, excogitatum est artus uinciari. Quippe pars affecta minimē uincienda est, sed si in manib. orta sit phlegmone, crura: sint in cruribus manus. 13. Methodi.

83 Vbi iecur phlegmone erit obsessum, mediocriter astringi per cataplasinata mistæ materiæ oportebit, quòd altricis facultatis principium

E 4 ani.

animalibus sit, & uenosum ab hoc exoriatur genus. Ibid.

84 Opportunissima ad scirrhum sunt iecur lienq̃, si quid parum habita de his ratione, glutinosis cibis utatur: itemq̃ Renes, quod ex eo perspicitur, quia nephritidas alias omnino solui non posse, alias ægrè uidemus. Crassa enim sunt substantia, & calculi uitio uexantur siquid crassi succi cibis nimium uescatur. Ibid.

85 Crassa quidem intestina sanatu sunt facilia, cōtrā difficilia quæ tenuia existunt. Ieiunum autem est omnino incurabile, tum propter magnitudinem, multitudinemq̃ uasorum, tum quod tunica eius neruosa, prætenuisq̃ sit, adde quod bilem synceram hoc intestinum recipit uniuersam, omnium maximè est uicinum iecinori. 6. methodi.

86 Marasmo afficiuntur corpora propter inflammationes, quando cōdensatis humoribus paulatim emaruit caro, & totū corpus arefcit. Gal. de introd. ad puls.

87 In

87 In phlegmonis & calidis abscessibus colligitur sanies, omnis intra uigesimalium diē, nec ultra producitur, in œdematibus uerò & frigidis intra sexagesimum. 1. Prognost.

88 Animal omnino mori non potest nisi prius ipsum cor afficiatur, ad cuius intemperatias immodicas mors necessario sequitur. Siquidem cum singulae partes peculiari temperie cordis suas actiones perficiant, hac profectò pereunte reliquarum actiones perire necesse est, ac proinde cerebri etiam & iecoris non contra. 5. de loci aff.

89 Corde affecto necesse est arterias pati, & de natura moueri, utpote earum principio affecto. Afficitur autem per cōsensum uicinarum partium maximè pulmonis. Deinde hepatis tum diaphragmatis & cæterarum deinceps. 4. de præcog. expuls.

90 Neruo subito morbum euasit sine crisi: multi uerò sine hac intereunt subito, plurimi in accessionum principijs, non pauci in accessionum par-

E 5 ticu-

ticularium declinationibus. In totius autē morbi declinatione, nullus unquam extinguitur propria morbi ratione, sed ob errorem commissum.
3. de cris.

91 Tres omnes mortis modi sunt. Primum in accessionum principijs in magnis inflammationibus præcipuorum membrorum uel humorū multitudine & crassitudine. Secundus in tempore status morbi uel natura superata: Tertius in declinationibus qui rarissimè accidit. Ibid.

92 Ut possis, qualem sit habitura exitum præsens crisis agnoscere, præuidereq; futuram, primum ac maxime omnium expendendæ sunt coctiones, ex urinis alui excrementis, atq; ex sputis ipsis. Quippe neminem uidi intereuntem, qui ex præcedētibus coctionibus crislī ipsam habuisset.
3. de cris.

93 Reuulsio quā longissimè à particula fluxione tērata, est semper molienda. Quia ratione, si hepar aut uentriculum, aut intestina plegmone occupat

cupare iam cœperit, medicamine q̃ aluum deſciat uti non conueniet, ne que urinæ prouocatione ſi ueſicam aut renes: neq̃ menſtruorum ſi uterum, at ſi pudibunda, uomitu uti, in diuerſa reuellens auxilium eſt. Eaſdem ratione in omnibus quæ circa caput accidunt,alui ſubductio in cōtrarium auertit. Si qua uerò circa fauces, & palatum & linguam, aut denique in ore phlegmone laborare cœperint in his omnibus canenda ſunt, quæ pituitam per os euocant, Græci apophlegmatifmos appellāt. 13. Methodi.

94 Cucurbita in occipite defixa, efficax eſt remedium ad oculorū fluxiones. Vacuari tamē totum corpus prius, expedit. Nam ſi refertum ſanguine corpus ſit, in quacunq̃ parte capitis cucurbitam defixeris, totum ipſum implebis. Ibid.

95 Verum cucurbita utendum in ipſa parte, quæ phlegmone afficitur, inter initia non eſt, ſed poſtquam uniuerſum corpus uacuaueris, & aliquid

quid uacuari posse uidebitur. Quod si sit necesse etiam initio uti, minimè ipsius membris quæ laborare incipiunt, sed his quæ continua his sunt imponi debebit, auellendi in contrariū causa. Ibid.

96 Medicaminum repellentiū genus, quibus utimur in principijs inflammationum, in materia refrigerantium consistit: quorum sanè ea quæ astringendi natura prædita sunt, efficaciorē uim habent ad ocys repellendum influxum, inest quippe ipsis statim etiam facultas cogendi & densandi superficiem corporis cui admoventur. 5. de comp. Med. secundum loca.

97 Quemadmodum in phlegmones curatione post totius corporis uacuationem repellentibus auxilijs utimur, sic in crysipelate, pro sanguinis missione medicamento quod bilem trahat purgandum, ipsam uerò partem afflictā refrigerādum. Cuius sanè refrigerationis terminus esto, coloris mutatio. Quod enim purum est ery-

est erysipelas, statim cū illa quiescit.
14. Methodi.

98 Regula Medicinæ obseruanda est, quæ præcipit cōpositione medicamentorum, ei quod morbo contrariū est, immisceri aliud, quod nec omnino sit contrarium, nec omnino augeat, sed medium, ut sit ueluti uia alijs. 7. de comp. secundum loca.

Addit Moyses.

Veluti cum mastichem quæ facultatis est astringentis, prærogantibus medicaminis miscemus immundi oris uentriculi gratia, ne scilicet omnino illa postea respuat, item cū gal-
lam, cū colocynthide, ne nimium soluat uentrem.

99 Qui prætenues succos habent ita ut ocysimè exhalent, syncope perunq; opprimuntur. Ac tanquam eos qui ex humoris multitudine syncope periclitantur, prorsus ad interitū spectare diximus, si uel his iecur, uel uentriculum phlegmone obsederit: idem ij de quibus nunc agimus, insanabiles sunt existimandi, si uiribus

bus iam languentibus: aliquod egrū
uiscus phlegmone infestetur, quoni-
am nec assidue eos nutrire fas est, sed
tantum in remissionibus: nec serua-
re eos si modo nutrantur licet. 12. Me-
thodi.

100 Quum per magna differen-
tia humanorum corporum sit, ob id-
que unicum medicamentum omni-
bus conuenire non possit, duo sem-
per in perpetua habenda: quorum al-
terum sit ualentius, sed ex similibus
genere confectum: alterum mitius
& blandius: quæ inuicem temperās-
dum postulabit usus pro uarietate
mistræ, permulta alia media inter i-
psa constitues. 3. de comp.

med. secundum
genera.

DE

DE PULSIBVS ET
eorum definitionibus.

Sectio III.

I.



Vlsu generando
rū duplex est usus,
primus atque maxi-
mus tutela natiui ca-
loris: alter uerò ani-
malis spiritus gene-
neratio. i. de præcog. expulsi.

2 Pulsus ex gemino motu constat
contractionis & distensionis, in quo-
rum utroq; gemina quoq; quies acci-
dit, una quidem à distensione prius-
quam contrahatur: altera à contra-
ctione priusquam distendatur. i. de
dominis febr.

3 In pulsu, tarditas quidem & ce-
leritas in distensionis contractionis-
que tempore collocatur, crebritas ue-
rò & raritas, in utraque quiete, at
Rhythmus dimensio est temporis di-
stensionis, & simul insequentis eam
inquietis, collati ad tempus contra-
ctionis

ctionis simul & excipiētis eam quie-
tis. Ibid.

4 In solis uehementissimis pulsi-
bus exactè rhythmus dignoscitur, q̃
in cæteris magna pars initij distensio
nis & contractionis finis nos fugiat,
id quod maximè offendit, 3. de di-
gnoscat.

5 Vehemēs æqualisq̃ & magnus
pulsus, semper uirium robustarum
est signum. Quare si in septuagena-
rijs is adsit, affectusq̃ iubeat, etiam
in ijs secabis uenam. Galen. de uenæ
sect.

6 Pro ætatis qualitate, hoc pacto
pulsus uariantur, infantis pulsus cre-
berrimus & celerrimus, rarissimus
serius & tardiùs omnes, qui inter
hos intercedunt, proportionem ser-
uant, prout ad puerum, uel ad senem
accedunt propius. At in uehemen-
tiæ & magnitudinis differentia, ma-
ximus & uehementissimus, & iue-
num pulsus, minimus & languidissi-
mus senum medius, & paulò maior
pulsus puerorum. In quibus anima-
lis spi-

lis spiritus cum instrumentis augetur, dum adoleuerint, inde uerò semper minuitur. 3. de caus. puls.

7 Pulsus raritas summa nunquam uacat periculo, sicut nec remissio, neque paruitas, sola extrema uehementia in pulsibus non modò uacat periculo, sed etiam est maximè utilis. Preterea ueloces pulsus tardis sunt securiores: siquidè summa celeritas, summa tarditate est securior. Nam summa tarditas sicuti raritas tum incidit, cū calor naturalis extinguatur. 2. de præcog. expulsib.

8 Inæqualitas motus collectiua dicta, hoc est, quæ in compluribus arteriæ motibus æqualitatem rumpit, commiatur semper cordiæ intemperiem uitiaq; instrumentorum, & facultatis plenitudinem, quoad uires, compositionem, duritiem, &c. 2. de caus. pulsib.

9 Non omni facultatis lēioni succedit collectiua inæqualitas. Siquidem cum per se infirma est, nō ita crebro; At ubi suapte natura est ualida

F op.

opprimitur autem à copia humorũ,
aut etiam contumacia instrumenta
fortitur, tunc illam inæqualitatem ef-
ficat. Ibid.

10 Contumacia instrumenta fiũt,
uel obstructionibus, uel compressio-
nibus, uel duritiẽ, quæ sanẽ durities,
inflammatis scirrho affectis, relicca-
tis, perfrigeratis, ac deniq; distentis
accidit instrumentis. Ibid.

11 Ictus in pulsu est is propriẽ mo-
tus uiolẽtus, qui dum tangimus, ta-
ctum facit comes semper durĩ, uehe-
mentis, magni celeris, alti, conuulsi-
ui & uibrati pulsus. 4. de dignosc.
puls.

12 Duo tantum genera habentur
pulsuum uolenter ferientium, nem-
pe uehementium & durorum. Qui-
bus autem carnis nostræ natura cẽ-
dit, ea dura uocantur, quæ uerò car-
ni, hæc mollia. Veluti manus, aquæ
rapido fluctui occurrẽs, ab ipsa euer-
titur non tamen premitur: at si lapidi
occurrat, quem altera manus sensim
admoueat præmit à lapide, lapis ue-
rò ab

rò ab illa eueritur, durus igitur pulsus proprium est præmere, uehementis euertere. Ibid.

13 Durum simul & uehementem non raro eundem cernas, sicuti & durum simul, & uehemētissimum: at uehementissimus, & durissimus nunquā idem existit: nec maximus uehementissimusque atque idem tardissimus.

Quippe uehementissimi & maximū maiori ex parte sunt celeres: sin minus at non tardi. 2. de diagnosc. puls.

14 Quietem superiorem, quæ secundum distensionem præcedit contractionem, quāta sit tactu queas ad unguem assequi, inferiorem non itē planē, quod utrinque sibi asciscat partes, ad initium quidem, contractionis extremitatem, ad finē uerò principium distensionis. 1. de dominis puls.

15 Facultate ualente nunquā pulsus, ad summum paruus esse potest. 1. de præcog. expuls.

16 Si cor quidem calidius sit, frigidiores autem arteriæ, ipsa motuum

F 2 ex

exordia utrobique fiant, si modo uenit
à corde, facultatem citra lesionem re-
cipiant. Cor tamen singulis arteriis
maiores, celeriores, uehementio-
remque pulsum habebit. 3. de precog.
expuls.

17 Nonnunquam in corde ipso
percipitur temperamentorum pug-
nantia, nam modo frigidius uisceris
corpus æquo est, & in uentriculis con-
tenta substantia calidior: modo edi-
uerso substantia frigidior: cor autem
calidi, ubi etiam pulsus fiunt mode-
ratis similes, qua in re multi quidem
& periti decipiuntur. Ibid.

18 Solutæ uires primùm langu-
dum ac ualde frequentem pulsum ef-
ficiunt: præstæ uerò pulsus mutant,
cùm in reliquam omnem inæqualita-
tem & ordine confusionem, tum in
eam, quæ in uehementia spectatur &
magnitudine. Nam inæqualitates hæ
oppressarum uirium maximè propriæ
existunt. Gal. introduct. ad puls.

19 Febres putridas comitatur in
initijs quidem pulsus parvus ac ue-
lox,

loxx, quum uerò consistunt, uelox simul & magnus. Sic & quæ circa externam quietem uersatur frequētia, in huiusmodi febribus deprehenditur manifestè. 1. de dominis febr.

20 Morsus uentriculi, uomitus, nausea, singultus, appetitus, priuatio atq; dissolutiones: præterquam quòd pulsum paruum efficiūt & languidum, ipsum etiam minus frequētem reddunt, & quibusdam moderatur celeriores. Compressio autem sola citra ea omnia rerū, tardū, paruum, obscurum. Præterea quibus fames est magna, pulsus est eiusmodi.

21 Inæqualitas pulsuū, quæ ferè inuadit una cum accessionibus, compressarum, uel obstructarum modo arteriarum, uel copię humorum opprimentium facultatum est signum. 3. de præcog. expulsi.

22 Pulsus in utramq; partem mutatio, si citra alienam occasionem acciderit, accessionis initium nunciat. Ibid.

23 Existimare conuenit, ubi acer-

F 3

uus

cus materiae humidæ initio accessio-
nis ad cor peruenerit, in primis qui-
dem mortis periculū esse quod præ-
nunciat maxima mutatione pulsū,
in raritatē, tarditatem pernītatēq̃.
Nam si his insignis remissio succe-
sit, ex tempore peribunt. Ibid.

24 Nec magnus pulsus, nec uehe-
mens unquam cum febribus hec-
ticis coeunt, sed si alterutrum habeant
horum, minimè sanè sunt hec-
ticae. Ibidem.

25 Febres putridæ initio accessio-
nis magis augent contractionis cele-
ritatem, in incrementis cum hanc, tū
externam etiam quietem plurimum
concitant, ut pulsus in illa creberri-
mus esse uideatur. At in uigoribus,
utrumq̃ motum contractionis & di-
stentionis habent celere. Atque hi
pulsus febriū per se sunt proprii, nec
unquam fallunt. Ibid.

26 Vbi per totum corpus sensu
nostro pulsare nulla arteria percipi-
tur, is affectus dicit̃, pulsus priuatio,
reuerè tamen in corpus uiuum nun-
quam

quam cadere potest, neque enim est unquam, quin cor unâ cum arterijs in omnibus agitetur. 1. de præcog. expuls.

27 Pulsus tremulus non admodum est conspicuus, languidusque est simul & parvus. Facultatem autem imbecillam, tunicam arteriæ mollem, corporisque gracilem nūciat habitum. 2. de præcog. expuls.

28 Frigidæ cordis intemperies pulsus per nos, tardos, rarosque efficiunt. Ac primū crebritas mutabitur, deinde celeritas, ultimò magnitudo, si quidem illæsa facultas fuerit: nam si sit offensa, ad paruitatem, & tarditatem potius, quàm ad raritatem pulsus mutabitur. 3. de præcog. expuls.

29 Inæqualis pulsus in plurimis quidem crisi- bus fit, & præcipuè cum nō fiunt sine periculo & pugna. Undosus etiam & insigniter mollis, sudores, críticos, expectandos nuntiāt. Durus uerò uomitum magis, quàm sudores, altus omnimodæ excretionis est index perinde ac uehemens.

F 4

Si

Si uerò magnus extiterit, motus ad exteriora potius per fluxum sanguinis, quam ad interiora per aluum & stomachum indicatur. 3. de Cilib.

30 Mollitudinis in qua est pròptitudo distentionis, comes est magnitudo, renixus & contumaciæ, paruitas, itemq; illius & huius tarditas nō tamen ex æquo, paulò enim celerior est pulsus à mollitudine instrumētorum profectus, eò quem procreat durities, maior autem permultò, quia tunicæ arteriæ quāuis duriores sint, ad celeritatem quandam sunt faciles ad magnitudinem uerò distentionis ineptissimæ. 1. de caus. puls.

31 Solutarum ob alimenti inopiā uirium, pulsus uertuntur quidē principio in languorem, paruitatem, celeritatem, ac frequentiam, ad mediā autem in languorem, paruitatem, tarditatem & raritatem. Postremò in paruitatem summam languorē, frequentem, & eumentitam celeritatis imaginem, qui pulsus dicitur formicans. Gal. introd. ad puls.

32 Ver

32 Vermicans pulsus fit uiribus iam dissolutis, sed aliquātum adhuc resistentibus, nō autem ad summum languorē deducitur, sicut formicās: Estq; præterea inæqualis, sed minime malignus. Gal. introd.

33 Inæqualitas, æquabilitatis est labes in quacūq; pulsum doctrina accadat, quæ fit dum partes moueri tempestiuus aut serius incipiunt. Ibidem.

34 Marcessantium pulsus nō simpliciter, neq; secundum unam speciē mutatur. Qui namq; una cum phlegmone nondum soluta paulatim emartuerunt, pulsus habent languidos, celeriores, frequentes ualde, atque cum depressione in angustum redactos, qui uocantur Mynri.

35 Quemadmodum undoso pulsui succedit uermicans imminuto, ita formicans uermiculanti, ubi multis amissis motibus in unū eundemque prorsus paruum desiuerit. i. de dominis puls.

36 Formicantis inæqualitas præ
F 5 exigui-

exiguitate non potest percipi, est enim hic pulsus parvus, quo nec alius est minor, languidissimusq; & creberrimus, non tamen celer. Ibid.


37 Arterijs tangendis manus ipsa quæ tanget, non modò promptè lenitiat oportet, uerumetiam sit mollis, sic enim uel minimos motus dignoscet. 1. de dignosc. puls.

38 Contractionem autem comprimendo magis, quàm leniter attingendo dignoscet, nec minus si infernè quàm si supernè tangas. Perinde enim utrobique contractionem tactus sequitur. Ibidem.

DE

APHORISMI.
DE VRINIS.
SECTIO III.

91



Quoniam quidē febris
omnis ægritudo est in
uenis (nam & arterias
hoc genere cōprehen-
dimus) necesse est pro-
fecto in ijs ex urina indicium sanita-
tis quærere. In ijs autem qui laterali
morbo afficiuntur, primum quidem
sputa, secūdo loco urinas: quoniam
is morbus omninō cum febribus ori-
tur ut in passionibus uentris, si sine
febre fuerint, sola excrementa inspi-
cere oportet, si autem cum febre, eti-
am urinas. 1. de Crisibus.

2 Optima urina quę ex putrescen-
te humore perficitur, qui adhuc con-
coctionem à continenti uase suscipi-
at, est quę albam, leuem, & qualem &
minimē foetidam habet hypostasim.
Pessima autem quę in omnibus ma-
ximē contrario modo habet.

3 Urina consistentia & colore un-
diq; æqualis superiorem esse naturā
mor-

morbo indicat. Bullæ uerò in ea nantes, & ab humore frigido spiritû flatuosum ambiente factæ, methriticum & locum morbum prænunciât, 7. Aphorif.

4 In ægrotis urinarum illa optima est, quæ urinæ sanorum simillima, nempe subrufa uel subflaua, magisq; subrufa, quàm subflaua. Itē quæ subsidentias habet albas, & læues, & æquales, aut nebulas quasdam, aut suspensa similia, hæ siquidem omnes urinas bonitate præcellunt. 1. de Crisibus.

5 Pessima omnis denigrata urina, est, adeò ut neminem unquam sanatum uiderim, qui talem minxerit. Minus tñ perniciosa est si sola sit hypostasis nigra: atq; adhuc minus si solū, id quod in medio pendet, ac multò minus etiam si nebula. Ibid.

6 Urinarum turbidarū triplex est differentia, una quæ cum talis mingatur, paulò post residet altera, quæ semper similis permanet, tertia quæ pura quidem mingitur, postea uerò
contur

conturbatur. Ac praua quidem ex dietis tertia est. Bona autem prima, media inter utramque est secunda. Siquidem prima illa aliquid inæqualis turbulentia super esse demonstrat. Secunda uigere adhuc, quæ est in sanguine agitationem, tertia tantum incipere concoqui, quare deterrima est: nam longiori tempore & uirtute fortiori indiget ad concoctionem. Ibid.

7 Omnibus ijs, qui ex ocio & repletione febricitant, si sanitati restitui debeant, in urina plurimum necessario subsidet: contra ijs qui ex inedia, & labore rubida simul, & biliofa excernuntur. Soluitur quippe morbus priusquam subsideat aliquid, sufficitque in his, & nebula, & suspensio optima qualis est alba lauis & æqualis. Ibid.

8 Quando febris ex crudis humoribus nascitur tum plurimo sedimine repletur urina. Cum uero ex cholerica seu biliosa nullo protinus aut certe exiguo. Gal. in prognost. Hipp.

9 Urina quæ ad summum incocta est omni

est omnes turbidas malignitate superat. Est enim aquosa exquisitè, ac proinde ueluti desperatæ concoctionis, affectioq; uenneosæ naturæ existit, quæadmodum uentris cruditas. Ibid.

10 Urina pinguis & alteram biliû speciem referens, pinguedinis liquefactionem ab ardore febris indicat, quemadmodum & carnis, si quando olei colore mingatur, quam carnis liquefactionem periculum mortis sequitur. In 2. Epid.

11 Vbi urina celeriter mingitur, *ὑδαρὸς* & Diabote appellatur, extinctæ utriusq; facultatis retentricis, & alteratricis indicium: estq; inter omnes crudas urinas pessima. 1. de Cris.

12 Quæ farinæ hordeace crassior in urina sunt subsidentia similes, grandis colliquationis & ardentissimi incendij sunt signa. Ibid.

13 Optima omnium urina subflaua & subruffa est. Cæteri colores omnes perniciosi. item si quid aliud præter hæc, nempe *ὑαλὶνὴ* suspensionem in medio, *ὑπόκρηξις* subsidetiam, &

& νεφελήν nebulam eminentem appareat, id omne perniciem indicat. Ibidem.

14 Nil aliud oportet considerare in modo crisis præter naturæ ipsius inclinationem. Distinguendum autem est, an calidus & acutus sit morbus crisisq; in primis fiat periodis: quippe necesse est tunc post crisim non abscessum, sed excretionem subsequi. Attardi & diuturni morbi per abscessus quiescere consueverunt, precipue si urinæ tenues & caudæ longo tempore exierint. Ibid.

15 Frustrula quedam seu grumi simul cum urina nonnunquam ægrotus emittit: quæ si hordei aut lenticulæ similitudinem habent, ab hepate malum esse significant, si carnis potius comminutæ, à renibus: si teredinis ac ramentisculorum, à vesica: si farris non nigri, à nervis & carnis liquefactione. Sin uerò nulla sint frustrula, sed sit urina nigra omnino, à splene, si pinguis à pinguedinis liquefactione esse malum significat. i. in 6. Ep.

Ad.


Addit Moyses.

Quod ex iam recitatis Galeni uerbis de urinarum iudicio discere potui, summam, id est: Optimam urinam omnium esse in morbis eam, quæ laudatum & probum habeat, sedimentum, primamque dici, quod concoctionem fieri indicat, alteram quæ illi & bonitate, & numero secunda esset, eam quæ turbidior omissa paulò post resideat, quæ concoctionem incipi tantum iudicatur. Tertia quæ turbida eiecta, rarescit quidem & attenuatur, sed in funda nil residet, quæ tempus concoctionis nondum adesse monstrat. Quartam, quæ & turbida mingit, & sic manet: quæ à concoctione, magis quam superiores abest. Omnium uerò maliciam superare eam, quæ tenuis raraque emittitur, eademque semper manet, quæ nullam omnino esse, nec futuræ spem concoctionis. præbeat.

DE

DE SIGNIS MOR-

borum. Sectio V.



Poplexiæ seu morbi attoniti signa sumuntur ex affectione spiritus. Si enim respiratio omnino nulla sit, peior esse morbus non potest. Sin sit quidem, sed intermittatur & magna cum uiolentia trahatur, uehemēter afficitur, sed non fieri similiter. Si uerò respiret exiliter quidem, sed uno ordine, minus lēditur & adhiberi remedium à diligenti medico potest. Ex Moyse ipso.

2 Amittitur spiritus deficientibus uī, motuq; pectoris, aut nimio frigore cerebrum occupante. Gal. in 4. Aphorif.

3 Delirium ex solo calore, nulla materia corrupta natum, simile est ebrietati. At quod ex flaua bile incensa oritur, temeritatem, sollicitudinem & tristitiā infert: & plerunque si fortē incensior fiat, utramque bilem

G admisce-

admisceat, maniam. in 6. Aphorism.

4 Sternutatio in morbis diuturnis, si modo non sit in pectore morbus, omnino bonum est signum, significat enim concoctionem fieri & cerebri uim ualidam esse, in primum Prognost.

5 Vtriusque plenitudinis quantitas ex priorum signorum magnitudine definitur. Si enim grauis quodammodo sibi homo uidebitur, plenitudinem quo ad uires creuisse constabit: Sin auctus fuerit tensionis sensus, auctam quoque plenitudinem quo ad uasa, qualitas uero partim ex colore humorum, partim ex iis, quæ eorum naturæ coniuncta sunt. Gal. de sang. missione.

6 Venarum tumor forsan poterit esse plethoricum signum, inseparabileque ubi corpus ita se habuerit, ut neque externa interius, neque hæc illis caleant magis, nec præterea calor immodicus uniuersum corpus detineat. Carnis autem & adipis moles, etsi eorundem multitudinem indicabit,
non

non tamen eius plethoricæ plenitudinis, quæ uacuationem desiderat, signum existit. Gal. de plenitudine. & paulò post. Iam rubor si nec ex sole, nec ex balneo, nec ex immoderato exercitio, neque ex calore, nec ex ira iracundiæue, neque ex alia denique occasione extrinseca oriatur, sed undequaque æqualiter corpus fuerit sic affectum sanguine plenitudinis nobis indicium existit.

7 Pituitæ species (præter crudam) sunt dulcis acida & salsa: ex dulci fiunt somnolenti: ex acida cum redundat, famelici: ex salsa siticulosi, à cruda autem denicitur appetentia somnolentiamque etiam efficit. Humectat enim & refrigerat cerebrum, quod est sentiendi principium: unde soporescit, quemadmodum in uigilias illabitur, si siccescat & incalescat. Ibid.

8 Aegroti iam garrulitas, iamque diuturna taciturnitas melancholiam, cum phrenesi seu delirio iunctam significat. Quod enim garrit, delirij est: quod uerè silet, melancholiæ. Gal. in 3. Epid.

G 2

9 Sua

9 Superflui humoris inuacuatio fit, aut solutione uētris, aut urina, aut sudore. Cū autem natura ex se harum trium alicui imminet, à duabus reliquis abstinere oportet. Quamobrem si per sudores crisis futura est, constypandus uenter & retinenda urina est. Sic enim facilius primum rigescit corpus, deinde sudat. 1. in 6. Epid.

10 Lippitudo in oculis, uel in facie sudor ægroti, pulueris modo exiccatus, malū portendit ægrotō, quē admodum in morbis acutis, uisus detrimentum significat, caligatio seu uisus obscuritas. Ibid.

11 Morborum symptomata etiā si sunt grauissima si facies naturalis & pulchra appareat, non est periculum timendum. Contra uerò symptomate minimē periculoso, uultu autem à natura alieno apparēte, nusquam est tutò fidendum. Gal. 6. in 6. Epid.

12 Melancholici ferē sunt omnes timidi, n̄sq; res quam timent, si morbus simplex unaq; est, cernitur eadē
una.

una: at si mixtus compositusue, gemina ipsa duplexque apparet. Augetur autem ipsiusdē pauor timorque pro morbi magnitudine: quæ uirtus animalis fore compositionem corporis sequitur. Gal. in 6. Epid.

13 Certissimum uirium signum in egroto est, oculorum apertio eadem quæ in sanis. 4. in 6. Epid.

14 Ex colorib. linguæ, facile quis humor in uenis hepatis, Renum, uesicæ, & uiscerum præcipuus sit, discernitur. Si enim nigra est, siccum febremque ardentissimum esse signum est. sic de cib. Gal. in 6. Epid.

15 Cibus dulcē & molliter suauem soli, qui sani sunt sapore discernere possunt. Aegroti reliqua possunt tantum etiam pro ratione morbi diuersa. 5. in 6. Epid.

16 Sudor frōdis aut colli, aut thoracis in ægro, uirtutis animalis debilitatem significat. Frequens autē cruditas & ciborum putrefactorum itēque panis crassi appetitio, lumbricos uentris. 7. in 6. Epid.

G 3.

17 Bi-

17 Bilis atra semper est lätifera, siue in sputo, siue uomitu, siue in urina excernatur. Secundum hanc uerò flaua, si pura simplexq; sit, cæteri humores minus periculosi in huiusmodi excrementis. Gal. in 2. de humoribus.

18 Bulle in lingua turgētes magnitudine penedactyli significant hominem uix diem secundum euasurū. Tumor autē niger in digitis manus, orobi magnitudine, quæcunque febris specie laboret æger, si grauem inde dolorem senserit, quarto die moriturum indicat. In 6. de sig. mortis.

19 Exactæ bilis atræ humorē, qui ex humore atro nēpe facie, aut amuricæ instar sanguinis, supra modum assato generatur, semper excerni ad perniciem animaduerti. Gal. de atrabile.

20 Qui in humorum cognitione & experientia est uersatus, causam facile uidet, cur atræ bilis excretio sit periculosa, nigrorū uerò excrementorū non sit. Cū interim inexpertus mīretur

retur illud hac ratiocinatione ductus
quod noxiæ rei effluxio nullo modo
nocere debeat, sed potius prodesse.
Ibid.

21 In uniuersum nemo seruari po-
test, nisi natura superauerit morbum,
nec perire nisi illam morbus prostra-
uerit. Morbi autem singuli ex sua na-
tura magnitudinem quandam possi-
dent, quam si uires superent omnia
probè eueniant, sin supra hac ipsa fu-
erit, opprimuntur & homo prorsus
moritur. In ijs uerò ascensus uirium
superantium in concoctionis signis
consistit, quemadmodum in ijs, qui
morituri sunt in cruditatis & letalib.
Gal. de totius morbi temp.

22 Cuiusq; partis superfluitas, eã
quæ illi inest dispositionem ostendit,
si cocta quidem fuerit salubrem: cru-
da autem, egram. Veluti alui, sanita-
tem, excrementa mollia, & cohæren-
tia, & eorum exitus eadem hora, qua
in sanitate solebant. Et sputū, instru-
mentorum respirationis & urinæ, ue-
nosorū instrumentorū. i. de Crisib.

G 4

Cocit

23 Coctionis signa nunquam male apparent: decretoria autem est, ubi male. Neque enim in augmentis, neque in principiis, sed in statibus illa apparere conuenit. Ibid.

24 Supinum iacere & hiare cum stercore, aut exolutionis, aut ebrietatis, aut ignauiae sunt signa. Galen. de motu Mus.

25 Phrenitis signa modò cum febre, modò sine febre ex melancholico succo de preassata bile facto, in cerebri uentriculi mentibus retento gignitur, nonnunquam mitior, ubi scilicet à pallida bile ortum trahit, interdum uehementior est ubi flaua bilis eam peperit: nunquam uerò eam pituita generat. 3. de locis aff.

26 Februm ardentium symptoma delirium est, quod nimirum fit, elatis ad cerebrum multis uaporibus calidis. Eam autem insaniam speciem, quæ breui melancholicum uocat, succus melancholicus inducit, ubi in corpore cerebri abundat. Ibid.

27 Affectio suffusioni per similes
à uen-

à uentriculi dispositionibus ortum trahit. Namq; uentriculo cerebrum, cerebroq; uentriculus suas affectiones transmittit, propter neruorum à cerebro ad os uentriculi descendentium magnitudinem. Vnde & fracturas capitis, ubi ad membranas perueniunt, uomitus biliosi, & quosuis capitis dolores mausia, stomachique morbus consequantur. Ibid.

28 Eorum quibus dimidia capitis pars dolore infestatur (uocantur hemiconici) alij extra caluariam, alij in intimis capitis partibus dolent, fit autem is dolor, ex uaporosi calidiq; spiritus repletionem, aut ex biliosis excrementis, ac spiritus quidem dolores sensus pariunt biliosa excrementa, mordaces, plenitudo, grauitatis sensum; At si rubor adsit & calor, calidos esse in causa humores est signum Ibid.

29 Si afficiatur posterior pars cerebri, reliquarum faciei partium motu & sensu incolumibus, solius linguae motus uitatur. Cum enim à par

G 5 te an-

te anteriore cerebri, facies suas ner-
uos recipiat, à posteriore uerò om-
nes partes, quę sub capite sunt, à qua
oritur septima neruorum cōiugatio
in musculis linguę insertorum, non
ab re quidem altera cerebri parte au-
steriore affecta, reliquę anteriores
manent incolumes: quemadmodū,
parte altera anteriore affecta, sola li-
guę motio uitio caret, in altera om-
nes faciei partes sensu & motu uolū-
tario destituuntur. 4. de locis aff.

30 Si in iecinore attractrix facul-
tas quomodocunq; afficiatur, cibum
quem confecit uenter, atque in
chylum conuertit, relinquet ut liqui-
dus excernatur per aluum, atq; hoc
ipsius facultatis affectu erit signum.
Siquidem quicquid ab aliquo profi-
ciscitur tanquam à causa, id etiam ef-
se illius signum constat. 5. de loc. aff.

31 Phrenitidis signa seu sympto-
mata sexdecim præcedūt, utputa im-
mensa uigilia, somnus uarijs imagi-
nibus turbatus, rerum omnium quę
faciunt ægri obliuio, tumultuosa aut
teme-

temeraria responsio, modica & exigua sitis, occipitis dolor uehemens, oculorum squalor, aut ex altero horum acris lachryma, lippitudo, uenarum tumor, sanguinis & naribus stillatio. Quo tempore nil exacte prudenter respondent: floccos uellunt & festucas carpunt, & acidiori febris torquentur, lingua quoque ipsa aspera est, nonnullique auditu falluntur, atque interdum acet cogitabundi. Quinetiam uel dolorifica dolore affecti, uel aliquo acius praementente, ceteros haudquaquam sentiunt. Ibid.

32 Fluxus sanguinis, & naribus, lienis, hepatisque soluit inflammationes ubi simul adest acuta febris, sicuti & reliquas quae sub praecordiis fiunt feruētes acutasque omnes. At per directum ex parte affecti uisceris cum fluere oportet, ex dextra quidem, patiente hepate, & locis sub dextris praecordiis positus: ex sinistra autem, liene & uicinis illi partibus. 3. de crisib.

33 Omnino quae inter animalia & plantas uelociter crescunt, breui etiam

etiam tempore cadere solent. Gal. in
2. Epid.

34 Accidit interdum in morbis quibusdam acutis, ut vitiosi succi in pulmonem decidant, qui si sint pauci, non inflammantur, sed per sputa eiciuntur. Id uero medici imperiti conspicientes, pleuritida continuo uel peripneumoniam, sed falso esse credunt. In 6. Epid.

35 Tussis malignae causa est, uel humorum a capite fluxus, uel phlegmone, aut abscessus in spiritualium partium aliqua, natus, aut denique sanies putrida in pectore collecta. Arida uero earundem partium intemperies, & gutturis ac tubi pulmonis crassities. In 6. Epid.

36 Causae dyspnoeae seu difficilis respirationis sic explorantur. Si uideris aliquem respirantem aegre, ita ut inter respirandum thoracis omnes moueantur muscoli, pectusque etiam una cum scapulis attollatur, certe ex tribus unum conicere oportem, aut uirium imbecillitatem, aut uiaum spiritus

ritus angustiam, aut uehementem in
corde & pulmone caliditatem. Ac ca-
loris quidem uehementiam indicat,
omnium thoracis musculorum di-
stensio, ueloxq; & frequens eorum
actio, & spiritus calidus ac feruidus.
Imbecillitatem, spiritus per nares tan-
tum emissio, narium pinnis manife-
ste dilatatis, nec ulla per os facta ef-
flatione. Angustiam uero totius tho-
racis plurima celerq; & frequens di-
stensio, & absq; ulla efflatione exspi-
ratio. Si uero couenerint calor & an-
gustia, quod fit in peripneumonia,
nec maxima, nec frequentissima, ut
celerissima spiratione sufficere potest,
sed surgere conantur a gri, quod sic
melius eis thorax dilatari uideatur.
Difficile autem est sic affectos cura-
re. Quod si tres omnes cause coiērit,
mortem proximā adesse tumore o-
portet. 4. de locis affect.

37 Vexatur interdum pulmo inæ-
quali, sicuti & æquali intemperie ci-
tra humorum affluxū. Inæqualis qui-
dem tussim excitat: æqualis uero, si
mode

moderata sit, spirationis concinnitatem uariat, sin uehemens & quidem calidissima, frigidi aëris, & potionis cupiditatem inducit, fitq; febris tractu temporis. Frigida uerò si modum seruarit, calidi aëris & calidæ potionis desiderium facit, sin modum excedit, replet uiscus ipsum fluxionibus. Ibid.

38 Si citra febrim in pleuritide serosus aut pituitosus humor defluens excitaret spirandi difficultatem, æger tunc tenue sputum, ab initio quidem exiguum, sed cum uehementi iussi, ubi uerò concoctum est plus atque crassius, & cum mitiori tussi expuere solet. Ibid.

39 Pleuritidis inuadentis, signum certissimum est perpetuus lateris dolor, nulla cataplasmatum appositione remittens. Vehementis autem, sputi crassi, lentiq; repletio, difficulter efferentis se, utpote multo & uehementi spiritu ad id egentis. In i. de mor. acut.

40 Corpora ad similitudinem aliquius

cuius morbi à natuta affecta, facile in eum incidunt, ut hydropicis similia, in hydroposim, pthilicis, in pthilim, seu tabem, melancholicis in melancholiam. Item & animorum affectus indicant. Maledici enim & conuitiatores in insaniam, similis illi uitio naturæ affectū in fluuios cadunt, inconstantes & leues ac mobiles, in delirium &c. 5. in 6. Epid.

41 Singultus si phlegmone affecto hepat accedat periculosus est, sic spasmus si uigilijs & tussis, hydropisi. At sternutatio, si singultui simul incidat, eum dissoluit. Gal. de sig. mortis.

44 Intemperies cordis interdum in eius uentriculis cōtinetur, ex quo ei tremor fit interdum in corpore ipso uisceris, & tunc nullo tremore afficitur. 3. de præcog. expuls.

43 Ab accidentium proprietate, effectuum indicia oriuntur: ut quibusdā per tabificos morbos ungues adunci euadunt. Per intempestium horrorem cum febre, inflāmatio ad suppurationem transire significatur, per

per linguam nigricantem, ardens febris. 1. de locis aff.

44 Sicut actionum noxæ, affecta partē notant: sic differētiæ ipsum affectum ostendunt. Ea igitur sola sunt affectuum propria signa, quæ per accidens ipsos sequuntur. Ibid.

45 Melancholiæ hypochondriacæ & flatulentæ, quæ a uentriculo oritur, signa sunt, post sumptum cibū concoctū difficilem, ructus acidi cū eo'que & flatus, & æstus, diuiditur paulò post fluctuatio in præcordiis, uentriculi uehementes dolores, qui ad dorsum usq; nonnullis extenduntur: à coctis cibis quies, ab alijs ingestis eorundem symptomatum reditus, quæ interdum ieiunos, à cœna affligunt, & pituitum, adeò non nunquam acidat uomitus, ut dentes torpēre uideantur. Præterea, mœsticiam & metus perpetua sunt illi: item certissimum si alui deiectione, uomitus proba concoctione, ructibusq; leuetur is, qui laboras. 3. de locis aff.

46 Inseparabilia lateralis morbi sym-

symptomata sunt febris acuta, dolor proinde ac si locus, uel intendatur, uel pungatur, spiratio frequēs & exigua pulsus paruus, arteriam & durā & quodammodo tensam indicans, tussis magna ex parte cum coloratis sputis. 5. de locis aff.

47 Iecur declarant magna inflammatione affici grauitas in dextera præcordiorum parte, dolor tota præcordia retrahens, atq; ipsius ad iugulum usq; extensio: exigua tussis, linguæ color in primis quidem ruber, deinde uerò niger, ingens cibi fastidium, inexplibilis sitis, uomitus tū sincere, tum eius, quæ anorum luteis assimilatur bilis, quæ aliquando æruginis quoq; colorē refert. Alui quoque astrictio, nisi una cū uisceris huius imbecillitate, inflammatio ipsa acciderit. Ibid.

48 Cæcidit quidam ab alto, ita ut dorsi initiū affligeretur, is tertio die exiguam admodum uocem, quarto nullam omninò emisit. Resoluta q; simul sunt crura manibus illæsis, sed
H nec

nec spirationem amisit, nec dyspnoea laborauit. Nam soli intercostaliū musculorum nerui, qui afflatum, efficiunt, affecti erant Thorax autem & Diaphragma erant integra. Vbi igitur sedata est spinæ inflammatio à septimo die uox restituta est. Huiusmodi autem noxa per consensum spinæ cum intercostalibus musculis & gutturis. 2. de locis aff.

49 Quæ in sinus iecoris partibus eueniunt inflammationes, ut magis quàm illæ, quæ in gibbo fiunt, fastidium, nauseam, uomitum, biliosum ac sitim ingentem inducunt: sic à contraria, hæ maiori quàm illæ inter spirandum dolore laborantem infestant, magis quæ tussim excitant, atque dolorē usque ad dextrum iugulum, adeo ut detrahi uideatur extendunt. 5. eius.

50 Dolores capitis in superficie quidem hærentes periranij affectionem significant, qui uerò in profundo sunt, cerebri inuolucrorum. Atque in ijs si cum grauitate sint, multitudinem humorum cum pulsu, ob ortam inflam-

inflammationem: si cum tensione ci-
tra tum grauitatem & pulsum spiri-
tus tenuis, & flatulenti repletionem.
2. de comp. secundum loca.

51 Dolores membranarum ossa
tegentium à plerisque dicti sunt ossium
penetratio, quòd æger dolorem etiã
interiorum partium sentiat, atque in
ossibus esse existimet. Id uerò accidit
plerumque ex labore. 2. de locis aff.

52 Fieri nõ potest ut inde oriatur
frigidus sudor ubi febris acuta sedet.
Alioqui enim ab illis partibus cale-
fieret, quare in partibus iam frigidis
factus propter exhaustum naturæ ca-
lorem, uel iam iam exhauriendum, &
extinguendum, nascatur necesse est.
Significat autem aut mortem esse pro-
pinquam, aut morbum fore diutur-
num, quod posterius ubi superflui
humoris copia est, sæpius euenire so-
let. in 4. Aphorif.

53 In morbis diuturnis, ægrorum
digiti ferè sunt frigidi: at in hecticis
febris calefiuntur, quòd huiusmo-
di ægrorum digitis minimum carnis

inhæreat, ex hoc cutim perspicî potest, quod in partib. solidis febris maximè contingit. Gal. in 2. Prognost.

54 Sudores tam sanorum, quàm ægrorum sunt falsi, sed hoc differunt, quòd ægri sudor humorem corruptum, unde est ortus magis sapore referat. In 2. Epid.

55 In hypochondriacis affectibus, manum imponēs parti affectæ principio doloris, ut ex his sentias primum sine phlegmone an scirrhus, an uerò flatus, an purulentia, an sterco-
ris repletio, an aliud. Tū cognito affectu solutionem aggredieris. In 2. Epid.

56 Appetitionis uis amittitur aliquando ex humoris cuiusdam mali, in ore uentriculi repletione fortassis etiam ex hepatis corrupta natura ex quo maximum ægroto desiderium mortis solet accidere. quia nihil sapiat. In 3. Epid.

57 Apostematum omnium leuissima sunt, quæ extra corpus apparēt, & secundum hæc, quæ acuta sunt, contraria

traria uerò his pessima. Ex ijs uerò quæ ad maturitatem producta uacuantur per se, ea quæ undiq; æquè cocta sunt, neq; in ambitu obduruerunt. i. in 6. Epid.

58 Spasmus ex percussione aut medicamine purgantis potu profectus, malum signum. Rursus uerò in τετανω, id est, distensione ceruicis, qd est spasmus genus, præsentanea mors. De sign. mortis.

59 Pustulæ nigræ post aures magnitudine circiter orobi natæ, & sitis simul uehementior mortis signū est. Alioqui certè si etiam crura defluerint chynnus, difficillimè curat. Ibid.

60 Quemadmodum intestina citra alicuius auxiliij spem ulcerantur ab atra bile, à flaua autem difficulter curantur, sic in profundo sitis accidit cæteris partibus, ijs præcipuè, quæ in testinis sunt nobiliores. Intestinorū enim curatio faciliior eo quod medicamina, quæ per sedem iniiciuntur, statim locis affectis occurrunt, quod in cæteris fieri neq; Gal. de atra bile.

H 3. 61 Lien

61 Lien malè affectus, uel ex inflammatione, uel scirrho, uel imbecillitate, ad nigrū conuersus colorem uitiosum in toto corpore efficit. Ibid.

62 Alui excrementum optimum (aut Hipp.) est molle atq; coniunctū quod ea hora exierit, qua sanitatis tēpore consueuerat, & cuius quantitas est pro ratione cibi assumpti, itemq; leue, & non admodum fœtidum, & subruffum. Tale quidem concoquēdi uim in inferiori uentriculo ualidā esse ostendit, aut in uentre, neq; in circumstantibus organis erratum esse.
1. de Crisib.

63 Alui excremēta, leuia quidem & cohærentia, & statis horis soluta, sed non pro quantitate cibi assumpti significat in intestino colo, aut alio quodam tenui retentam esse materiam, quod periculosum est. Ibid.

64 Incoctum alui excrementum est album, tenue, asperum, humoris expers ac ciborum retinens qualitatem. Ibid.

65 Secundum genus excrementorum

torum non ex ciborū sit dispositione
sed ex confluentibus à toto corpore
ad uentrem superfluitatibus, quod si
sit uiride, indicium bilis æruginosæ
existit perniciosum. Si autem nigrū,
uel atrę bilis, uel sanguinis eo loco p-
ulsi. Ibid.

66 Per hepatis imbecillitatem, ex
crementa alui aque in qua carnes nix
per mactatæ ablutæ fuerint, assimilā-
tur. At in peripneumoniciis maxillæ
uidentur cubeæ, &c. 1. de loc. aff.

67 Contingit plerunq; ut uel ero-
sa, uel rupta uena, sanguis tussiendo,
affatim eñciatur: at si spumoso sit a-
liquid simul eductum, efficacissimū
est, ipsum educi à pulmone indicatiū,
multoq; magis si brouchi pars quæ-
piam aut arteriæ, aut uenæ tunicæ,
aut etiam pulmonis ipsius caruncu-
læ reiñciatur: itemq; si nullus dolor in-
festat eos, qui sic afficiuntur. 3. de lo-
ci affect.

68 Efficacissima exulceratorū re-
num coniectura est, si exiguæ carun-
culæ, atq; interdum sanguis per urina-

H 4

nam

rinam excernantur, utpote quas, re-
num essentia partes, easq; ob uehe-
mentem ulceris erosionem auulsas
esse constat. 6. de loc. affect.

69 Sanguinem egerunt ac uomi-
unt sæpissime phœnicum, & uerum
aut certè uerè similè, quibus aut pes,
aut manus incisa est, itè quibus men-
ses, hæmorrhoidesq; suppressæ sunt,
ac plerunq; etiam, qui ab exercitio
consueto destiterunt. At quibus ex-
rupto in uisceribus ulcere, Ianiosum
& fæci potius similem. 1. de loci aff.

70 Si quid ueluti humidum in ex-
cremento apparuerit, ubi non fuerit
tale aliquod intra corpus sumptum
(id quod semper intelligendum est,
in excrementorum signis) partium in-
ternarum ualidum frigus, ac mortifi-
cationem ostendit. Si uerò pingue,
pinguis colliquationis, si glutino-
sum, colliquationem solidarum par-
tium portendit, quæ multo est peri-
culosior. 1. de Crisib.

71 Excrementa uehementer fœti-
da, si fœtoris causa non est ex cibus
sum-

sumptis, uehementem putrefactionem indicat, & ibidem. Excrementum striduum flatum quidem sibi cum tenui humiditate permixtum esse declarat: organa autem in unum coarcta atque in angustum restricta. Spumofum feruorem humorum, uel flatu alicuius cum humiditate colluctationem: quorum illud immoderate caliditatis corpus colliquatis, hoc uero inaequalis perturbationis effectus. Varium, uarijs corpus affectibus esse obnoxium ostendit, & ob hoc ipsum & diuturnum, & malignum existit. 1. de Crisib.

72. Morbis uentriculi symptomata eiusdem etiam commiscuntur, ut in ipsius commotione, quae ueluti conuulsio est, ei que per singultum accidit. uenter enim per singultum prae uere cibos amplectitur, conaturque deprauato illo conuulsioque motu, etiam molesta expellere. Id autem accidit ei ex imbecillitate. 3. de caus. symptom.

73. Excrementa nigra significant

H 5 aut

aut adustum humorem, aut putrefactum dominari, aut certè melancholici defluxum. in 4. Aphorif. & paulò pòst. Eadē in principio morbi, hepatis affectum pestiferum, post uim autem morbi bonum significant.

74 Appetitionis amissio principio morbi orta ex biliosorum humorum ab hepate ad uentriculū fluxione, non est mala: At ubi iam productus est morbus, facultatis exhaustæ periculosissimum est signum. In 6. Aphorif.

75 Grumos uocatos, nempe sanguis bolos non solum eos, qui in uestica, sed multò magis eos quoq; qui in intestinis, uentriculo atq; thorace nonnunquam continētur, animi defectio & color pallidus sequi solet, pulsus uerò paruus obscurus, & frequens apparet, laboransq; ipsi cum anxietate resoluitur. 6. de loc. aff.

76 A locis etiam morborum indicia sumuntur, ut soli oculi suffusione laborant, & lapis in uestica & renib. duntaxat nascitur, at ut nōnullis placet

et etiā in colo. Lumbrici in intesti-
nis &c. 1. de locis aff.

77 Qui caput ob humorem bilio-
sum dolent, ijs signa similia sunt ijs,
quæ ab ardore proficiſcuntur. Maior
tamen his morſus & faciei pallor, &
nōnunquā oris amaritudo, ætati au-
tem uigoris, temperaturis calidiori-
bus & uitæ ſollicitæ, & ijs qui flauam
bilem accumulanti præcipuè contin-
gere ſolet. 2. de comp. ſecundū loca.

78 Eis autem qui ex ardore caput
dolent cutis tactui aridior ad primū
contactum apparet, oculosq; rubros
habent, ac frigidis tum perſuſioni-
bus, tum illitionibus oblectant. Qui
autem ex frigore, ijs facies decolor,
minimeq; arefacta conſpicitur, & fri-
gidis, neq; gaudent, neq; iuuantur. I-
bidem.

79 Maximè quidem artis curandi
coniectura in affectionum cognitio-
ne conſiſtit, quæ ubi inuentæ fuerint
curationem non coniecturaliter, ſed
ſcientificè indicant. 2. de comp. ſecū-
dum loca.

Addit

Addit Moyses.

Noui equidem medicorum sententiam, ut tres dicant esse uirtutes corporis, animalem, uitalem, & naturalem. At ego hoc loco omnes uno nomine actiones corporis uoco, atque harum nobilissimam, spiritus: secundam, pulsus: tertiam sensus. quorum etiam primum pono uisum, secundum hunc auditum, tertio loco cibi & potus appetitionem, quarto sermonem, quinto memoriam ac imaginationem. Postremo motum cuiusque organi proprium. His uero cognitis, naturæ nomen æquiuocum seu omonymum esse sciendum erit, de multis enim dici diuersa ratione ex quibus præcipua illa est uirtus, quæ ab ipsa denominata naturalis appellatur. Eam uero existimare æquum est totum corpus regere, & ipsius nobilissimas actiones edere, generationem, augmentum & nutritionem, quarum uim omnium etiam seruare conatur.

Quod si parte aliqua ab alio lædatur, ei obstitit, repellitque, quantum potest,

test, uerum si infirmior ipsa succumbit, tum debilissimo membrorum ad herescit eiusque actionem coacta quidem, qua minimum potest, offendit. Si autem amplius cogatur, ad illas quoque descendit, eisque nocet, sed inuita: quo fit ut ne accusari quidem iuste possit. Ex his igitur perspicuum est, quo modo facile distingui letiferi morbi a contrariis debeant, atque indicibus colligi, quae sit ipsius naturae uis & facultas. Si enim neque inspiret, neque expiret corpus haud dubie signum est omnis obitae & defunctae illius actionis. Idemque de pulsu, de cecitate, de uentriculi deiectione, de sermonis priuatione, de mentis perturbatione, uel de omnium quadam intermissione iudicandum. Haec uero signa dicuntur quidem omnia interitus. Idcirco pro facultatis lesae ratione.

Quapropter apoplexia si sit grauis, non potest, non esse perniciofa, si leuior, at curatu quidem difficillima, ut ait Hipp. nec fieri certe aliter potest, cum in ea deficient praecipuae
natu

naturę actiones, quę sunt spiratio, recta mentis constitutio, Sermonis usus, sensus & pulsus. Certum est autem huius pestis causam, non ex unius instrumentorum simplicium affectu proficisci, sed ex uniuersę animalis corporis facultatis esse. Alioqui non ita deiecta corpora fore, cū multos phreniticos, qui ex solius cerebri melancholica affectione laborant, diutissimę superesse uideamus. Multos cęcos, surdos, claudosq; longissimam uitam uiuere, quod uidelicet unica tantum parte, non totius corporis affectione laborent. Hanc ergo definitam sententiā, id est, aphorismum notari a lectoribus, hoc nomine maximę cupio, quod continere maximam certę predictorum signorum partem uideatur. Haftenus Moyses.

80 Ego etiam aliquot symptomata ex methodo & arte comperi, quę eadem in sanis morbum & in ęgris salutem pręnūcient, quorum hoc unum est clarissimum. Somnus altior solito.

solito. Itemq; maxima cibi auuiditas
& sternutatio uehemens. Hęc enim
in sanis periculosa, & in egris saluti-
fera ut plurimū uisa sunt semper. Ga-
len.comp. 7. in Tymęum.

81 Maximum sanē existit indicatiū
pleuriud s si pulsus sit magnopere
durus, ob idq; similiter paruus & ob
ambo hęc, caloremq; creberrimum.
Pleuriticus namq; cum tali pulsu est
nullus unquā seruatus. 4. de pęcog.
expulsib.

DE CAUSIS
morborum specialium.

SECTIO VI.



Ausæ antecedentes
quæ robur faculta-
tis adaugent partim
in ipso insunt corpo-
re: ut humores semi
cocti adhuc & cru-
di, qui iam conco-
quantur, & naturæ ad indicationem
impe-

impetus, ac præterea iracundia. Partim adueniunt extrinsecus: ut uinum rebus, modicæ exercitationes, & omnia quæ intemperies corrigunt. Deprimunt uerò facultatem inedia uigiliæ, sollicitudines, mœrores, uacuationes immodicæ, uehemētes dolores, uel cum quadā proprietate accidentales, ut stomachicus affectus, qui animi deliquium inducit. Deprehendūtur autem præteritæ causæ ex præsentī constitutione, quā pulsus omnium primam indicat. i. de præcog. ex puls.

2 In febribus considerandę syncope, id est, defectus animi & exolutio, quæ duo nomina de unica re dicuntur, cuius plures sunt causæ. Si quidem non solum per uarios affectus corporis, sed etiam uehementissimis animi perturbationibus exoluti quidam fuerunt præcipueq; senes & natura imbecilli Etenim complures eorum tristati, aut lætati, aut irati animo defecerunt, & qui robustiores erant, ex immodicis uacuationibus,

bus, aut abscessu rupto & materia ad uētriculum, uel ipsius os defluxa, ex dolorum uehementia, ex neruo percusso, & musculi capite, & maligno in articulis ulcere, immoderata quadam caliditate, uel frigiditate. Inflammatio præcipua cuiusdem partis, & multis alijs idē pariuntur. 1. ad Glauconem.

3 Accidit nōnullis colliquatio ex angore & tristitia, itemq; intemperies ex nimio desiderio nimioq; amore, & summa habendi dominandiq; cupiditate. Cuius rei causa est, quòd sic affectionis nulla fiat concoctio, neq; in uentriculo, neq; in uenis assidua ista animorum contensione præpeditis. 3. in Hipp. de humorib.

4 Cur robustiora sint dextræ partes, sinistris causa, hepar in dextro latere situm, & inclinatio cordis ad sinistrum latus minor, quàm ad dextrū. Nam si paulò magis ad illud declinet fieret sinistrum robustius maxime his accedente hepatis uirtute & magnitudine cōmoda. 6. in 7. Epid.

I

5 Om.

5 Omnis doloris causa (qui solis sensibilibus partibus contingit) est aut continuitatis diuortium & solutio, aut aliqua alteratio non sensim, sed confertim & uiolenter facta. Nā quæ sensim fit motio nulla generat morbum. Ipsam autem continui solutionem necesse esse uel ruptionem quæ ex distensione, uel contusione, quæ ex grauantē aliquo, uel erosione, quæ ex mordēte prouenit qualitate. 12. Methodi.

6 Signitur omnis phlegmone, uel ob confluxū sanguinis copiosioris si quā pars postulet: quo tumore obfessa particula auctior, quā pro naturali habitu calidior, & rubicundior redditur, tenditurq; ac tangenti renititur, cū dolore ac pulsatione sensibili. 13. Methodi.

7 Superuacanea quæ expelluntur à ualentioribus partibus, ea semper in imbecilliores procumbunt. Vnde accidit ut glandulosa corpora, cū sint omnium imbecillima, facile fluxiones illas recipiant, tumoribusq; præter

præternaturam (quos bubones uocant) celerrime corripiantur: tum alias, tum uel maximè ubi propter magnam arteriam, aut uenam fuerit ulcus aliquod ortum. Ibid.

Moyſes de cauſis Syncopes.

Galenus in syncopes curatione, nec cauſas diſtinguit, nec omnes diuidit, ut Methodi ratio poſtulat, & ſicuti idem in alijs facit, febres enim per genera diſtinxit, deinde ſingularum cauſas aſſignat. At ſyncopæ cauſas neq; ſpecie diſcreuit, neq; definiuit, ſed tamen ex hac & ex illa eſſe cauſa dixit, quòd in eo authore profeſſor mirum eſt. Poſtea tamen ubi ſententiam expoſuit, quatuor eſſe eiſ cauſas colligit, quibus etiam ſi uidetur (inquit) addes intemperie membrorum Miror ſanè hoc loco cur non omnes certo numero comprehendat ut alibi paſſim ſolet, ſed ad me reuertat. Illius loci difficile eſt profeſſor ſententiam conſequi, quàm tamen quam breuiſſimè potero exponam. Oportet enim medicum uniuerſas ſyn-

I 2 copes

copes causas prospectas & memo-
 riæ infixas habere, ut cum opus erit
 conuenienter curet & possit ne fiat,
 prohibere, euentumq; symptomatis
 repentini prædicere, atque annunciare.
 Nam quemadmodum ait Me-
 non filius Zor. Qui syncopen non
 præuidit, aut præuisam non annun-
 ciatur, profectò mortui hominis ho-
 micida est. Verùm enim est illud Me-
 nonis dictum, & qui causas synco-
 pes mouit eius euētum facile uidet,
 eiq; obistere debet quātum potest.
 Quod si tam citò prohibere nequit,
 at prædicere certè potest. Propterea
 hoc loco definire & eius species di-
 stinguere uisum est, ut pronoscatur
 quid sit illa, idq; aphorismis quinque
 faciā ex Galeni libris desumptis, qui-
 bus interdum aliquid de meo addēs
 quò dilucidior sit oratio, non repre-
 hendat.

Primus igitur erit eiusmodi, Synco-
 pe præceptus est repentinusq; uirium
 lapsus. Virtus enim corporis tempe-
 rie membrorum, spirituum, & humo-
 rum

rum omnis continetur, nec quātita-
tis solum, sed etiam qualitatis modū
postulat. Deficit uerò horum intem-
perie, ex qua syncopes tria summa
genera existunt, quæ rursus singula
quantitatis, qualitatisquē ratione in
duo diuisa, sex simul species gignūt,
si membrorum duas totidemq̃ hu-
morum & spirituum.

Membrorum igitur quantitatis q̃-
dem syncope est, eum aut diuturnita-
tem longorum morborum, aut ui ue-
hementiaq̃ acutorum, aut febre ar-
dente, ipsorum essentia minuitur &
undiq̃ resoluitur. Qualitatis uerò,
cum temperamentorum quatuor, fri-
gid. hum. sic. & calid. aliquod multū
à modo & mediocritate sua recessit.

Spirituum autem quantitatis qui-
dem syncope est eorum essentia, uel
naturæ resolutio ac imminutio, à ue-
hementiori quodam motu profecta:
ueluti gaudio, ira, tristitia, dolore, ti-
more uigilijs, &c. quæ posteriora per
se eiusmodi sunt, ut uehementer spi-
ritus conficiant, uel ab instrumento-

rum spiritualium dissolutione ac porosa laxatione, uel ab alimentorum inopia, uel denique à nimio grauioribus defluxu, quæ duo etiam ad membra & humores, sed Galenus tamen propriè spiritibus attribuit. Qualitatis uerò, cum immutantur aut ueneno corrupti, aut morfu tactuue uenenati animalis labefactati. Eadem certè in humoribus quoque est ratio.

Syncope enim eorum quantitatis è cum uel deficiunt, uel non suppeditato cibo arescunt extinguunturque uenà cum calori naturali, aut certè nimia sui copia ipsum suffocant & obruunt calorem. Qualitatis uerò, cum à temperamento & mediocritate sua recedunt, ut cum crassiores fiunt & acriores.

Ex his ergo constat genera synopes esse sex, species uerò una & uiginti. Primi enim generis quod in membrorum quantitate situm est, tres sunt morbus chronicus, seu diuturnus, morbus acutus, & febris ardens. Secundi quod in eorundem qualitate

con.

cōstituimus, quatuor calefactio, desiccatio & eorum contraria. Tertiū quod fuit in spirituū quantitate tres, corruptio, ueneni sumptio & morsus, aut contagio uenenata. Quarti in eorūdem qualitate positi septem, instrumentorum spiritualium dissolutio, eorundem porosa laxatio, motus spirituales, dolor, uigilia, inedia & uacuatio immodica. Quinti duæ: copia humorum & eorundem inanitio. Sexti deniq; itidem duæ, humorum deprauata substantia in aciores & mordentiores, aut in crassiores lentiores, mutata. Idem Moyse.

Si uitare (inquit) syncopen uoles, in quolibet morbo, uidendum est, ut cerebrum cor & hepar, tres præcipuas corporis partes, itemq; uentriculos propter eius cum illis consensum, ab omni offensione prohibeas, nec id solum, sed etiam quantum potest, auxilietur. Id uerò facies medicamentis ipsorum naturæ, quam maximè poterit fieri, simillimis cōquisitis atq; adhibitis, animali quidem parti, quæ

est cerebrum aromaticis & suauissimis ac flagrantissimis odoribus. Spirituali, quæ est cor, aëris iucunda & tranquilla ac serena leuitate. Naturali uerò, quæ est hepar meatuum reclusionem, purgationemque squallidarum partium, & medicamento: item abstergente & cordis sanguinem attenuante, cibisque optimum sanguinem facientibus & similibus. Ad uentriculum uerò adiuumenta concoctionis admovebis, quò aptè & maturè fiat. Atque hæc si sic obseruaueris, nunquam fieri poterit ut in syncopem incidas.

8 Inanitionis corporis & lienis indurationis hæ causæ sunt, quòd hepatis imbecillitate concoctio in uenis non potest compleri, ex quo nulla ad cætera mēbra proferri possunt alimenta. Destituuntur igitur & inanitione attenuantur. Splen uerò, quia fecem sanguinis ex hepate ad sui alimoniam trahere, est natus imbecillo hepate fortius trahit, & ita indurationem incurrit. in 2. Hipp. de uentis.

9 Melancholicis corporibus, id est frigidi-

frigidis & siccis inimicissima est Venus. Gignit enim in hypochondrijs, flatulantes, humores crassos, à quibus inflatum corpus uehementer affligitur. 3. in 6. Epid.

10 Attenuantur corpore quando facultas alteratrix infima est, aut uenæ & arteriæ corrupto sanguine replentur. Augentur uerò contrarijs id est, ualida uirtute alterandi, & uenis omni corrupto sanguine uacuis exstentibus. 3. in 7. Epid.

11 Dolores ex humoribus fiunt sex illis modis, plenitudine, crassitie, uiscositate, calore, frigore & mordacitate. in 1. Hipp. de humorib.

12 Ex humoribus mutantur qualitates, & uicissim ex qualitatibus humores, ut in bile cernitur. Vbi enim bilis est calidior gignitur iracundia, & ex iracundia rursus biliosi humores. 3. de humorib.

13 Prurigo seu ulcerosus affectus ex succis mordacibus & acriter pungentibus gignitur in partibus carnis exterioribus. Estq; motus propè si-

I 5

milis

milis titillationi alarū, uel pedis plantarum. 3. de ratione uictus.

Addit Moyses.

Mordaces tenuesq; succi per carnem & cæteras partes sensibiles effusi unum ex quatuor illis, quæ Galenus recensuit lib. de Plenitudine gignunt, id est, pruritus, ulcerosus sensus, horrorem aut rigorem. Nos huius Aphorismi etiā suprā meminim⁹ in significationibus morborum. Hic autem, de quo agitur tum opinio efficitur, cum humor mordax non est tenuis, nec pars omninò sensibilis, sed crassiusculus & in partem nō primò sentientem cadit, ut hoc tantū ab ulceroso illo differat. In summa, is est rigor quo partes uehementer quatuntur de quo & similibus affectibus idem Gal. lib. de Symptomatum causis, sic ait. Vt prædictorum symptomatum causas accuratiùs exponam, exigua quidem est tenuis, salsa & immota in Pruritu. Exigua tenuis erodens, immotaq; in lassitudine ulcerosa multa, salsa, crassa & immota in lepra

prapforac̃. Pauca tenuis mordax ac breuem motum possidens in horrore. Vehemētem autem & mordaciorē in rigore, & 2. de locis aff. ulcero sum dolorem seu pungentem nō ad cutem solū, sed imas quoq; partes, ut ossa extendi.

14 Rigor nō solum ex atra aut flauabile (ut in tertianis & quartanis) sed ex pituita ultra modum frigida, quā uitream appellauit Praxagoras, fieri cōsueuit, idq; in mulieribus magis, & qui in ocio uitam agunt, qui rigor tamen uehemens non est, & quiescentibus: nulloq; modo motis corporibus ipse etiam conquiescit. Huiusmodi affectui attenuantia adhibeo, Principio quidem medicamē diatrion pipereō propinato, subinde uerō nostro ex calamintha, deinde & ex succo cyrenaico composito, quod quartanę exacerbationibus maximē confert. Gal. de Rigore.

15 Sanguis niger crassus & multus, tribus præcipuē de causis fieri solet, quæ nōnunquam coeunt, sæpius uerō

uerò solæ accidunt. Prima est hepatis affectio, huiusmodi gignendo apparatus: altera ciborum crassi succi usus, id est, esus & potus. Tertia uerò splenis imbecillitas qua ex hepate uitiore succum ad se trahere non potest, effunditque sinit per omnes reliquas corporis partes. 2. ad Glauconem.

16 Humores uitiosi credendi uim habentes, aut medicamenta abstergentia, plus æquo ualentia, si carni accidunt ulcera, seu uulnera gignunt. Sin autem ossi fracturas & cariem. Galen. de causis morb.

17 Nonnullos uidimus ob frigidiora alimenta morbo attonito, aut epileptico correptos, aut alio quodam refrigeratos, id quod ex ebrietate, uel maxime accidere solet. Quanquam cum modice haustum, cum familiare alimentum sit, mire calorem auget. In uniuersum autem omnes cibi optimi, qui animali plurimum nutrimenti adferunt, si supra modum sumantur frigidos morbos generant, sicuti & cæ-

& cætera, quæ natura sunt refrigera-
toria, cùm similiter ingeruntur. Ibid.

18 Omne delirium deprauatum
est principis facultatis motus à pra-
uis succis, aut cerebri intemperie p-
fectus, qui Phrenitis dicitur si febris
adsit, si absq; febre, mania. Solæ autē
melancholicæ alienationes à frigidi-
ori succo produci solent. Nam Phre-
nitis non simpliciter ob calidos suc-
cos accidit, sed tum solum, cùm phle-
gmonem, uel in cerebro, uel ipsius
membranis producant: & quæ deli-
ria in acutissimarum febrium uigore
oriuntur, mordacem calidumq; ua-
porem habent cerebrum occupan-
tem. Gal. 2. de sympt. causis.

19 In omnibus autem animi alie-
nationibus, si timor atq; tristitia diu
perseuerent, atram bilem in causa es-
se indicium est. Quòd uerò rationali
animæ timorem inducat, nil mirum
est; cùm sit ipsa tenebris simillimus
humor, quibus in exterius rebus, nil
nos magis perterrefacit. Quod in fla-
tulentio illo morbo, quem hypochon-
dria-

driacum uocant, uidere etiam indies licet. Ibid.

20 Differunt dolores, rei quæ ipsum efficit, aut multitudine, aut crassitudine, aut potentia, siue sit humor siue spiritus flatulētus. Paucus enim plurimò, tenuis crasso, permanēs motos & quod minùs refrigerat, eò qui uehementissimam refrigerandi uim habet, minorem excitat dolorem. 2. de locis affect.

21 Inter dolorū differentias, punctorius dolor potissimum circa membranas consistit. Membranarum autem dolores in latitudinem protenduntur, uidēturq; esse æquales quòd illarum corpus existit æquale. Semper tamen ubi intenta particula sensu acutiori est prædita, ibi uehementior infestat dolor, & paulò post. Quod autem membranam, quæ ossibus adiacent, dolores profundi sint, & ueluti dolentium ossium quandā imaginem referant, non mirandum est. Ibid.

22 Vbi ingens in hepate inflammatio

inatio oritur, aut ubi ipsum est induratum dolor, qui tunc iugulum in dextra parte infestat, cauæ uenæ magis quàm membranarum tensionem sequitur. Ibid.

23 Crassi humores, qui in cerebri substantia abundant, interdum ei uelut instrumentali nocent, s. cum meatus obstruuntur, interdum uerò ut simili, uidelicet cum alteratur temperamentum in quo est mens, uel anima. Proinde ab Hipp. dictum. Melancholici plurimum comitiali morbo, & contra epileptici, plurimùm melancholici afficiuntur. Atque horum utrumlibet magis accidit, prout in hanc uel illam partem infirmitas cepit. Si enim in corpus ipsum, id est, si meatus obstruuntur epileptici. Si uerò in mentem temperamentum melancholici. Cum autem nō solum ab atra bile, sed à pituita etiam morbus comitialis oriatur, sciendum est solū eum qui ab atra bile ducit originem, in melancholiam transire posse. 3. de locis affectis, cum uidelicet crassi-

or co4

or copiosiorquē euaserit.

24 Durities accidit arteriarum tun-
nicis, aut congelationem, aut ob ten-
sionem, aut siccitatem congelationē
uehementes algores efficiunt: tensio-
nem inflammationes & duri tumo-
res, itemq; neruorum dispositio in-
flammationibus correspondens. Sic-
citatem uerò euacuationes diutur-
næ, & longi temporis fauces, & diu-
turnæ febres ardētis. In uniuersumq;
omnes affectiones solidas particu-
las uehementer exiccantes ut hec-
ticæ febres, &c. i. de dominis februm.

25 Qualis est in uentriculo expul-
tricis facultatis per uomitum actio,
talis est per tusses in pectore & pul-
mone, ad quas referuntur etiam ster-
nutamenta, quæ humores, qui in ar-
teria contumaciter hærent, & qui dif-
ficulter expectorantur magis quàm
tusses euellunt, utpote ualidiore spi-
ritus impetum habentia, quæ non so-
lū ob ea, quæ asperis arteriis, sed quæ
naribus molesta sunt, & præoribus
uentriculis cerebri sortiuntur. Maxi-

mum

num autem præsidium adferunt capiti repleto uaporibus, nisi ob destillationem accidant. 2. de symptom. causis.

26 Quod neruus quidem ad radicem dentis substratus aliquando doleat, imponat autem nobis ut credamus ipsum dentem dolore, rationi consentaneum est. Dente enim exempto remanet adhuc exigua portio doloris, qui ob nerui inflammationem contingit. Grauior siquidem erat antequam uicinitatem duri dentis à quo tendebantur. Eo uero amoto liberius nunc perspirat & est leuior. 5. de cōp. med. secundum loca.

27 Forantur dentes ab humorum acrimia & erodentium influxu, sicut & cutis exuberatur, sed ossa rarius, & ægrius ob duritiem, quam cutis ipsa patiuntur.

Liuidi autem redduntur uitiosi fori etiam influxu, unde similem curationem recipiunt. Vtrisque enim resiccatio uitiati humoris influentis medetur. Qui si paucus fuerit per localia

K

exie-

exiccātiaq; auxiliā absumetur, si mul-
tus, uniuersū capitis procuratio habē-
da est. Exiccantia autem mediocriter
intelligo non ut quidam uehemēter,
qui uitīs siccatione curandis, non ni-
si uehemētissima quæq; adhiberi uo-
lunt. Ibid.

28 Neruosis partibus inflamma-
tis prōptius, quā reliquis delirium
superuenire solet, idēq; ascendente ad
caput per continuas partes solo calo-
re, interdum spīritu uaporoso, uel fu-
moso, uel fuliginoso. 3. de locis aff.

29 Tremor imbecillitate faculta-
tis, quæ uehit atq; mouet corpus affi-
citur. Etenim animalium partes gra-
ues cum sint, deorsum quæ ferri natæ,
ex se moueri nequeunt, sed facultas
primū musculis per neruos delata,
quasi uehiculum atq; ala, motus ipsa-
rum est, quæ facultas si deficit omni-
nō partes omni motu priuatæ, instar
aut expilatæ ex aëre, concidunt. Sin
exigua & debilis tamen fluat, ut cor-
poris pondus uehere & librare, pro
magnitudine nequeat, partē sic affe-
ctam

Etiam cum tremore dehiscere est ne-
cesse. Siquidem motus coacti uiolen-
tiꝝ qui vires debiliū superant, fiūt
sanē tremuli ut constat in onera ge-
stantibus, & in timore correptis. Ti-
mor quippe facultatis robur nihilo-
minus (quā onus imminuitur po-
test) & in senibus, qui imbecillitatis
causa tremuli uadūt, & in quibus ob
ægritudinem lōgiorem, robur facul-
tatis minutum est. Galen. de tremore
palp. &c.

3. Spasmus seu neruorum cōuul-
sio ob inanitionem, uel plenitudinē
fieri solet, teste Hipp. Ex inanitione
& ariditate quidem si conuulsio sit,
uel à labore, uel à uigilijs, uel fame,
uel solitudine, uel arida æstuantīꝝ
febre, qualem est uidere in phreniti-
cis. Ex plenitudine uerò si tumulen-
to cuiuspiam & omninò pleno accidat.
Sic enim epilepsia est conuulsio non
ex ariditate, sed repletionē crassi hu-
moris uiscidiꝝ spiritus, meatum in
cerebri uentriculis obstruentis, ner-
uorum principio sese quatiente, quō

K 2 expel-

expellat à se id quod infestat. Nec perpetua ea est (ut in opisthotono, uel emprosthotono, uel tetauo contingit, id est, conuulsione partium anteriorum, uel posteriorum, uel utrumque) sed temporis interuallo accidit.

3 1 Tremorem efficit etiam humorum copia solidis pertibus conclusorum, qui cum exire nitantur nec liber sit exitus ob massam corporum solidiorum, concutiunt ipsa ui, firque motus tremulus. Huius autem curatio ut ipsa causa, est simplex, nempe castoreum potum, uel superpositum. Calfacit enim hoc & desiccat precipue hanc ægritudinem, ex his uero constat frigidam esse tremoris causam. Galen de rig. trem. palp.

3 2 Non solum mordax causa, sed ea uehementer mota requiritur, si rigor fieri debeat, atque hoc tam calidæ, quam frigidæ causæ est, commune quod utraq; corpus cum dolore commoueant. Idcirco per tertianas quartanasque febres, quamuis à contrariis ori-

rian-

riantur humoribus, rigor tamē inuadit. Etenim ut atra bilis est frigida, sic flaua calida existit. Mouentur autem hī, qui aut cruditate, aut malis succis repleti sunt, aut in sole æstiuo, uel balneo diu morati sunt, aut deniq; qui seipsos exercuerint. Ibid.

33 In rigore flaua bilis non per uasa, sed per carnosas partes mouetur, in horrore uerò cutis tantum afficit, atq; hic idem motus est in cute, qui rigor in uniuerso corpore. Ibid. & 2. de febre. Sicut horror est minor & remissior rigore, ita rigor inualidior & frigore.

34 Tres sunt præcipuæ causæ cur in anguia, laborans inter spirandū, totum thoracem moueat ad iugulū ceruicem, & scapulas usq;. Vna est flā mea in pulmone & corde caliditas. Secunda in altero spiritalium instrumentorum, scilicet cord. & pulm. angustia. Tertia facultatis musculos mouentis imbecillitas. Quæ si simul omnes in ægro concurrant, moritur, uel certè difficillimē curatur, sin uni-

K 3

ca ui-

ca uitiata sit actio neruum solum, uel musculum læsum, idem pati contingit: idcirco peculiari opus est finitione, ut sciatur, seruabitur'ue æger, an morbo succumbet. 4. de locis affect.

35 Tussis diuturna nonnunquam ulcere in testiculis orto curata est. propter utriusque generis partium pectoris & procreationis consensum. In 2. Epid.

36 Bifariam accidere potest, ut uehementer tussiendo pauca quis expuat, nempe aut ob lentum crassum'ue humorem, aut ob impensè tenuem. Siquidem tenuis humor cū subleuatus est, inter tussendum à spiritu diuisus refluit: Lentus uerò aut omnino crassus difficulter effertur, utpote qui non tam facile à corporib. quibus impactus est abstergi, neque à quouis spiritu nisi à uehementi, & multo potest impelli. 4. de locis aff.

37 Qui uocem attollere cupit eū latissimè os aperire conuenit, ut amplior ingrediatur spiritus. Deinde & guttur ut altissima uox possit emit-
ti. Qui

ti. Qui igitur latissime aperire possunt, magna utuntur, qui uero minus, minori, quæ causa est uocis in mulieribus, pueris & eunuchis, acutioris. Gal. in Hipp. de somno & uigilia.

38 Vox impeditur, uitiaturque ferè ex humorum, crassorum, lentorumque copia pulmonis meatibus inherentium. 4. in 5. Epid.

39 Afficitur uentriculi uniuersa rapacitas similibus affectionibus. quibus & os illius, cæterum non perinde uehementibus. At quia cōcoctio- nis opus perficitur in partibus ori subditis, necessum est eas ipsas partes cum male dispositæ fuerint, cruditatis causam existere. Quippe ad propriam eius rationem pertinet tum fastidire, tum natantes cibos corrumpere. 5. de locis affect.

40 Hypochondriaci flatuosi que morbi causa est calor immoderatus uenarum mesaraicarum, earumque obstructio à crasso sanguine orta, ut ait Dio- cles. Videtur autem in ipso uentriculo per huiusmodi affectus inflamma-

tio quædam consistere, sanguis autem in parte inflammata, contentus, & crassior esse, & atræ bili similior. quo exhalante ad cerebrum melancholica fiunt circa mentem symptomata. 3. de locis affect.

41 Pleuriticorum nonnulli iugulum dolent porrecta in hunc locum succingente costas membrana. Aliquando ad præcordia defendit dolor, præcepto ipsius sensu in septo transuerso utpote cui soli (cum radice doloris in latere consistente laborantes musculis, qui ibi sint, respirare non ausint) omne respirationis munus natura committit. Cum igitur in interioribus partibus lateris inflammatio oritur, septum transuersum imperius intentum dolet, cum uero in superius, tunc iugulum potius. 2. de locis aff.

42 Si ob frigoris uehementem intemperiem cibus omnino crudus permanserit ita affecti, nec sitiunt, nec febrium, sed ciborum qualitatem percipiunt, siue ad ructum, siue ad uomitum prouocentur. Si uero calidiore intem

intemperie fuerit ut suapte natura flatum excitare possint uapore spiritusque uentriculum replent. 3. de symptom. causis.

43 In retentrice potētia triplex omnino reperitur symptoma, nam aut nihil complectitur, uel retinet omnino, aut debiliter, aut deprauatē. Cū nihil, uel debiliter tum inflationes, & fluctuationes fiunt contra fit ubi cōplectitur. Ibid.

44 Quibus hepar imbecille est colore sunt sub pallido ob nimiam ipsius sanguinis copiam effusam. At quibus sple ipse est debilis, sunt potius sub fusco, nimirum id causante melancholico sanguine cum bono per corpus diffuso. in 2. Epid.

45 Qui dyspnoico morbo affecti sūt, inexplibili siti uexantur, cuius causa est uentriculus, aut calida, aut sicca, aut utraq; intemperie laborans, maximē uerō os ipsius, proximē uentriculo hepar, sed maximē pars eius sima, simul inflāmatis mēstricis uenis, & ieiuno, & uentriculo atq; cum

K 5

gula

gula pulmone, quarum partium incensum marcor ut plurimum committatur. 6. de locis aff.

46 Somnus humectat, uigiliæ exiccant. Ille uerò ex se, etsi neq̃ calfaciat, neq̃ refrigeret, tñ si calfactio prius ex frigidis humoribus corpori recidat, refrigerat, calorem tum febrilem illum, tum naturalem humectās. Sin biliosi illi sint humores, tum eos uisua profundit, suggillat ac minuit, unde etiam refrigerari corpus contingit. 4. in 6. Epid.

47 Primæ morborum causæ cum in corpora excrementis uacua incidunt, neq̃ hominem torquent, neq̃ diu persistunt, sed si in excrementosa, & uitiosis suctis plena cadant, non aliter sæuiunt, quàm flamma in siccissimis ligna, oleoq̃ perfusa, aut quàm lychnus in sulphur uidetur. 6. in 6. Epid.

48 Pruritus fit ex humoribus acris, amaris, salis, erodentibus ac uasa foecantibus. Ibid.

49 Non mirum esse debet, si imbecilles

cilles fiant, qui nimia uenere utantur. Siquidem eorum uacuantur spiritus & humores ex titillatione, & uoluptate, quæ ut maxima est, ita spiritus plurimum exhaurit ac extinguit. Id uerò uidere est in compluribus, qui in eo actu nimia delectatione capti subito intereant Gal. de semine.

50 Expulsionis excrementorum impeditæ triplices causæ inueniuntur. Vna cum partes, quæ excrementa purgant sunt imbecillæ: altera uiarum angustia. Tertia excrementi malitia, imbecillitatum intemperies parit, angustiam obturatio, uel aliquis instrumentorum tumor: Tumor humorum affluxus: obturatione crassitudo & lentor humorum ac multitudo, quæ est eorundem malitia. 3. de sympt. causis.

51 Tunc immedicè mouet expellendi uis, ubi retentrix potentia grauat, uel ob excrementorum multitudinem, uel acrimoniam, uel ob propriam imbecillitatem. Tunc siquidē necesse est, ut cum eo quod redundat,

dat, simul etiam id quod utile est excrematur, ut in Lienteria, Dysenteria & cholera fieri contingit. Ibid.

52 Quæ uomitu excernuntur, eo excernuntur quia mole sua & quantitate uentriculum grauant, ut cum plurimum cibi est ingestum, interdum quod sua mordacitate contristent, ut si nutrimentum assumptum, uel acidum, uel nidorosum, uel amarum, uel acre ob uitium concoctionis euaserit. quod genere continentur etiam biliosa, & pituitosa, & serosa excrementa, uel inibi nata, uel ex uniuerso corpore eo confluxa. Ibid.

53 Refrigeratio exteriorum partium uentrem constringere, quemadmodum contra interiorum soluere & laxare easdem solet, ex quo plurimum fit hernia. 5. in 6. Epid.

54 Intestino colo repleto accidit simul uentriculum, & pungi & dolore, quod illud ex repletionem contentum, peritoneum quoque quod utrumque instrumentum complectitur & ambit, dolore pressum angat, & simul muscu-

musculum utriq; subtēsum, à quo potissimum illi dolor tensius accidit. in lib. de clysmis.

55 Qui renum morbo laborāt, sæpe pedum quoq; & dolorem, & stuporem sentiunt, propter partium consensum, quæ uenis duabus spīne dorsī innitentibus coniunguntur. Vena caua & magna arteria. i. in 6. Epid.

56 Exasperantur læuia, & læuigantur aspera (nam hæc ad formam uitiatam pertinent) Illa quidem ob acres humores, aut medicamina abstergētia, hæc uerò ob pinguitudinem succi uiscositatem uē. Cæterorum formæ uitiorum causę sunt, in utero quidem aut maxima materiæ colluies, aut qualitas incommoda ex impedito seminis motu. Extra uterum uerò, dum infans ab obstetricibus non rectē excipitur (facilē enim peruertuntur cum adhuc sint fluxiles & molles) aut ruditer inuoluuntur fasciis, aut lac tabefactum sugunt, aut inepata uictus ratione, aut intempestiuis exercitijs exercentur. Postquā adoleuerunt

leuerunt etiam deformantur saepe ob immodicam repletionem ut in elephantiasi, aut alimenti inopiam ut in tabe cernitur, aut ob resolutionē neruorum distensionem, inflammationem, scirrhum. Cavitatesq; in ijs pereunt ob constipationem, aut obstructionem, aut contractionem, aut in sese concidentiam, quæ ab immoderato motu retentricis facultatis rursus efficiuntur. Gal. de morb. causis.

57 Si humor albugineus seipso crassior sit redditus exactam cernendi aciem, multo obtusiores reddit. Quod si plurimum aucta sit crassitudo, uisum omnino prohibebit. At si non tantum foramen à contento ibi crasso corpore obtenebretur, sed relinquatur eius aliqua particula pura, uidereres externas nihilominus, q̃ anteà licebit, sed singulas per se solas. Item si in pupillæ centro exigua consistat suffusio, maneatq; partes, quæ in circuitu sunt puræ, quicquid sic affectionis cernitur, id ueluti fenestratum & perforatum uidetur. Vbi uero

rd humor inter crystalloeidē, & rha-
goeidem medius proprium colorē
mutārit, siquidem ad fuscum decli-
net, arbitrabitur quis se per nebulam
uel ox fumum etiam tueri. Sin alio
quouis colore inficiatur, huius quo-
que imaginem ea, quę spectantur, re-
ferant. Præterea si uapores à uentri-
culo sursum ferantur, acutissima e-
tiam uisus symptomata suffusioni si-
milīa infestabunt. Sic spiritus ani-
malis copīa, aut inopīa uisum acutū,
aut debilem facit. 1. de sympt. causis.

58 Deprauata saporum dignotio,
ubi lingua alieno quopiam humore
fuerit imbuta euenire consueuit. Nā
quemadmodum per suffusiones, ui-
soria illa facultas foris uidetur cerne-
re, quę in oculo apparent: ita & gu-
standi uis internam linguę affectio-
nem rebus sensibilibus tribuit: quem-
admodum etiam aures ubi sonū per-
cipiunt nulla re extrinsecus obstre-
pente, sed ipsa circa membranas mo-
tione, phantasmata transmittente. I-
bidem.

59 Cur

59 Cur titillatione alarum, uel uolæ manum, uel plantæ pedum aut aspectu, uel auditu rerum ridiculorū ac facetarū moueatur homini risus, nulla reddi ratio certa potest. in lib. de Motibus necessarijs.

Addit Moyses.

Verū illud Galeni est. Siquidem risus homini speciei est proprium ac priorum cuiuslibet speciei nulla certa ratio potest inueniri. Non igitur de ijs rebus magnopere esse solliciti debuerimus.

60 Animal à planta non differt nisi gradibus quinque nature, qui sunt sensus. Tact. uis. aud. Olf. & Gustus. De uisu autem, an in talpa perfectus sit necne cum formam habeat adhuc incertum est. 3. de semine.

61 Mirandum non est si ob oris uentriculi affectus animalia maximis, ijsdemq; uehementissimis affectibus affligantur: cum nimirum pars illa per neruos quidem cerebro, per arterias cordi sibi uicino suas offensiones communicet. Vnde & Cardilagiae

algia, quæ osculum uentriculi infe-
stat, à mordacibus ibi succis orta. 1.
de sympt. causis.

DE CURANDIS MOR-
bis communi ratione.

Sectio VII.

1.



Corpora à malis humori-
bus tenuibusq; affecta,
multo cibo nutrienda
sunt, contraria uerò con-
trarijs sunt curanda. Si-
militer imbecilla, si sint nutriēda, nec
modus certus sciri possit conueni-
ens, tutius est pauciore, quàm mul-
to nutrire. Addere enim tutò licet si
deest, minuere sine periculo non li-
cet, si abundat. In 2. de morb. acut.

2 Concoctionem ac digestionem
humorum adiuuant præcipuè, quæ
mediocriter califacere possunt: cuius-
modi nonnulla ciborum sunt gene-
ra, nonnulla etiam potionum, empla-
storum, catapotiorum, frictionū, bal-
neorum, &c. 2. in 1. Epid.

L

3 Hu

3 Humoris crudi duo sunt genera, unus serosior tenuiorque cernitur alter crassior ac viscosior. Illum uacuum are antequam calore calefiat febris, conuenit, & ante quam acrior erosiorque euadat. Hunc uero ante quam liquefcat. in 1. de humorib.

4 Tria sunt tempora ægritudinis: Principium, augmentum & finis, quibus si tres morbos patiat æger, & ultimò moriatur, causa in eo solo & non in præoribus quærenda uenit. Gal. de temporib. morb. ubi habet.

Vno enim eodemque tempore duobus tribusue morbis homo infestari potest, quorum alius iam inclinaret, alius principij tempus adhuc, uel augmenti præmordia occupet, tertius plurimum auctus sit. Deinde moritur homo non propter inclinantem, uel nunc incipientem, sed ob uehementer auctum.

5 Principio curationis tria facultatum corpus nostrum regentium principia summè considerabis, quo nam statu sint prædita, dico autem cerebrum

brum, cor, & hepar. Deinde alias particulas ex principijs ortas, nervos, uenas, arterias. Sic enim siue unus siue plures sint morbi, inuenies. Ibid.

6 Cuiuslibet morbi propria tempora ad præsidiolorum inuentionem sunt, necessaria inspicienda. Etenim circa initium & fines omnia leuiora sunt, & imbecilliora, in uigore fortiora, quæ intercedunt medio consistunt ordine. Sic in uigore mitigantibus, utendū in principio & fine uehementioribus, & morbo omninò contrarijs. Ibid.

7 Omnis in curando scopus sit, ut uirtutē iam ex longa agitatione morbi infirmatam, non magis minimas, aut lædas, quod in uictus ratione precipuè consistit. Quanquam illud quidem difficile & simul utrunq; seruare, ut morbo obsistas, ut uim conseruas. Est enim morbo coquendo idonea sic uictus ratio, uirtuti quoq; infirmandæ aptior erit, unde plus periculi, quam utilitatis accidit. Sin uirtuti iuuandę accommodabitur aliud periculu

L 2 culum

culum adfert morbi producēdi. Sed ubi hæc ita fuerint, obseruanda primum, quæ maximè sint necessaria. ad Glaucl.

8 Generosi medici est munus futurum statum præcognoscere, & omnem uictus rationem ad ipsum instituire: quem si tamen nondum præderit, initio morbi non uerebitur uictum præscribere, cum nisi sustentauerit ægrum, in maximum eum adducturus sit periculum. .i. de Crisib.

9 Aegritudo ex humorum putredorum corruptione, simul & uirium imbecillitate, uix unquam aut certè difficillimè & longo tempore curari potest. Prudens tamen medicus si accedat, non statim adhibitis medicamentis uacuabit, sed uirtutē ægri refocillabit paulatim dū uigescat, ita. n. non nocet euacuatio aut certè minimè. Tū uacuatione factam commodè ac curationem accedet. .ii. Methodi.

10 Cū ars ipsa medica tota sit magna, non leuissima eius pars est scientia ordinandi uictus, quæ utique ex his

is maximè remedijs constituitur, ci-
o, potione, sorbitione, perfusione,
ataplasmatis & clysterib. ibid.

11 Cauendum medico est im-
p-
nis ne humores crassos ac uiscosos
medicamentis liquefacientibus de-
inuat aut resoluat. Nam ex huiusmo-
li liquefactis humoribus oriuntur
vapores, quidam fumosi, qui postea
uix possint resolui, nec discuti: Ac si
unicas intestinorum utraq; subeant
magis etiam sunt permitiosi. Propte-
rea his medicamentis discutientibus
& attenuantibus mediocriterq; cali-
dis curari oportet sanguine prius e-
misso, & uentre soluto aut uomitu,
aut balneis, aut frictionibus, aut in-
unctionibus calidis abstergentibus,
aut cibi deniq; abstinentia euacuato
corpore, ita ut res maximè quidq; ho-
rum postulat. ultimo Methodi.

12 Vbi putridus humor corrupti-
one sauire coepit, antequam uires defi-
ciant, aut incalescentis calor ad par-
tes solidas præcipuasq; deuenierit, e-
uacuatione occurrendū erit. in 1. A-
phorif. L 3 13 Cor-

13 Corpora enim ualentia quamlibet subito perperatam uacuationē sustinere possunt. Imbecillium uerò, habenda est uirtutis ratio, ut si adhuc ferant uires, purgentur leuiter ac moderate. Sin iam defecerint, cohibeatur statim, uacuatio etiam si superflui superfuerit aliquid. Ibid.

14 Morborum concoctio est humorum corruptorum ad integrorū naturam mutatio, quæ à solidis partibus si sint integræ efficit, si uerò sint lasæ, in dubio æger est donec illis uires restituantur. 2. in 1. Epid.

15 Humores in profundo herentes, elicere extra oportet, & qui in posterioribus sunt ad anteriores reuellere, qui uerò ad dextrum procumbunt ad sinistrum, sicq; generaliter in contrarias partes reuulsionem utendum. in 1. de humorib.

16 Humores purgari tēpore paroxysmi per superiora conuenit, uomitu, aut narium effluxu conuenit. Extra paroxysmum uerò dum quietus est æger per inferiora, lotio egestionem, &c. Ibid.

17 Qui

17 Quid diuturnis morbis laborāt,
ueluti podagra, asthmate, epilepsia,
tumoribus lienis, & hepatis, &c. op-
tima illis uictus, id est, attenuans ra-
tio pro optimo est remedio. Multos
enim hac ratione & sola sanatos uidi-
mus. Ea autem cōsistunt omninō in
ciborum boni succi usu, uenæq; se-
ctione pro consuetudine repetita, ac
cōtrariorum abstinētia peponum,
cucurbitarum & huiusmodi uitiosi
succī ciborum. Gal. de atten. uict. ra-
tione.

18 Ego multos ægros post explo-
ratas eorum uires, diuturna cibi ab-
stinētia curauī solis medicamentis
concessis. Quosdam etiam ne ualidi
quidem roboris & syncope detētos
prohibitis cibis, fīctionē sola manu-
um, pedum, uertebRARUM: alijs uerō
prohibita abstinētia, datisq; cibis
succurri. in lib. de examinatione me-
dici.

19 Consuetudinem sanitate con-
ducere, in ario peripatetico uisum est
cūm is natura gracilis & os uentricu-

L 4 li frigida

li frigidissimū natura sortitus, ita ut
 uel ex leuissima refrigeratione sin-
 gultu statim corripetur, ob idq̄ nū-
 quam antē ausus fuisset aquam gu-
 stance, tandem febris occupatus, à Me-
 dicisq̄ præter consuetudinem co-
 actus potu frigidaē uti, subito fuit qui-
 dem exanimatus. Alijs uerò nisi au-
 daçter potus is, contra propine-
 tur, in periculum ueniunt, ne subi-
 to extinguantur. Sunt enim quibus-
 dam aliqua peculiaria ex natura, quæ
 aliud alimentum corpori accommo-
 datum habēt. Gal. de consuetud.

20 Minimè à paruis incipiendum
 est auxilijs ubi maximum impendet
 periculum, ut in peripneumonicis, at
 in leuioribus, licet quidem experiri
 remedia. 5. Methodi.

21 Conualescērium uictus ratio,
 media inter ea constitui debet, quæ
 sanorum propria est, & quæ ægrorū.
 Domus temperata cibi proximi ijs
 quibus insueuit. Sciendum autem ui-
 giliis uniuersum corporis habitum
 uehemēter siccare, ac proinde ijs qui
 ex

ex siccitate laborant. quod etiam reliquis est commune. 7. Methodi.

22 Modus aquæ frigide, quam sine periculo possit, qui febricitat, bibere cum maxime sitit, is esto quantum uno haustu possit capere. Sciendum autem uniuersas res frigidas cōcoctionem impedire. 1. de morb. acutis.

23 Alica facultate sua duplici, humectandi uidelicet, & abstergēdi spiritualia instrumenta purgat & uires roborat corporis, quæ facultates in nullo alio similiter reperiuntur. Propterea si æger hanc respuat, nil ei cōmodius dari potest, quàm saxatiles pisces ex aqua, anethe, oleo, sale & porri modico mediocriter temperati & cocti. Quod si non reperiant huiusmodi semper hīs proximi dabunt. Idcūq; antè cibum ex syrupis quibusdā acrioribus si modo corpora neruosa non sint læsa. Ibid.

24 Oxymeli quod ad meatuū absterisionem præparationemq; propriatur. Duabus antè horis quàm alica

L 5 præbeatur

præbeatur sumi oportet. Nam si simul sumantur, ex eorum dissidente qualitate motus fit in uentriculo inæqualis. 3. de morb. acut.

25 Qui opere multo defatigati a-
quam plurimam hauriunt, ac rursus
post cibum ad idem exercitium rede-
unt. Duplicem inde nanciscuntur in-
iuriam, ab exercitio quidem intem-
pestiuo cruditatem, à labore uerò ni-
mio biliosorum humorum repletio-
nem. 3. in 1. Epid.

26 Somnus ei qui humoribus fri-
gidis est plenus periculosus, si febris
paroxismo, aut in abscessu uentris ac-
cidat ob calorem, qui interiores par-
tes cùm sanguine subit continuo. At
cui humores crudi & pauci uirisq;
imbecillæ fuerint, magis prodest. 1.
de humorib. & in 6. Epid. Somnus
quem abscessus initio febris sequit,
febrim ipsam auget.

27 Ira & tristitia morbi sunt animi
quorum altero, nempe ira calor na-
turalis diffunditur & dilatatur, atque
inde fit cholera uulgò dicta, altero ue-
rò re-

ro restringitur, ex quo phlegmata & frigidi humores oriuntur, quos si curare uelis, eum ipsum calorem motibus interius & exterius, id est, animi & corporis, ira & exultatione excitare: oportet quò sese attollant ac extra diffundantur, & sic euacuentur. 1. de humorib.

28 Cogitatione rerum iucundarum quemadmodum auditus, & aspectus animum late diffundit, & delibutum gaudio reddit, caloremque naturalem seruat. Augit uerò contrarium. 2. de humorib.

29 Somnus omnibus ægritudinibus siccus ob humectationem conuenit, sed maximè illis, quæ uentris siccitate & humorum arefactione accidunt. de Somno & uigilia.

30 Vinum aqua frigida temperatum curat eas, quæ ex magnis fiunt euacuationibus dissolutiones, ac tunc præsertim quando humores fluunt ad uentriculum. At si aliquod uiscus sit inflammatum, aut caput doleat uehementius, aut aliqua animi alienatio ada-

tio adfuerit, aut febris ardens in morbo crudo: magna & penè insanabilia ex potu uini huiuscemodi affectibus nocumenta proueniunt. 1. ad Glauc.

31 Si cum magno dolore fluxio ad genu feratur, sufficit uehementiā doloris lenire, cū aliquo ex ijs, quæ ex uino dulci, oleo rosaceo, & pauca cera in utroq; liquata cōstant. Oportet autem hæc lanis excipere pingui-
bus, quæ plurimum habeant œsypi, & æstate quidem frigida, hyeme autem tepida apponere. Sic etiam cata-
plasmata ex arnoglossō, lente, pane, & rosaceo oleo adhibere: paulò uerò supra patientes particulas admoue-
re spongiam uino austero intinctam aut aqua frigida, cui mistum parum aceti fuerit. 2. ad Glauc.

32 Si plures affectus in unum coe-
ant ad eū, qui magis urget dirigi, pri-
mū curantis consilium debet, ubi
aliud efficiens, aliud quod efficitur
ab eo ipsa causa spectanda. Sin autē
curari hoc ante illud non licet ad id
quod ordo dictat est respiciendum.
ut si

ut si in uentriculum defluat ex cerebro frigidus humor, qui ipsius uentriculi intemperiem causetur, aut uitioli succi in medijs similarium particularum spacijs occupationem, aut mordicationis sensum, ac p̄inde deliquium, sudores syncopes dissolutiones, &c. Primum erit occurrendum ei, quod uires dissoluit, ubi autem firmatae erunt, ad fluxionis causam conuertimus. Nullum enim affectum sanari posse manēte ea, unde ortus est causa. 7. Methodi.

33 Hoc semper curātis animo hæreat non omnem naturam eadem remedia, requirere, sed infirmiores mollioresq̄ mitiora, ualidiores siccioresq̄ ualentiora. Quare natura aegri uenit in primis consideranda. 3. Methodi.

34 Qui à solo spiritu flatuoso cruciantur, illico tum cucurbitula admoda, à dolore liberi, tum omninò sani redduntur in quacunq̄ corporis parte dolor sit excitatus. Quibus uerò non spiritus solum flatuosus, sed humor

mor aliquis unde is oritur, uētris dōd
lorem excitat ijs ad tempus illico do
lor sedatur, sed redit tamen sequente
nocte, aut postridie, aut tertio die.

Quare in his doloris accessio est cu
randa cucurbitula. Postea uerò ua
cuandus humor, infuso per sedem a
liquo calfaciente simul & attenuan
te medicamento, (ego oleo rutaceo,
id est, in quo ruta incocta sit uti so
leo) quo iniecto nōnulli uitreum hu
morem eñciunt, & ex hoc protinus
ab affectu simul & dolore liberantur

i 2. Methodi.

35 Cū à locis circa stomachum,
aut aluum, aut aliquod intestinū san
guis educitur medicamentorum ca
lidorum, & tenuium partium mixtu
ra non est opus, sicuti est ubi ex pul
mone, aut arteria, aut larynge reiecta
tur sanguis, quanquam intestissimū
his est illud, quod in tantum refrige
rat, ut affectuum stupefaciat, quæ ta
men miscantur medicamētis sangui
nem reiectantibus congruis, quum
altio rem concilient & commodissi
ma

ma sint, n̄s qui tussi lancinantur, sistē
tia nimirum sanguinem, qui ad uas
affectum defertur, idq̃ per suam fri-
giditatem. 7. de comp. med. secun-
dum loca.

36 Optimus compositionis medi-
camen. scopus tria sibi proponit, ni-
mirum ut & sensus stupefaciat, & nul-
lum in posterum circa particulā de-
trimentum remaneat, & ut affectio
ipsa amplius inde iuuetur. Ad hæc o-
mnia respiciens Philo antidotum ad
omnes graues dolores uulcerum ali-
aq̃ multa conuenientem composu-
isse uidetur, ex croci drach. 5. Pyre-
thri euphorbi, spicēnardi, sing. drac.
1. Piperis albi ex hyoscyami drach.
20. Opī drach. 10. Melle arrico exci-
piendum, ex Opī quidem hyoscy-
amiq̃ mistura saporem senlitriscq̃
facultatis stuporem inducere uolēs,
reliqua calfacientia ad celerem distri-
butionem & partium generationē.
9. de compos. medic. secundū loca.

37 Quando symptomata cum fe-
bre grauiora incidunt, si ledant uires
aut

aut affectui noceant, quod solent uigilię, dolor, atq; uacuatio immodica, curandi ratione, quam ab initio instituimus, ad præsens mutata, non modo symptoma mouere ac sedare, sed uires etiā firmare, primū cogimur, quo sublato ad prætorē causam morbi reuertimur. Nūquam autem id agamus ubi uiriū roboris fiducia est. Veluti profectō dysenterię ipsi morientibus maximē medicamētis, tum potissimum medemur, cū utiq; est grauissima. 12. Methodi.

38 Si dolor distensionis nec sanguinis missione, nec reuulsione sedat, pater profectō in ægrotante particula impactū esse quod contristat: quare & curationem ipsam per digerentia medicamina moliendā esse. Quomodo etiā curantur dolores à flatulento spiritu orti: magis tamē n̄ extenuantia medicamina desiderant. Ibid.

39 In ulceribus medicamētorum ope curādis, primū hoc tenere medicum oportet, ut quod præter naturam

ram est, tū uacuet, tū digerat. Quod si per membri naturam aut etiam uitij rebellionem fieri non licet, ut id tum in pus uertat, tum putrefaciat. Hoc uerò secundo loco destinabit. Quippe ita in columellæ uitio facimus, primum, scilicet ad naturalem habitum reuocare tentantes, id si cōsequi non est, prorsus amputantes, idēq; uel chirurgiæ opera, uel per caustica medicamenta ultimo Methodi.

40. Cū omne quod naturale est, ex commoda temperatura nascatur, utiq; id quod præter naturam existit, ex aliqua intemperie orietur. Atqui intemperies omnis morbus est: ergo liquido constabit, quatuor symptomatum differentias, quæ in corporū affectionibus consistunt, nempe uisus, ex color, ut in arcuatis, & carbunculis &c. Gustus ex deprauatis saporibus, odoratus ex respiratu, aut perspiratu graueolēte, & tactus ut si cutis quæ prius mollis, nunc dura rigidaq; sentiatur. Constabit inquam hæc à morbis communem cōtraxisse

M se. de

se. de symptom. differentijs.

41 Humores singuli interdū synergi & puri, interdum inuicem misceri solent in imbecilliolem partem confluere ob idq; partium tumores uarias. Cū enim quatuor sint facultates omnium tum animalis, tum plantę particularum attractrix, retentrix, alteratrix & expultrix, excrementū quę omne aut qualitate, aut quantitate offendat, nec sit par robur omnium particularum, semper quę fortior est, excrementum ipsum ad imbecilliolem propellit. omnium autē imbecillissima est cutis, omnia corp. excrementa recipiens. Gal. de morbo causis.

42 Medicamina supra modum calida, etiā uires ualidē afficiunt ac minuunt. Propterea discutiēdis humoribus crassis ac lentis tutius est medicamentis calida adhibere, siue illabibus sint, siue potio. de sang. mis.

43 Imbecillitas partis omnino ab intemperie nascuntur, non tamē ab omni, sed ab excellentiori, quę san-

pen

per contrariam est abigenda. Propterea in exulceratis partibus, si humor non uberior neque malignitate excellens fuerit, sicuti tamen cōpescique medicamentis à astringentibus nequeat causam ipsam, si sit interperies, primum adiuues, non aliter planè nunc curata ipsa, quàm si incidisset citra ulcus, tum ad ulcus te conuerteres. Si uerò ab alia quauis particula, uel à toto corpore fluat uitiosus humor ad exulceratam, medendum imprimis est ipsius fluxionis radici. 4. Methodi.

44. Verum tum reliquos morbos, tum phlegmonas, sicubi curas nullo euaporante auxilio prius fidèter uiteris, quàm totum corpus aut pars, quæ excrementum transmittit uacuetur, aut contrarijs qualitatibus alteretur. Si aliquam intemperatiam sortiat, quæ ipsius fluxionis existit causa. Sic enim diutinas oculorum fluxiones curamus, oculis ipsis dimissis atque ad capitis custodiam conuersi. 14. Methodi.

45. Sanè uacuamus totum corpus

M 2

etiam

etiam cum mediocritatem succorum
continet, si morbi magnitudo id su-
deat. Siquidem dolor & membri in-
flammati calor etiam si purum sit a
excrementis sic totum corpus, fluxu
nis causæ fiunt. Tunc tamen parci-
uacuare expedit, idque habita ratio
ætatis, naturæ, anni, temporis, regio-
nis, ac denique consuetudinis ipsius
grotantis. 43. Methodi.

46 Si ualens aliquis morbus uir-
cum uirium robore affligat, uel si re-
dundantis sanguinis concursus non
ad sit, nemo est, qui non sanguinem de-
trahat, qui utique in artis operibus fuerit
exercitatus. Quippe sanguinis re-
dundantia haudquaquam sanguinem
mittendum indicat, sed magnitudo
morbi unà cum uirtute uegeta, exce-
ptis tamen à sermone pueris. Alij
autem etiamnum sanis, nec uehemen-
ter læsis, sufficit aut inædia, aut cibi
parcitas, aut soluta aluus, uel purga-
tio, uel frequentius balneum, uel ex-
ercitatio, uel multa frictio. 4. Meth.

47 Magnitudo autem morbi tri-
farian

ariam efficitur grauis' que & ualida.
 Nepe uel propter afflictæ partis præ
 antiam, ut uulnus quod in thoracē
 eritoneum' ue penetrat: uel propter
 effectus magnitudinem, ut quæ futu
 ris uel ligaturis indigēt, uel quod sint
 acoëthæ, ut quæ in articulis accipi
 untur uulnera. Vbi enim tendones
 & nerui, & carne uacua osculentaq;
 unt loca, hic doloris, uigiliarū, con
 uulsionis, & delirij periculum instat.
 Ibid.

48 Fluxionem etiamnum irruentē
 post sanguinis missionem, reuellere
 ad contraria studebimus, utique si in
 superioribus consistat ulcus per in
 ferna purgantes, sin autem in inferio
 ribus, superiorem uentrem uacuan
 tes. At si iam resistit fluxio, inhæsitq;
 membro, deriuare per uicina magis
 expedit, cū & in propinquiora trans
 latio, & purganti medicamini tum
 accessus, tū attractus à uicino sit pro
 prior. Ibid. & de natura humana.

49 Vacuare, ex repletionē crasso
 rum lentorumq; humorum affectos.

M 3 aut

aut hypochondriorum distensione,
aut inflammatione cuiusdam partiū
uentriculi nullos per aluum licet, in
1. Aphorif.

Addit Moyses.

Vt in fastidio ciborum, ubi causan-
tes ipsum humores attenuatos, nec
uigere amplius affectum senseris. Si
tamen uacuationem res postulat, eti-
am, id facies adhibita cautione ne uē-
ter, uel hypochondria inflammatione
laborent.

50 Cataplasma apponere, repleto
corpore nec uacuato nunquā oportet:
sic enim plus ægræ particulæ cor-
ruptæ materiæ allicitur, quàm resolu-
tur. In 2. morb. acut.

51 Crudorum humorum purga-
tio, mors est, ut in inflammationibus,
quæ sub aurē accidunt, quemadmo-
dum & digestorum neglecta solutio
uel uacuatio, iuxta aphorismū Hip-
pocratis. Concocta medicari, cruda
concoquere. 2. in 1. Epid.

52 Cucurbita citra scarificationē
adhibita omnino morbis prodest.
qui

ui ex uaporibus crassioribus flatus-
 entis ac frigidis, itemq; membris op-
 ilacis & succis in uase conclusis ac
 xire nequeuntibus sunt cōtracti. 6.
 n 2. Epid.

53 Fluxiones ex capite ad fauces,
 uulvas, & palatum euocare per na-
 res medicamētis oportet. Si uerò ad
 oculos fluant, purgare per os medi-
 camentis ad id ualentibus. 1. de hu-
 moribus.

54 Intensio uocis summa prodest
 naturali calori excitādo pituitæ cras-
 sæ ac tenaci eruendæ, & meatibus a-
 periendis. Qua de causa refrigeratis
 corporibus cū fieri indigentibus cō-
 moda est. Gracilibus tamen aut alio
 qui uentriculo affectis nocet huiusce
 modi exercitium, quòd tenuem qui-
 dem illorum calorem in mouendo
 humori, breui consumunt, unde gra-
 uius postea ægrotant. de Somno &
 uigilia.

55 Vbi morbi existunt acuti cele-
 riterq; ad statum perueniunt, etsi ual-
 de tenuem uictum exhibeas non læ-

M 4 des:

des: ubi uerò diuturniores nisi ab initio cibo uberiore reficias, hominem simul cum morbo perimes, sed oportet, tenuissimum cibum, qui in toto morbo exhibentur in statum reseruare. Eo enim accedente tenuiorem oportet exhibere quàm prius. Cæterū quantitas sit tanta ut bene coquere possint. i. ad Glauco.

56 Semper oportet cōtrarias qualitates, illis quę inualuerint præter naturam, opponere, quum hoc multū plus iuuat, quàm quomodolibet uacuare. Sunt enim contraria contrarijs remedia, quę quod superfluum est repimunt, & quod deficit suppleant. Ibid.

57 Medicamētis fortiter resoluentibus semper miscenda sunt emollientia ne tumores scirrhosos degenerent.

58 Frictiones siccae dolores, certa periodo quibusdam partibus redeuntē sedant ac prohibent præcipuē si duas aut tres horas, antē accessionem adhibeantur. Firmantur enim
ex par-

ex partes & consuetas fluxiones minus admittunt: atq; hæc omnibus ætatibus omnia existunt. 5. de sanit.

59 Intemperies calida uel frigida multò citius sanari potest quàm sicca: neq; enim hæc nisi diuturno tempore humectari potest, & si prorsus consummata sit, nullas omninò admittit curationes. Illa minimè. 1. Methodi.

60 Pernitioris siccitatis affectus extra omnē curationem positus est, cum solida similarium partium substantia humore exhausta est: ad quē affectum quò proprius accedunt corpora, eò diutius ægrotant, & ægrius curantur. 6. Methodi.

61 Gradus siccitatis sunt quatuor Consummata quidem ubi solida similarium partium cordis, hepatis, & cerebri substantia reddita est siccior. Altera cum ea quorum substantia ex humore concreto constat, sicut caro & adeps, est liquata. Tertia cum propria humiditas unde partes nutriuntur omninò est absorpta. Ea conti-

M 5 netur

netur in omnibus animalis partibus
ceuros quidem per eas sparsus. Atque
hanc sine nutrimento particulis in-
serere non est, ideoque difficillima est
omnium eiusmodi affectuum cura-
tio. Quarta quæ in proprijs cuiusque
particulæ exilibus arterijs uenisque cō-
sistit, quæ & ex sanguinis penuria p-
uenit. 7. Methodi.

62 Tempus quidem caloris frigo-
risque reparandi par quodammodo
est, securitas tamen impar. Nam nisi
cuncta quæ ei quod curatur, circum-
data sunt corpora, plani ualida fue-
rint, metus est ne ab ijs, quæ refrige-
rant noxam contrahat non leuem. l.
bid.

63 Vacuationes fiunt omnino uel
per sanguinis missionem, uel clyste-
ris usum, uel urinæ uias, uel eam quæ
per cutim fit transpirationem, nem-
pe sudorem, ac præterea per eam quæ
fit ad partes oppositas attractionem,
nempe reuulsionem atque ad alias pro-
pinquas deriuationem. Nam & ad
hoc genus pertinet citare menstrua,
hæmor.

hæmorrhoidesq; aperire ac denique expurgare per palatum & nares. in Artemed.

64 In curationibus hepatis, aliqua ex astringentibus medicamentis semper miscere oportet. Sed quoniam in profundo admodum loco situm est, ne astringentis medicaminis uis in uia debilitetur, nisi aliqua altera subtilium partium substantia: qualis aromaticum est traducatur. Melius uerò fuerit si & ipsum medicamen astringens etiam aromaticum fuerit. Nam si duas qualitates & potestates insitas habeat, ualentius operabitur, uacuas quod præternaturam in ipsum membrum confluxit, seruansq; humorum modum naturæ conuenientem. Ibid.

65 Præcipuè autem astringentibus, est utendum, ubi in iecur aut uentriculum superuacuū aliquid profluit: quando & à primoribus admodum hæ partes sunt, & ut munus suū obeant, uel in ipsis morbis est necessarium, nam alimentum uniuerso corpori con-

ri conficiunt. Quare ciborum concoctio siue in uentriculo, siue in iecino-
re sit in prospera, febres intendit ac
succus uitio exacerbat. At uerò, nec in
colo laborante, nec intestinorū quo-
uis, nec musculis præcordiorum, nec
ipso peritoneo miscenda astringen-
tia sunt. Sed nec in uesica, nec uteri
affectibus, nisi excrementorum co-
pia sit in toto corpore. Renes autem
& pectus in media consistunt condi-
tione. ¶ 1. Methodi.

66 Polychresta siue multi usus me-
dicamenta apparantur, cū unum
habere uiginti affectionibus congru-
um malumus, quā tot numero alia-
quum tamē ad singulas affectiones
unum aliquod destinatum, eò quod
ad plures paratū est, melius existat,
& paulò pōst. Impossibile est ut inue-
niamus pharmacum unum ad affe-
ctiones multas optimum, multo quē
præstantius semper est, quod ad sin-
gulas earum cōponitur. 8. de comp.
secundū loca.

67 Cataplasmata humectantia in-
flam-

flammationibus biliosis optima, ex-
iccantia ijs, quæ ex seroso sanguine
superfluo fiunt. Temperata uerò, id
est, mediocriter calida & humida, ijs
quæ à crassis uiscosisq; excrementis.
in 2. acut. morb.

68 Diabetes certè quàm rarissimè
accidit, nec ego unquam præter duas
uidere adhuc potui. 6. de locis aff.

Addit Moyses.

Nec ego uidi in his occidentali-
bus partibus, neq; præceptorum ul-
lum uidisse audiui. In Aegypto autè
decem annis, quod ibi egimus plus
uiginti uidi, quod argumento est, eū
morbum in calidis regionibus sæpi-
us fieri, nisi forte Aegypto frequen-
tior est, ob aquas Nili saliores, qui-
bus uulgò utuntur ipsi.

69 Principium diei proportionē
temporis ueri respondet, & pars quæ
sequetur æstati: Medius autem au-
tumno, & ultima hora hyemi, quæ
causa est cur serò graues & uehemen-
tes magis urgeant. 2. de humorib.

70 Ventorum & aëris qualitarum
optima

optima est, quæ ab Oceano afflatur. Secunda quæ ex montibus: Tertia quæ à medijs locis & campestribus. Quarta & pessima quæ à cloacis, secelibus, paludibus & huiusmodi alijs locis humidioribus. 3. de humoribus.

71 In thoracis aliorumq; uniuersorum uiscerum inflammationibus, quæ in superficie apparent laxantia sufficiunt, intrinsecus autem sicut in costas succingente membrana, requiruntur acriora. Quod si ipsis uisceribus medicamenta applicare possemus: tantò molliora deberet esse, quantò ipsorum natura ut afficiatur est promptior. Quia uerò nō datur, ob id nimirū, quæ eduntur ac bibuntur medicamēta uisceribus conferentia, multò potentiora & acriora esse conuenit, quæ affectui ipso medeantur, ijs quæ parti ipsi affectæ conueniant: exceptis tamen illis quæ uentriculo stomachoq; auxiliantur. Hæc enim sola talia exhibent, qualia affectio postulat. 2. ad Glauç.

72 Quæ

72 Quæ facile sentiunt partes, ac-
cia medicamēta non tolerant sicuti,
neq; acres humores. Ob idq; os uen-
tricoli atq; eo magis oculus infesta-
tur ab erodentibus medicamētis. At
quæ obtusum habent sensum, cata-
plasmata graua sustinent & morda-
cia medicamenta. Ibid.

Ex filio Zor.

73 Medicamen purgās & earum
siue apponatur corpori siue bibatur,
tepidum esse cōuenit. Astringens ue-
rò & repellens equè frigidum ac pu-
tei aqua. Digerens uerò paulò calidi-
us purgante, mitigans quoque tepe-
dum, sed in hoc se syncopen metuas,
aquam simul frigidā adhibere oport-
tebit.

Idem,

74 Quicquid (inquit) astringit
ac mordet, digestionis quoq; ac
solutionis particeps esse solet, excep-
tis myrti folijs, quæ sola ex causa acri-
or sunt, non astringunt. Reliqua ue-
rò repellendi ac retinendi uim etiam
cum acrimonia obtinent.

75 Medicamenta purgātia singu-
la inf-

la, initio familiarem humorē trahunt
 postea eum, qui sequendo aptior, at-
 que habilior fuerit, ut exēpli gratia,
 quod flaua educenda est, primū i-
 psam, deinde aquositatem, humidi-
 tatem, tertio pituitam, quarto atram
 bilem, postremo sanguinem. Gal. de
 purg. medic. facult.

74 Reperiuntur tamen aliqua,
 quæ statim ab initio sanguinem du-
 cant: sed nemo utetur quandoqui-
 dem hoc iugularæ esset hominem,
 non purgare. Siquidem purgantia
 dicuntur hoc nomine quod sangui-
 nem ab illis excrementis
 repurgent. Ibi-
 dem.

DE

DE CURANDIS MOR-

bis particulari ratione.

SECTIO VIII.



Pilepsia quę ex crassis frigidis ac pituitosis succus accidit, curatur mutādo cuidam qualitatē in siccā. Quod fit ætatum successione, regionum mutatione: item aliorum exercitiorum, ac diætaram observatione & præterea medicamentis discutientibus adhibitis. In 2. Aphorism.

2 Secare in cubito uenā, si ex dextra mare prorumpant sanguis in brachio dextro expedit: sin ex altera in sinistra: minimē tamē usq; ad lapsum uirium trahendus. Simul autem quū agis artubus uincula inijcito, aut ex lana, aut canabe, hypochondrioq; directē supposito cucurbitulam admo- ueto: quandoquidē his remedijs semper sanguinē erumpentē compescui-
mus,

mus, quum antea quæ inseruntur atque fronti illinuntur infirma omnia cõperiemus. Gal. de sanguinis mis.

3 Cui cerebrum aurium fluxione purgari solitum est, si quãdo ex eius suppressione oriatur, aut stupor, aut uertigo, medicamentis abstergentibus, ac discutientibus dimouere ac purgare conueniet, nam huiusmodi quidem statim sanari hoc modo uidimus. 2. in 6. Epid.

4 Hemycranicis & huiusmodi affectibus ex sanguine crasso gelido quæ in interiori corpore ortis mirè prodest uini puri boni quæ ac tenuis potus in cibo, uel post cibum. Maxime uerò panis ipse madefactus, ex eo enim uapor quidam calidus ad partes affectas fertur, à quo ipsæ circũstantes omnes calefiunt, aperiuntur quæ pori, & condensati in his humores discutuntur. 2. in 6. Epid.

5 Fluxum sanguinis è naribus si non sedat cucurbita hypochondrijs affixa, occipitio adhiberi oportet cū quibusdam medicamentis refrigerantibus.

rantibus. In 6. Epid.

6 Mucum narium crudiorē aquo-
siorēq; factum odoramentis cohi-
betur, uelliquoribus nari stillatis. i.
de humorib.

7 Grauedini quam *λερύνη* uocāt,
sternutatio est initio morbi ualde no-
xia ob cruditatem humorum morbū
efficientium, itemq; coitus, quòd ex
motu uenereo capitis repletio auge-
atur, cum quiete & otio in ijs humo-
ribus digerendis natura multum e-
geat. Prodest autem sedatis fluxione
ad eorum resolutionem atq; euacua-
tionem. Ibid.

8 Suffusiones oculorū, ex humo-
ribus inter corneam & chryſtalloi-
dem glaciei modo concretis oriunt̃,
& cum albugineo non solum colo-
re, sed natura etiam pugnantibus. I-
bidem.

9 Dolores capitis si sint ex humo-
ribus, qui calido temperamento in-
digeant constringentibus leniuntur
ac sedantur. Ibid.

10 Vigiliis curaturus ac prohibi-

N 2 turus

turus, pedes & manus constringito,
 qua hora dormire uellet æger, & a-
 gitatione perpetua caueto ne dor-
 miat, ne ue oculos claudat. Vbi ue-
 rò eum dormire uoles, solutis mem-
 bris lucernaq; amota & facta quiete
 somno etiam alto ei indulgeto. 3. de
 humorib.

11 Fieri potest ut ñs, qui solent su-
 pini totas noctes dormire apoplexia
 contingat, huiusmodi decubitu cau-
 sam dante. 6. de motib. necessarijs.

12 Medicamento confecto ex scil-
 la post purgationem, quæ aduentan-
 te uere molienda est, utetur puer e-
 pilepticus singulis diebus antequam
 ad palestram accedat. Et sanè nisi ual-
 de rebellis sit morbus spero 40. die-
 bus, sola eius medicamenti ope solu-
 tum iri. Gal. consilio pueri Epilept.

13 Quando impediuntur sensuū
 actiones, nec ulla manifesta est inflā-
 matio, intemperiem cerebri causam
 esse oportet, eamq; aut ipsius uentri-
 culis, aut uenis & arterijs, aut humo-
 rib. in ipsum diffusis contineri. Quo-
 niam

niām autem accuratē huiusmodi in-
temperies uix cognoscitur, adhibere
in ea quærenda medicinæ diligentia-
am debet priusquam medeatur. 3.
de locis aff.

14 Melancholia gignitur, aliquan-
do ex sanguine melancholico, per u-
niuersum corpus redundante, aliquā-
do in solo cerebro, aliās etiam in par-
te consensum habente. Si igitur ex
toto corpore fuerit, à uenæ sectione
ordienda curatio est. Si uerò in cere-
bro sit genita, æger tūc sanguinis de-
tractatione nō indiget, quamuis ob
aliā causam detrahi possit. Ibid.

15 In lethargia æquē ac Phreniti-
de incidenda uena est statim ab ini-
tío, si modo tam ualens uirtus sit, ut
sine noxa missionem sanguinis tole-
ret, neque officiat crudi humoris co-
pia, uel puerilis ætas, uel anni tēpus,
uel regio calidior ac siccior. Commu-
ne præterea est utiq, ut oxyrhodium
in principio ad noueas, nā repellens
à capite est humor quisquis is fu-
erit. Sed in hoc sunt contraria, quod

N 3 in phre-

in phrenitide quæ cum uigilijs est, lenire eas oportet, in lethargia quæ cū immobilitate ac stupore accidit, excitare. 13. Methodi.

16 Si lethargiæ & phrenitidis malum trahat, cū ad statum propè fertur, castoreum & nonnunquam cucurbitam ad mouemus. Ibid.

17 In lethargicis nos incoquētes in aceto thymum & pulegium, & oryganum, aliāq; id genus ad mouemus, quò uapor ad cerebrum delatus crassitudinem humoris dissecat. Mox etiam postquam increuit palatum ualentibus, & acribus medicamentis ungimus. Ab his uerò, etiam sternutamētis utimur, tum ad caput similes præsidiorum facultates accommodamus, intenta semper eorū, etiā ad ipsum usq; synapi, uehementia, si diu uitium trahat. Ibid.

18 Lethargi principiū est functionis sensuum læsio, apoplexiæ uoluntariarum actionum, epilepsiæ mentis & sensuum. Detentionis uerò seu catochi, præcipuè sensuum. 2. de morb. causis.

19 Qui-

19 Quibus ob potionem calidiorum uniorum caput repletum uaporibus aut humoribus calidis (qui etiā absq̃ uini potu solent ad caput attolli) dolore affligitur n̄s, uomitus si adhuc crudum in uentriculo uinum sit, hausta aqua tepida ciendus erit, sin post concoctionem doleant refrigerantibus ac repellentibus utendum, quale est Rosaceum per se, aut cum aceto, aut cum hedere, & brassicæ tremore Cæterum somni quietusq̃ cura habenda sic est, ut per totum diem quiescant tum ad uesperam loti, cibis boni succi nutriantur, non tamen calfacientibus. Quales sunt Prisanæ succus, sorbitio ex alica, panis ex aqua, & oua sorbilia absq̃ garo, quib. aromatū condimenti misceatur, quantum ad suauitatē saporis farciat. Refrigerant etiam, Lactuca, Brassica, Lenticulæq̃ siccum. Potu uerò omnino aqua utendum est: at quæ nonnullis uenterculus subuertitur malum punicum ipsis superedendum est, aut Colym, aut cum alica calida probeq̃

N 4

cocta.

cocta. 2. de comp. meden. secundum
loca,

20 In rassicæ folia calida macerata, capitiq; circumposita ac obligata, naturaliter ebrietati resistunt. Ibid.

21 Causæ procatactice dolorem capitis inferentes sunt, ardor extrinsecus accidens, aut refrigeratio, aut ebrietas, aut ictus. Intrinsecus autem intemperies simplex citra humorum affluxum, aut in humorum qualitate, aut in eorūdem multitudine, aut obturatione, aut deniq; imbecillitas naturalis ob quam spiritus flatuosus innascitur, quarum affectio singulatim propria existit. Ibid.

22 Vehementissimi capitis dolores fiunt iuxta caliditatem, & frigiditatem maxime cum inæquales fuerint: moderati autem iuxta siccitatē, ex humiditate autē nullus fit dolor. Is autem qui ex ardore caput dolent, cutis aridior ad primū contactum apparet, oculosq; rubros habent, ac frigidis tum perfusionibus, tum illitionibus oblectantur. Repulsoria uero

rō curatione principio opus habent,
 ex refrigerantibus & astringentibus
 constante Postea etiam mitigatorijs
 repulsorijs mistis: deinde discutienti-
 bus, paulatim detractis quæ repel-
 lunt. Optima autem sunt, quæ sub-
 stantia tenuium partium sunt prædi-
 ta. Quale est rosaceum frigidissimū
 quidē principio perfusum iuxta fron-
 tem, & tempora, & occiput, non ta-
 men longē inferiūs, ex oleo crudo
 (quod onuphacium uocāt) citra salē
 confectum, nempe rosis, quampluri-
 mis ī eo maceratis ipsoq; anno, si po-
 test cōfectum. Proximum à rosaceo
 erit chamæmelinum, potissimum in
 foemininis eunuchis & pueris, quib.
 non est inducenda uehementissima
 frigiditas. Miscenda autem refrigerā-
 tia hæc sunt, Semperiuij, Portula-
 cæ, Lactucæ, Psyllij, Polygonicæ suc-
 cus, item Solani, Pampinorum uitis,
 uuarum maturarum, sed paululū ho-
 rum singulorum, sicut & mali puni-
 ci, lydonij & mespili. Cucurbitæ eti-
 am cremorem omphacio miscui, &

N 5 seri

seridis, mororumq; submaturorum aptus erit. Ibid.

23 Doloris capitis à frigore indicium est facies decolor, & non arefacta tamen, non frigidis gaudere, & curatio autem fiet, rutaceo oleo calido syncipiti effuso: item euphorbij & quibuslibet pharmacis expipere: iungēda facies, aures, nares præcipuè irino, amaricino, nardino unguentis, item foliatis spicatisque uocatis. Samplicinum etiam, laurinum, & serpyllinum commendo, uinum tenuiū partium profundum, motusq; corporis præcipiendus. Ibid.

24 Aurium meatus ab obstructione liberant omnia, quæ tenuium partium substantium absq; mordacitate sunt prædita. Cuius generis sunt cucumeris sylvestris radix: item Bryaniæ ari, dracunculi, centauriæ, polij, & omnino amarorum omnium.

Rursus. Moderatæ aurium inflammationes & non pulsatiles, rosaceo & aceto, simul tēperatis, tepesactisq; atq; infusis curantur. Prodest etiam
mul

multum, Pastillus ex Glaucio cum aqua pluuiali trito, in pastillum coacto, & exiccato, cui gummi decima-quinta portio, ut melius compingatur addere est. 3. de comp. secundum loca.

25 Vlcera aurium recētia tū glaucium solum, cū aceto tantum curat, tum collyria ex eo omnia, sicut & quæ ex croco, & ex rosis fiunt: item Democratis collyriū ex Myrrha. Pastillus etiam mens ex charta combusta. Ibid.

26 Dolores aurium à frigore calfacientibus curātur. Euphorbio modico ad multum uetus oleum admixto, pipere exquisitissimè trito, oleo amaricino infuso & optima nardos, rutaceo oleo tenuissimarū partiū, oui candido, quo etiam ad lippitudines utimur, lacte muliebri, adipe anserino, uulpinoq̃, quæ omnia aut singula, aut coniuncta quodam infundi debent mediocriter calida. Ibid.

27 Ad lippitudines oculorum & inflānationes adhibenda sunt, phar-
maca

maca repellentia, minimè tamen exasperantia, id est, non uehementem astrictionem sortita, ob sensus subtilitatem ac substantię raritatem, sed & lenitiui liquoris admistione moderatiora facta. Cuiusmodi sunt oui candidum, fœnigræci decoctum, magisque adhuc ipsum lac: item albumen oui cum collyrijs monhemeris, id est diarijs, Balneum sub uesperam, nardinum collyrium iuuentū die sequenti balneū, & deambulatiuncula paulò antè ipsum. Foveri autem oculi debent ex meliloti & fœnigræci decocto semel quidē, aut bis in die si mediocris sit dolor, sæpius autem si uehemētior. 4. de comp. secundū loca.

28 Ego nullum pharmacum auribus dolore uexatis infundo, neque etiam per lanam instillo, nimirum experientia edoctus, quod præstet, neque omnino contingere doloris tempore auditorium meatum. At remisso dolore, per auriculare specillum, obuolutum lana, mollissima partem dolentem foueo, pharmacumq; in iñcio

clo modicè tepefactam in aurifusorio specillo. Postea uerò forinsecus tum orificio auditorij meatus, tum uniuersæ auri mollem lauam impono. 3. eiusdem.

28 In sonitibus aurium, si ob flatulentum spiritum, cui non pateat exitus fiat, discutientibus, attenuantibus, ac differantibus utere, simul & apoplegmatismis. Si nil proderit, quia non ex flatu, sed exquisita audiendi facilitate procedat, præsertim si acuto sensu præditus æger appareat stupefacientium quippiam. Cuiusmodi est mandragoræ & papaueris succus, admiscito ad flatulentos igitur sonitus, acetum cum rosaceo instilla, aut cuminum & oleum crassitudine mellis, aut radicis syluestris cucumeris succum, aut reclinato ægro & nitro trito in aurem insperso acre acetum infunde tepidum, ac postquam feruere desijt exerge lana & nucum amararum succum, infunde lanæq; obtura. Ad facilitatem uerò exquisitam audiendi castorium & cicuta semen cum

cum aceto trita instillato. Ibidem.

30 Cataplasmatum cura & ut nō nisi superuacuum magna ex parte partium uacuatis, & partium concoctis, & ieiuno ægro apponantur. 12. Methodi. & 5. de comp. med. secundum loca.

31 Ocularium pharmacorum unum genus in his tribus liquoribus lenitiuis consistit fœnigræci decocto lacte & oui cādido, quæ omnimodæ acrimoniæ sunt expertes. Alterum in ijs quæ modicam mordacitatem sortiuntur admistamq; habent partim afflictionem, partim extergēdi facultatem, qualia sunt rosæ astringentes, thus extergēs, crocus & myrrha: Lycium & castorium, & mellodi decoctum, quò est concoctorium. Immiscetur etiam lapis hematiles, resiccās humores, ueluti & cadmia, & lapis schistus, Stibius bene lotū. Reliqua chalcitis usta, mysi, ærugo, gallæ sunt uehementiora, q̃ ocularib. conueniant. 5. de comp. secundum loca.

32 Ophthalmia calidis regionib.
sæpius

ſæpius accidit, ſed iſſdem citius curatur quàm frigidis. Atq; eadem eſt in utraq; hyemis & æſtatis ratio. 2. de med. ſimpl.

33 Angina hominem ſuffocat aliquid haurientem, quod fit ob craſſos humores in faucium partibus hærentes. Eſtq; pernicioſiſſima phlegmone, in qua nulla incenſio appareat, q̄ in œſophago, aut gutture, aut eorū muſculis ſoleat euenire. 2. in 2. Epid.

34 Id uerò phlegmonis genus, ſi urget non ſolum medicamētis intrinſecus iuuantibus, ſed etiam emplaſtris, & calidæ perfuſionibus ac balneis extrinſecus indiget, quod tamē ante declinationem fieri neceſſe non eſt. Cibi autem farinacei generis eſſe debent molles, ac medicamētarij omnes, quò partibus affectis emplaſtri uice int inſecus ſubſeruiant. Ibidem.

34 Sermo propriè eſt motus artèriarum ſeu ſpiritualium inſtrumento rū. Propterea ſi quis fluxu ſanguinis laborat cohiberi eiꝯ, & pulmonem, & pe-

& pectus, & tracheam arteriam oportet, ne clamore uel spiratione nimia laedatur. Motus uero manuum & pedum concedendus mediocris, eatenus tamen ne spiritum intus coactum commoueant. 1. de humorib.

36 Intemperiem musculi pectoris inaequalem lenis aliquando tussis sequitur, quæ ex eo fit quod musculus ab ipsa intemperie cōpunctus repellendi, ac diſciendi à se contraria sensu moueat. 5. de morb.

37 Ad omnem tussim confert medicamen, ex Anisi drach. duæ acet. costi obolis tribus, myrrhæ castorei, Chalbani, Piperis albi, sem. hyoscyami, opii, succi glycyrrhizæ sing. drach. una, passo exceptis redactisq; in Catapotia, Ciceris magnitudine. 7. de comp. secundum loca.

38 In reiectione sanguinis curatio eius quidem, quæ ex reſeratione osculi, cuiusdam uasis accidit per obturationem molienda, eius quæ ex ruptura, per conglutinationem, eius quæ ex erosionem, per erosorum renutritionem.

Obtu-

Obturantur autem oscula illa per astringentia. Conglutinantur per eadem & per resiccantia citra mordacitatem; & glutinosa, uelut est sanitas aster, & lemnia terra. Renutriuntur per cibos boni succi & pharmaca carnem gignētia: Immiscenda autē iuxta secundam rationem, in ijs quidem qui ex pulmone, aut thorace, aut arteria, aut larynge reiectant, calida & tenuium partium medicamēta, quæ præparant uiam astringentibus, at ijs qui ex locis circa uentriculum, aut stomachum, aut aliquod intestinum, huiusmodi mistura non est opus. Ibid.

39 Singultus, q̄ ex ui frigoris neruosa membra cogentis ac eorum superfluos humores dissoluentis fit, ut ait in 6. Aphor. uel ex plenitudine & euacuatione secundum Hipp. uel citra hac ex acribus, ferosis, medicamentosisq̄ humoribus uentriculum mordicantibus, uel ex deuorato pharmaco diatrion pipereon, & uino superbibito, uel ex alimenti corruptione in uentre, uel ex partis frigiditate.

Q

quod

quod pueri maximè contingit, curatur si ex copia, aut mordicatione sit, uomitu, si ex frigidityte, calidis medicamentis, ruta cum uino, aut nitro cū aqua mulsa, aut opio, aut castorio, aut abrotono, aut aristolochia. Item Asclepiadis compositio, Spicænardii, costi, chrysobalanorum, rosarum uiridium, mastiches sing. drach. quatuor, aloës asari drachm. duas, apij drach. unam succo psyllij excipito, pastillos formato, & obolos tres dato. 8. de com. secundum loca.

40 In affectibus uentriculi sicut & hepatis cibum ægro, certa definita q̃ mensura præscribi oportet, quæ affectus particulas non magis grauetur. in 2. Epid.

41 Auxiliorum materia congruentium respirationis organis gulæ pharyngi, laryngi, & intern. & arteriæ, tum ab alijs, tum à balneis dulcium aquarum, cibis lenibus, & laxantibus petendum Quales sunt qui ex lacte, amylo, alica, ouis, & cibis dulciarijs constant; item pharmaca sub lingua

lingua tenēda Hypoglottides dicta,
ex uino hereo, gummi, tragacantha,
glycyrrhiza, conflant, quæ lenigant
asperitates, concoquunt & citò per-
sanant. Quibus qui utetur, patiens sic
oportet, ut ipsam linguæ suppositū
paulatim liquefcens, in laryngem ex-
cipiat, renitēs interim tussi si qua ex-
citari uideatur. 7. de comp. secūdum
loca.

42 Stupefacientia medicamenta
(quæ in tantum refrigerant, ut som-
nium inducant & affectum stupefa-
ciant) miscētur reiectioni sanguis cō-
gruentibus, quod altiorē somnum
concilient & commodissima sint ijs,
qui tussi lancinantur sistentia nimirū
sanguinem, qui ad uas affectum de-
fluit, idē ob suā frigiditatem. Ibid.

43 Dolores uētriculi syncope me-
diocriores facile uino paulū dilu-
to curantur, ex eo enim calefit uentri-
culus concoctioq; iuuatur, & frigidi
humores resoluuntur. Propterea eti-
am horri ex erodentibus & acrib.
humoribus nato adhibetur commo-

dē modò citra febrē, aut phlegmō-
nem fuerit. In 2. Epid.

44 Epilepsias ex fastidio & dolo-
re stomachi ob largiorem uehemen-
tioris uini potum, aut nimium uene-
ris usum, itemq; febres ex conuulsio-
ne ob iniquos uētriculi humores na-
tas sæpe uomitu uidimus sanatas. 5.
de locis aff.

45 Frequentissimē uidemus flaua
in uentriculo bile contenta caput do-
lore affici. Illa uerò eiectum per uo-
mitum ilicò dolorem compesci. Atq;
inter optimos medicos non solū hæc
accidentia, sed epilepsiam quoq; ca-
piti à uentriculo oriri. Ibid.

46 Melancholicos seu hypochon-
driaco morbo laborantes, nunquam
deserit timor. Nā omnes timent, mœ-
rent, uitam damnant, sed nō omnes
mori cupiunt. Sunt tamē qui & mor-
tem metuunt, & mortem sibi consci-
scent, quod fit ob atræ bilis colorem
mentis sedem occupantis. Quē mor-
bum minimē inueteratum frequen-
tibus balneis uictuq; humido & bo-
ni suc-

ni succi, nullo alio præsidio adhibito ipse aliàs curauit. Nam ubi diuturnus ipse morbus est factus, fortiora remedia postulat. 3. de locis affect.

47 Quibus uenter adeò imbecillus est, ut omnes cibos corrumpat, ijs prodest plurimum uomitus ante cibum uini dulcis usus, & alimentum concoctu facillimum. Item & medicamen discutiens abstergensq; ut hiera picra. Quæ uacatio non est negligenda, alioqui morbus fit deterior, ideoq; curatu ægrior. 6. de sanit. tuend.

48 Intemperies calida exuperans cui adiuncta sit humiditas, mediocris minore metu aqua frigida curabitur, quando ex ea minime lædantur, uicinæ partes ipsius uentriculi, ut quæ mediocriter habere debeant. 7. Methodi.

49 Qui appetentia carent sic ut cibos auersentur (quemadmodum in diarrhœa accidit ex caliditate orta) his de medicamento, quod ex cotiniorũ succo fit unũ, aut duo cochlearia danda sunt, aut si huius copia nõ
O 3 est,

est, eius quod ex carne eorum cōponitur. Si uerò ex ægro compereris nutrimentum corruptum in superioribus partibus uentris pendere & grauari, aliquid diatrion, pipereon dabis, non medicamento si illius, sed eius quem in nōs, qui cruditate laboraret lib. de Sanit. laudauimus. Si motum id notabiliter ad inferiora fuerit ad iuuandum aut glande subdita, aut leui per inferiora infusione est, utiq; si rosio simul adsit, hāc mitigantibus, si flatus hunc comprimētibus, si neutrum fuerit ex aqua, melle & paulo olei id quod subter infundetur facientibus. Vbi uerò uehementior rosio urgebit Sabinū oleum, in quo aliquid sæui anserini sit liquatū est utilius. Si uerò eius copia non est, gallinacei sæui. Si nec huius facultas est, caprini. Quod si huius quoq; penuria erit inñciendum oleo parum ceræ est potissimum elotæ. Flatus uerò sanādi sunt oleo in quo ruta, & semina quæ flatus discutunt fuere incocta, apij, cumini, marathri aliorum
 quæ

quæ id genus. 8. Methodi.

50 Vacuata aluo in appetētia deiecta, nutriendum protinus, amotis ijs quæ astringant: ac siquidem, primo ad uesperam hæc egeris, aut etiā noctis qualibet hora, etiam secundo die similem adhibebis prouidentiam in quo etiam si planè desit febris, & appetentiæ deiectio, lauari hominē fines. Ac ubi in sequenti nocte quietus, citra offensam dormierit, sanum iam hominem prorsus existimabis. Si uerò sequenti nocte aut etiam tertia febrile quiddam paululum afferat ne id quidem formidandum, sed hunc quoque postridie lauabis, nutriesque ac reliqua ut ante definitum est exequeris. Ibid.

51 Quibus ex abundantia crudorum humorum syncope incidit, ijs crassa unia ceu noxia, aquosæ parum efficacia sint fugienda. Deligenda uerò sunt media, quæque flaua sint & calida nisi fortè imbecillum illis caput est, quod facile calentibus uinis tentetur. Tum enim quæ minus caleant

leant sunt potius offerenda. At qui-
bus ex bili affectus hic inciderit, si co-
gantur prorsus uino uti, fugere oport-
tebit omnia tum austeria, tum noua,
itemq; crassa. Deligere uerò aquosa
magisq; si sint antiqua. Talia enim,
tametsi non ualenter excalfaciunt, ta-
men faciliè in omne corpus deducun-
tur. 2. Methodi.

52 Per uoluuolosas stomachi sub-
uersiones, aliquando stercus per uo-
mitum redditur, ubi scilicet partes af-
fectæ serosis medicatisq; humorib.
magnopere affliguntur. Quod si im-
becilliores etiam sint geminatur ma-
lum, erit itaq; in ijs curationis scopus
ut ad illas adorata admoueamus, ue-
luti anisum, appium, Glaucum, cumi-
num, seseli, &c. Nam quemadmodū
grauelentia omnia stomachum sub-
uertere solent, sic adorata corroborare.
8. de comp. secundum loca.

53 Scire quidem licet eas disposi-
tiones, quæ à prauis succis circa uen-
trem stomachumq; oboriuntur ma-
ximè per medicamenta ex aloë iuua-
ri, mi-

¶ mirum autem in modum lædi ab
edulijis potionibus, & pharmacis a-
stringentibus. Contra uerò ubi hu-
mores nō qualitate, sed copia ob uen-
triculi affligunt utilissimus astringen-
tium est uis, languida tunc existen-
te particula affecta instar laxatorum
articulorum. quorū etiam per astring-
gentia affectio corrigitur. Ibid.

54 Deprauata potionis cupidi-
tas deprauatæ appetentiæ ciborum
proportionem respondet. Siquidem
immoderata potio appetitur quan-
do contenti in uentriculi tunicis ui-
tiosi humores, aut falsi sunt, aut bilio-
si, interdum etiam cū, ueluti feret in
eo natiua ipsius humiditas. At pra-
uas poriones nonnulli appetunt pro
uitiosi humoris, qui in ipsis uincit ra-
tione. 2. de sympt. causis.

55 Quibus os uentriculi imbecile
lum nauseosumq; est, sistitur autem
uenter, n̄s conuenit primo loco ole-
ra cum oleo & garo aliacq; quæ uen-
trem molliant sumere. Post iustum
autem cibi modum aliquid eorum,

O 5 quæ

quæ stomachum roborent, ea sunt mæla, pira, & punica. Ipse autem qui affligitur omnibus seorsum exploratis quod minimè noxium, iucundissimumq; inuenerit eo in quantitate mediocri utatur. 6. de sanit.

56 In febris diaria febris ex diarrhoea, cum os uentriculi imbecillus est, cibumq; respuit periculo uiniri oportet calido & sicco, uel ex oleo in quo absinthium incoctum sit, uel ex nardino madenti ac plurimū expresso, abundeq; calenti cum primum apponetur. Quippe quæ tepida sunt omnia uentriculi firmitudinem dissoluunt. 8. Methodi.

57 Qui appetentiæ deiectione in diarrhoea affligitur, fluente adhuc aluo, si uentriculus intus uritur, ita ut affectus quidam phlegmonæ similis, in eo consistere uideatur, utilis est ceratū frigidum, quod ex meli no conficitur. Omnino autem si appetentiā deiecta sit, uentre non amplius excernente, ex medicamento quod succo, uel carne cotoneorū conficitur,

ficitur unum aut duo cochlearia exhibebis. Ibid.

58 Hyposarcam curamus adhibitis primum, quæ pituitam purgant solutione uentris, deinde quæ uomitu, postremo quæ apophlegmatismo. Purgat enim hoc præcipue capitis humores phlegmaticos. Quod si uniuersum corpus huiusmodi inuasit humiditas uniuerso etiam remedio utemur medicamentis, scilicet incedentibus, & excalfacientibus & ictericisq; in 1. de humorib.

59 Quin Regium morbum ex obstructione inciderunt, absq; febre permanent. Qui uero ex inflammatione omnino febricitant. Quod magno pere lædunt medicamentosa & facultate calida omnia. ut Gentiana Struthion, helenium, costus, aristolochia Polium, Centaurea. Conueniunt autem ictericis ex inflammatione hepatis quæcunq; sanant inflammationes, quemadmodum etiã ijs, qui ex oburatione omnia, quæ strenue extorgerent, etiam si medicamentosam substantiam

stantiam calidamq; facultatem. Si uero obstructio simul & inflammatio coeant laxantibus simulq; extergentibus opus erit. 9. de comp. secundū loca.

60 Ictericos quacuncq; licet ratione purgare enitendum est, siue solutione uentris, siue momitu, siue sanguinis ē naribus effluxu, siue urinæ emissionē, dū purgetur, eōdem pertinebit. 1. de humorib.

61 Qui pro ruente ad cutem bilioso humore icterici fiunt, balneis portabilium aquarum, & olei discussorij astrictu omnium rarefacientium cutem facile curantur. Huiusmodi sunt anethinum oleum, chamæmelinum, atq; cicinum. Posthec etiam unguenta Gleucinum comagenum uinum, atq; amaracinum. Alię confectiones priuatim ictericæ dictæ, ad eos qui obstructione uasorum iuxta hepar, aut inflammatione laborant, omnes pertinent. 9. de comp. secundū loca.

62 Omnis humor similibus sui sibi coloribus admotis facilius purgatur,

tur, ut icterus citrinis, quod bonum est. At reiectio sanguinis purpureo colore magis mouetur, quod est perniciosum. 2. de humorib.

63 Hepatis scirrhum initio quidē sanauimus, inueteratum autem, neque ipse potui sanare, neq; alium uidi qui posset. Quippe omnibus ita affectis aqua inter cutē, denuò subsequitur, nec uerò fert hoc uiscus fortia medicamenta, ut splen. Quare si sit induratum augere oportet, ea quę ratione inflammationis illius apponuntur in mistura emollientium adhibita etiam congruente uictus ratione, unā cum potionibus dissipantibus & abstergentibus, eum qui in uiscere continetur humorem, & aliquid eorum quę urinam cieant. 2. ad Glau.

64 Ex splenis etiam scirrholo affectū proficisci potest hydrops, ex eo enim hepar, ex hepate reliqua inficiuntur. 6. de locis aff.

65 Emplastrum ad spleneticos, & hydropicos conueniens, quod etiam
Ischiæ

Ischiadicos liberauit conser. Gal. refert. Picis aridæ lib. iij. Cerae, resinæ pinus, ammoniaci thymiatnatis, nistri rubri, baccarum lauri aridarū sing. lib. ij. adipis laurini lib. i. iridos lib. ij. canchrios unc. xvij. farinae foenigræci pollinis, radicis chamæleonis nigrae tenuissime tritæ sing. sextarium unum, cumini tenuissime triti sesquiseptarium, passi sextarium .i. confecto utitor. 9. de comp. secundum loca.

66 Si iecur obstructum sit succurrendum est ijs, quæ meatus eius aperiant, & in ujs hærentia expédiant, quæ etiam cōcoctionis tarditati conducunt, quorum optima sunt Opymeli, & diatrion pipereon, quod nihil non familiare receperit, adhæc extenuatorius uictus & deambulationum culæ. 6. de sanit.

67 Nos uel si minima suspicio sit iecur uētriculū ue phlegmone tentari absynthium protinus oleo incoquemus, ac eas particulas profundemus. In penuria uerò absynthij inter
initia

initia, uel melinum, uel mastichinū,
uel lentiscinum satisfecerit, quod si
exigua febris sit etiam unguentum
quod ex nardo componitur. 11. Me-
thodi.

68 At si iecur phlegmone infesta-
tur, exilitissimo uictu est opus. Aequē
profecto & si ueter sic laborat qui-
pe munus eorum toti animali est cō-
mune. Adhibenda igitur quæ culpa
uacent, ut in cibis præsana, quæ siue
rosione deterget, ut in pharmacis o-
xymeli aqua mixtum. Nam & puni-
cum malum & cætera, quæ astringūt
dum bilis meatum arctant, ipsam bi-
lem excerni prohibent. 13. Methodi.

69 Vbi iecinoris cauum phlegmo-
ne affligitur, per aluum purgatur, u-
bi uerò gibba, per ea quæ modicè u-
rinas mouent, cuius generis est api-
um. Procedente uerò tempore, u-
bi phlegmone ipsa iam concoquitur
etiam ualentioribus uti licet, asarū &
celtica nardo, & phu, & petroselino,
& c. sery mio & mio: Sicut etiā per uē-
trē uacuare si cauum afficitur, cnico
cibis

cibis admixto, & urticae semine, & mercuriali, & epithymo, & filicula omnibus praeterea, quae alium den-
ciunt. Magisq; in remissionibus tum
his ipsis utendum, tum uero his quae
sunt ualentiora partim in ptissana in-
coctis, partim tunsis & in puluerem
reductis. Exhibenda uero haec sunt
ex ptissana, uel ex aqua. Ego namq;
etiam filiculae aliquid in ptissana, ali-
quando incoxi & nigri ueratri corti-
cem. Etiam clystere uacuare eos con-
ueniet inter initia, uel sale, uel intro,
uel aphronitro aque mulsae admixto
contentis. Intermissionibus uero po-
tissimum si quid scirrhum, ex phleg-
mone relictum est etiam ualentiora
nascentibus. Quippe hyssopum eo
casu aquae incoquimus & oryganum,
& colocyntida, & minus centaureum.
Ibid.

70 Hepatis imbecillitas medica-
mentis aperientibus, & mediocriter
extergentibus, qualis est therebinti-
na, quae uenarum angustos meatus
extergit expurgatq; curanda est, ne ex-
obtu-

obturatione putrescāt. Hepatica autem nulla uehementer refrigerantia esse oportebit. 8. de comp. secundum loca.

71 Chicorium & seris inter genera ciborum ascribuntur. Facultas autem eorum est sub frigida & sub amara ac mediocriter astringēs, quarum qualitatū ratione, calidis hepatis intemperantijs summē conueniunt. Refrigerant enim moderatē & præterea firmitudinem adferunt uisceri, sed nec frigidam eius intemperiem magnoperē lædūt, quemadmodum, quæ frigida sola amaritudinis & astrictionis omnis expertē sunt prædicta. Quod si mellis aliquid admisceatur per urinas etiam humores aquosos probissime eliciunt. Ibid.

72 Miscenda sunt hisce affectibus cum discutientibus etiam mollientia pharmaca, quæ præparent indurata corpora aptaq; ijs excipiendis efficiant. Cum enim hepar sit corpus humidum natura, multo magis cæteris etiā partib. emolliētib. indiget. Ibid.

P.

73 Se

73 Serum lactis cum sit amaritudinis gratæ præ cæteris hepar extergere, & aperire eius meatus potest maximè liue calfactione, aut refrigeratione nimia. Ibid.

74 Medicamenta quæ mordent, & erodunt phlegmonas, quæ in cauo hepatis sunt, magis irritant. Quippe ijs quæ in gibbis eius consistunt mutata iam ueniunt, ea quæ assumpta sunt, ita ut nec quæ astringentia sunt similiter adhuc astringant, nec quæ mordens est similiter adhuc mordeat, nec quod ob lentorem in angustis uasis hærebat, similiter etiam nūc maneat lentum. Propterea etiam illis aromatica adijciuntur. 13. Methodi.

75 In liene phlegmone affecto curando si uel æger ex ijs sit, qui atræ bilis excrementum naturaliter congerant, uel etiam eo tempore succus, is in eo abundet necesse est astringentia reliquis admisceas, quo uisceris robur custodias. Sin nullum omnino sit atræ bilis excrementum, aut omni
no a-

nō astringendo non, aut quā par-
cissimē. . . . eiusdem.

76 Si in liene scirrhusa duritie
phlegmone sit propter humoris quē
continet, uel crassitudinem, uel len-
torem, nulla magis cataplasmata, q̃
quæ ex oxymelite, & absynthio, &
cappari sūt, illi sunt idonea. Parcius
uero ad pectus, quā ad iecur ac uē-
triculum est astringentibus utendū.
Ibid.

77 Ad scirrhosos affectus lienis
nullum uehemēter excalfaciens sic-
cans uē medicamen est aptum, sed
ea tantum quæ cum molliendo dige-
rere etiam commodē possunt. Cuius-
modi sunt tum ceruina medulla, tum
uitulina, tum seuum hircinū, & tau-
rinum, & leoninum. ad hæc ammo-
niacum thymiana & Bdellium uē
trunq; ultimo Methodi.

78 Excremēta corrupta lienis nō
nisi per inferiora purgantur, neq; e-
nim ad renes ipsa transmittere po-
test ob imbecillitatem, propterea
cum phlegmone afficitur uentrem

P 2 solue

soluere solemus. 12. Methodi.

79 Pleuritides lateralesq̃ morbos attenuantibus pharmacis & cataplasmatibus, & uentris solutione purgamus. Pristinam autem non damus praesertim in uigore morbi ne forte, crisis impediatur. 1. de morb. acut.

80 Cataplasmata lateribus lana molli, seu linteolo complicato, aut quocumque alio similiter molli applicanda sunt ne costas contactu laedant. 2. eiusdem.

81 Scirrhus affectui si ita durus sit ut nil expuretur, conferet multum suffumigatio cataplasmatibus humidis. Ibid.

81 Apostemata quocumque ex humore sint orta, siue ex bili, siue ex melancholia, siue ex phlegmate non sunt attenuantibus curanda, nec si ex sanguine quidem in lateribus concreuerint, potissimum ubi calidior fuerit aeris repestas, aut ubi bilis in corpore damnabitur. Sanguis enim in bilem facilius tum mutatur. quod ex eo uidere est, quod qui reieciunt sanguinem

guinem continuò cholericum quid expuant. 2. de humorib.

83 Omnia quæ magnis pleuritidibus accidunt, respondent symptomatibus partis nervosæ septi transversæ, tum quòd succingens costas membranæ multis nervis prædita sit, tum quòd adhæreat septo transversio membranisq; thoracem intersepiantibus per quas ad quos continuatur. 4. de præcog. expulsibus.

83 In ijs uerò abscessibus, qui in alta corpore constiterunt ac potissimū in uisceribus, medicamenta quæ ex aromatis componuntur maxime sunt, utilia utpote quorum uis collectum humorem, tum in habitum resoluat, tum digerat. Sunt profectò & alia eius generis medicamenta quorum laudatissima sunt, tū antidorus, quæ ex uiperis componitur (theriacā uocant) tum qua Athanasia uocatur, tū Ambrosia: atq; hæc quidē sumptuosa. Viliorum sanè optimum est nostrum quod ex calamynthe cretica est compositum. ultimo Methodi.

P 3

84 Com-

84 Commune quidem est abscessibus & pulmonis obstructionibus, ut absumatur redundantia humoris affectionē gignentis. Proprium uerò uiscidis quidem pulmonis humoribus obstruentibus, ut per attenuantia & extergentia pharmaca curētur, ac dissecentur. Tumoribus uerò ut per attenuantia, & siccantia conficiantur, quę curatio omnibus quidem abscessibus in alto consistentibus cōmunis est. Vini itaq; potus utrisque competit, sed parcius abscessibus, q̄ obstructionib. esse debet. 7. de cōp. med. secundū loca.

Addit Moyses.

Attenuantia quę calfaciunt siccantq; primo gradu (ut Galenus docet) sunt hæc Eupatorium, iuncus, rotundus, tamariscus, & pistacea. Secundo uerò hæc, cardamomus, balsam, aristolochia iris, cucumer, rhabarbarum, asphodelcis & mastiche. Tercio gentiana, ebulus, daucus, cinnamomum, hypericon, histopus, nux romana, ammoniacum, malua, sambucus,

bucus, pimpinella, serpyllum, mentha, ruta, cassia lignea, sagapenum, melanthium & dracuntium. Recentiores autem sæpius utuntur Serico Silphio & Calamintha. Atq; hæc sũt trigintaquinq; tenuiter siccantia & calfacientia medicamenta, quibus uel simplicibus, uel compositis, pro ratione ulceris, cum opus fuerit, uti possis. Acetum inter attenuantia & siccantia numerantur, sed refrigerat simul cum calfactione, & adimatum quod mediocriter in utroq; se habet.

85 Vulneribus intestinorum si ab scessu careant facile est ex astringentibus reperire remedium. Vbi uero abscessus accesserit, aut hydrops, aut aliud difficillimè curantur, quod in dies maius malum fiat. In membrana autem hepar musculosq; lateris argente, si quibus alijs partibus sunt sanè hydropes frequentissimæ. in 6. Aphorif.

86 Et si altera ex duobus intestinorum operimentis peritoneo, uel epiplooo lèdatur, ac undiq; uulneres, si

P 4

modo

modo alterum sit integrum ab affe-
ctu liberari potest animal. 5. de usu
partium.

87 Emplastra & cataplasmata à ue-
teribus quidē medicis cœliacis cōpa-
rata, si sæpe usurpēt, cōferūt, sin si mel
aut iterum tantum, postea aliud exhi-
beatur: plus illa detrimenti quàm cō-
modi adferunt, si quidem nil aliud q̃
intestinatorum tensionem adauxerūt.
de Clysteribus.

88 Si dolor intestinatorum cum fe-
bri aliquando incidat, principio qui-
dem si ferat æger fomentum siccum
ex milio adhibendum est. Si ab hoc
non quiescant semen aliquod quod
flatus dissidet in oleo quod tenuium
sit partium coquere, mox per linteū,
quò purum sit oleum colare, dein an-
serinum, aut gallinaceum scuum, nec
salsum, nec admodum uetus in ipso
oleo liquare, & per sedem infundere
oportet. Ac si neq̃ ex hoc remittan-
tur dolores, secundo rursus inñcien-
dum est: adiecta etiamnum castorei,
& papaueris succi, utriusq̃ non am-
plius

plius fabæ magnitudine, olei uerò hemina. 1. 2. Methodi.

89 Lumbricorum tria sunt genera, ascarides breuesq; tenuesq; uermibus terræ similes in extremo longanone. Potissimum reperti, institæ longilatiq; semini cucurbitæ similes in maioribus intestinis nati, & tere-tes longitudine palmares, & plerun-que longiores, serpentibus similes in gracilibus plerunq; intestinis contē-ti. Omnes autem ad uentriculum ela-ti dolores incutiunt. qui curantur a-maris potissimum medicamentis, ut myrrha quæ etiam secūdo ordine cal-facit & exiccat. Brassicæ esculētæ se-men, potum, calamintha, & anchusę quarta species, calida & amara, præ-cipue ad latos idonea est oxybaphi mensura cum nasturtio, & hyssopo epota. 1. in 2. Epid. & 6. de simpli-cibus.

90 Renes si uiribus suis constent, certum humorem pinguem in uenis en sanguine eliciunt, attrahunt & ad uesicam mittunt, à qua postea cum

P 5

urina

urina eijcitur. Si uerò imbecilles sint ut attrahere nequeant, tum alterum horum necesse est, ut aut à uenis ad uentriculum, reijciatur, aut per totū corpus fundatur fiatq; hydrops. 2. de caus. symptomatum.

91 Retenta longo tempore urina, uel ob somnum diuturnum, uel ob negocia urgentia, ipsa uesica extenditur, atque urina suppremitur contractrice facultate propter tensionem lesa. Præterea ob sanguinis grunium, & pus crassiusculum interdum retinetur: in pueris etiā quos lapis in uesica cruciat, uidimus sæpenuerò eā supprimi. Eos itaq; resupino figurato corpore adeò cōcussimus ut à metu lapidis dimoueretur. 6. de locis affectis.

92 Sedis uitia ob ipsius partis sensum exquisitissimum & ob crebrum per ipsam excrementorum decursum ægrè, curationem recipiunt. Aptissima autem ipsis sunt medicamenta, quæ absq; aspredine astringunt, qualia sunt maximè, quæ ex metallicis
neq;

neq; acria, neq; acerba existunt, hæc siquidem lota citra mordacitatem (id quod requiritur) operatur. 9. de cōp. secundum loca.

93 Ex melācholico sanguine quatuor affectuum genera existunt, scabies & lepra in cute. In carne uerò & uenis cācer atq; elephas, ille quidem ex ipsi9 sanguinis copia, istius hic uerò ex eodem tēpore procedēte: quo corpus grauiter olet, turpeq; atq; deformatum uidetur, interdumq; exulceratum. Gal. de tumorib.

94 Iuncus seu pituita nonnunquā tanta copia exuberat, ut cum urina reddatur, ac sæpe ulcera in articulis nascantur, ijs quibus hydropici afficiunt. Similia ea uerò nonnullos medicos in errorem aperiēdi ulceris induxerunt, saniem subesse cogitātes, quod tamen sola caro pituitosa non esse, ita arguere poterat. 8. in 6. Epid.

95 Tabis species sunt tres, tabes tabida, quæ & tabida febris, & senecta ex morbo tabifica dicitur, tabes torrida, & tabes syncopalis. quibus
com.

commune est, ut humectentur ob cōmunem siccitatem. Propriū uerò senectæ quidē ex morbo cal fieri, quæ febribus ob immodicam intempestiuamq̃ refrigerationem, in eum affectum transeuntibus cor frigidius factum est, quàm ratio nature postulet. Torridæ uerò, refrigerari, ob habitū siccio rem à calore & ardentissimis febribus effectum, & Syncopali, id est, deliquio animi coniuncta si etiam nū fiat, ita ut humiditas solidis partibus absumatur miscellanea curatione curari balneo tempestiuo, post concoctionem ministratio ex frigida pota, & uictu in mediocritate consistente. Tribus autem illis marcoribus conuenit hæc alimentorum ratio, lac ex mamma muliebri exuctum, aut si nequit ex asina, uel dum adhuc calet ne aëri fuit expositum. Prissana Alica, acetato tamen condita ut facilius distribuantur. Mel autem & uinum torridis fugiendum. Syncope autem affectus coctum mel uel solum, uel alijs intermixtum cibis concedetur, senili
 tabi

tabi utrunq; erit optimum remediū.
Gal. de tabe.

96 Obesitatem quæ multum & actiones impedit & corpus deturpat corrigit, & extenuat attenuandi uictus ratio, quæ incidentibus & dissectantibus. omnis constat, aceto allijs, cepis, piscibus falsis, carnibus subtilissimis, balneorum usu calidorum, item exercitijs fortibus, sitis, patientia diuturna & marina, atq; calidorum locorum conuersatione, sed maximè marina, est enim is aër acerrimus multumq; humores resoluens. Galen. de attenuict. ratione.

97 Medicamenta podagricis propinata, si humores quidē fluere prohibeant, at partes affectas non purgant, sunt prorsus non solum inutilia, sed perniciofa, eo quod sanguinē retinent, à quo superioribus partibus collecto suffocationes fiunt, & graues conuulsiones, idē saepe experientia probatum est. Consulo igitur ut potius theriacā bibant à qua multos restitutos sanitati uidimus. de Ther

Theriaca ad Pisonem.

98 Redundantes sanguinis copia partes, scopum curationis habent euacuationem, id est, detractionem, quando quidem morbus est immodica repletio. Sed primum intendendum est ut retrocedat, à parte affecta humor quod fiet in primis uniuersi corporis uacuatione. deinde, eius quod influit ad contraria loca retractione. Quod si hac uia non retrocesserit sit humor effusus ad intermedia spacia & uacua uenarum per locum affectum uacuandus est, imponentibus nobis particulis superiacentibus ea, quæ repellendi uim habeant, maximè uerò ea quæ in spatijs delitescant scarificationum auxilia & medicamentorum discutientium uacuabis. At quæ descutientia omnia uires calidas habent, effectus autem huius temperaturæ est mordere ubi caliditatis modum excesserint, cauenda ex eis sunt uehementissimè calida ac tum præsertim cum patiens locus in superficie constiterit. Quod igitur mediocrem caliditatem obtinet

net

net in hisce dolorem sedat, ac multò magis si humidum fuerit. Gal. in arte medica.

99 Si in his fluxionibus summæ partes omni noxa caruerint, id uerò quod euacuari oportet, in penitioribus partibus hæreat, intendendus atque augendus discutientis medicamenti calor, quum dubitandum sit ne priusquam profundas partis attigerit uires emittat. Hæc duo autem simul inuitabunt ad calidorum pariter atq; acrium usum summarum partium tolerantia, & profundarum necessitas. Ibid.

100 Herpetes exedentes quantū ad totius corporis uacuationem attinet, ut erysipela curare oportet, nē pe per uenæ sectionem considerata ætate, anni tempore, uiribus, & consuetudine. Non tamen ferunt ea medicamenta, quæ præter id quod refrigerant humectare sunt apta, sed sola refrigerantia, quæ maxime exiccare possunt. Quare superimponere ipsis oportet ab initio quidem ex uite capreolos

preolos & folia rubi, & rubi camini
& plantaginis. Posthac lentem ad-
iungere, aliquando mel, aut hordea-
ceam farinam, aut cataplasma quod
influit, repellens, & quod continet
exiccans (omne enim ulcus exiccari
poscit) quod fiet ex corticibus puni-
corum malorum in uino decoctis &
esu & farina ordeï siue semperuiuo.
2. ad Glauco.

101 Herpetas uerò qui summam
rurem tantum exulcerat nisi diu per-
durauerint, nullo horum inungere o-
portet, quæ uehementer exiccant. Ve-
rùm ijs sufficiunt, quæ glaucij uim ha-
bent. Quæ quidem aqua diluenda e-
runt, uel aceto, si nisi aqua profecerint.
Quod si etiam solani succo intinxe-
ris, uel arnoglossi plus etiam conferes.
Ibid.

102 In Alexandria Aegypti pluri-
mi ob crassam uictus rationem ac re-
gionis feruorem elephantiasis corri-
piuntur. At in Germania & Mysia ra-
rissim⁹ hic morbus. Et apud Scythas
lactis potatores nunquam ferè appa-
ruit. Ibid.

103 Ele

103 Elephantiasim & ulcus melancholicum cancrum initio morbi sæpe curauimus medicamentis atram bilem educantibus & uictus optimè constituta ratione, succum pti sanæ, abundanter exhibentes & serū lactis, ex oleribus autem attriplicem maluam & blitum, itemq; cucurbitas si occasio feret, & pisces saxatiles auesq; omnis generis præter palustres. Ibid.

104 Qui uenere diu usi sunt & statim uti desinunt, ijs frigescere corpora solent & ad motum grauiora fieri. Vidimus etiam timidiores inde factos memoriaq; lapsos & pesti magis obnoxios, sicuti sunt melancholici. Quod ex spermatis recentis nidorofo uapore fieri credibile est. 6. de locis affect.

105 Condensaram cutem præcipuè aperit ac emollit anethinum oleum, quemadmodum lassitudines acriorum & mali punici oleum. 3. de sanit.

106 Palpitatio cordis, quanti hu-
more

more cor ipsum mouetur, plurimis per integram ualitudinem accidere est uisa: quos omnes detractio sanguinis iuuat, unà cum extenuante uictus & medicinæ ratione. Eorum tamen qui sic affecti sunt nullus ad se neceutem peruenit. 5. de locis aff.

107 Quæ extrinsecus profluenti particulae admoventur, tum adstringentia, tum citra astrictionem frigida, hæc ipse ut plerique medicorum non ubique probo. Sanguinem enim ita intro compelli, & uenam replere uideri contra atque decet. Siquidem uidimus quosdam eorum, qui sanguinem ex pulmonibus reijcerent ex thorace, refrigerando manifestè læsos: & qui sanguinem uomuerunt nonnullos postquam uenter foris est refrigeratus, infirmiores fuisse, & quibus è naribus sanguis profluxit ex refrigeratione capitis deterius habuisse. Ergo nec animo, nec sine discrimine, nec omni tempore loca circa particulam, unde sanguis profluit posita refrigeranda sualem. Imò postquam

in

In alia prius auerteris, ut exempli gratia in naso, ut sanguis missione sis usus, uel artuum frictione deuinctio- neq, uel ad præcordia defixis cucurbitis: ne sic quidem ad caput & fronti refrigerantibus utendum ilico, sed prius est ad contraria reuellendum, utiq, affixa in summa ceruice cucurbita. 5. Methodi.

108 Nerui contusi cataplasmate athletarum, quod ex oxymelite & fabacea farina conficitur, curantur. Idq, plane salutare est medicamentum. At si dolor una cum contusione uexat, etiam picem liquidam immiscere ac bene coquere, tum calens medicamentum imponere oportet. 6. Methodi.

109 Qui syncope ob spirituum redundantiam laborat, quod corporibus consent laxioribus, cibis lente aperientibus, quales sunt panis, far, fructusq, omnes astringentes, quiq, cito corrumpi non possint reficiuntur. Item uitellj ouorum & testes galinacei. Omnium autem prima sit cur

Q. 2

re, ut

re, ut cutis densetur crassetur ac firmetur. §. eiusdem.

110 Ulcere in carne iam facto, si reliquum corpus sanum sit, mitigare dolorem oportet tetrapharmaco in linteo loco imposito (liquatur autem id oleo potissimum rosaceo, uel si id non sit relaxanti aliquo) toto uero membro lapso lanæ ex calente oleo imbuto circumdato. Sin plethoricū sit corpus, uel malo succo redundet, curatione per ea quæ colent fluxionem ad membrum citante, nec alia sanantur. Quare sanguinem mittere necesse est, idcūq; aut uena incisa, aut membris ijs, quæ læsa non sunt scarificatis. Manu enim laborante scarificabis crura, altero autem crurum male habente, reliquum. Sæpe tamē uel ipso, qui curant segniore, uel eo qui laborat præ mollitie uacuationē non admittente glandularum phlegmone maior efficitur, sic ut ad suppurationem perueniat. 3. Methodi.

111 Vbi ex animalis punctum mor-
sue dolor incidit duplex sanandi ratio do-

tio doloris est, uel uirus ipsum uacuando, uel quod dolorem excitat alterando. Vacuabis quidem eorum medicaminum ope, quæ uehementer attrahunt. Alterabis autem ijs, quæ sunt contraria, idque uel qualitatibus, uel tota substantia. Item uacuabunt tum excafactoria omnia, tum quæ citra calfactionem uehementer trahunt, ueluti & cucurbitulæ, & cornua quedam quibus nonnulli cucurbitularum uice utuntur. Sunt autem & qui ore suo uirus extrahunt ægre, uidelicet particulæ admoti, ipsasque complexi. Ibid.

112 Intendonibus & ligamentis cum scirrhusa fuerint, satius est ei curationi quam per mollietia molimine, incidentium aliquid admiscere ex quorum numero acetum, uel imprimis est. Eius enim uis, modo eoque modice & debito tempore utatur, salutaris est eiusmodi affectibus, ceu crassos humores diffecans ac resoluens. Sin uel immodice, uel in tempore non idoneo, tenuiores partes

Q 3 uiolen-

violenter absumens, id quod reliquū est lapidescere sinit. Sed & si quis eo diutius utatur substantiam ipsam nervorum delibauerit. Ob id igitur nec sæpè, nec inter initia, nec longo tempore medicamentis, quæ ex aceto componuntur ad ligamenta & tendones utendum erit, ultimò Methodi.

113 Materiæ canceri copia ex ustis elotisq; metallicis habebitur. Quippe quæ ex his componuntur, unà cū purgationibus ad sanandos incipientes cancrios magnam uim habent. maiores uerò sat fuerit si his prohibeantur augeri. Ibid.

114 Articularis morbi curatio ex ordienda est ab euacuatione affligentis humoris: siquidem ex æquo humores redundant, in corpore uenæ sectione omnium primo administrata. Deīn purgatione quibus accedit pharmacorum conueniens atq; opportunus usus in pedibus quidem & manibus eorum, quæ repellendi ac reprimendi uim habent. In ischijs uerò, id est, coxendicibus non item reprimen-

primentibus, sed mitigantibus. nam cum ea iunctura in alto corpore consistat si reprimatur sanguis ex uicinis & circumpositis uasis à musculis ad illam truditur, repleturq; multò magis quam antè. Mitigantibus igitur in principio uti melius est, quæ nec refrigerent multum, nec excalfaciât uehemēter. Calore enim alliciuntur humores potiusquā retineantur. 10. de compos. secundum loca.

115 Ischiadicis auxiliantur uomitus magis, quàm uentris solutiones, ut qui humores inferius repentēs euellant. Quocirca mouendi uomitus principio ab accepto cibo: postea uerò etiam per medicamenta uomitoria, initio à mediocrioribus factò. In quibus autem uehemens humorum densatio, quæ ægrè dissolui possit, à medicis intēpestiuè acriora phar maca adhibentibus facta est: ñs affixa cucurbita ualdè auxiliabitur, & purgatio p clysmos efficaciores, qualis est qui ex colocynthide constat. l. bide.

Q 4

Ex

Ex Themio in Isagoge.

116 Ischiada seu coxindicem inue-
teratam sic curato, ℞. nucis Cupressi
drach. duas, foliorum cupressi drach.
unam, acatiæ recētis unc. duas, misce
cum pice liquata, & calida linteolo
inuoluta ieiuno ægro, ac prius laua-
to imposito. laceatq; supinus donec
siccatum sit emplastrum, & diebus
quadraginta sic ligetur, ac bibat quo-
tidie ex aqua myrrhi, & sacchari, nu-
cis cupressi, & eiusdem foliorum tri-
torum, illius quidem duas partes, hu-
ius uerò mediam utriusq; ad drach-
mas duas.

Ex eodem.

117 Apophlegmatismus seu gar-
garismus ex decocto frondium chry-
someti, maximè utilis amygdalæ, &
gutturis inflātionibus. Resoluit
liquidem quicquid ori carni dentiū,
uel gingiuis & uulæ ex ijs affectib.
incommodatum est.

118 In fractis ossibus curandis,
principio quidem tenuissimè, ciban-
dum & uenam incidere. Interdū o-
porte

portet & per uentrem superuacua expellere. At quo tempore callus, gignitur nutriendum corpus est cibis optimi succi, & qui multum nutrant ex quibus prouenire succus consuevit, non solum bonum, sed etiam tenax qualis desideratur ad calli generationem. Item medicamenta adhibenda, quæ collos moueant ac augeant qualia sunt, emplasticotera & modici ex calfacientia. 6. Methodi.

119 In particulis quæ circa artus sunt, cum in ijs phlegmone orietur, nempe pedibus & manibus sat fuerit etiam spongiam, uel ex frigida aqua, cui paulum aceti sit ad mixtum, uel aqua sola imponere sicut etiam ex uino aliquo austero. In iecinore uerò si phlegmone laborare cæperit, nemo compos rationis his utetur. Sed si mala præcipuè cotonea uino incoquens cataplasma ex eo præparaueris, ne id quidem admovebis frigidum, ueluti nec oleum, ut dictum est præparatum, uel oculis, uel oris partibus sicubi hæc phlegmone tentari cœperint

Q 5

rinc

250 RABI MOYSIS

rint, auri uerò etiam si acetū cum ro-
faceo infundas, nil offendas. At non
est hoc oculis utilis. Ibid.

Moyſes.


120 Aristoteles sub finē 9. de par-
tibus animalium aphorismum quen-
dam maximè medicum edidit, cuius
tamen nusquam Galenum meminisse
scio. Propterea libuit huc subiicere.
Spasmus (inquit) etiam infantibus
accidit non ex uitio lactis, sed ex ni-
mia eius, potissimum si
si pinguis est,
copia.

DE

APHORISMI.
DE FEBRIBVS.
SECTIO IX.

294

I.



Iborum concoctio siue
ea in iecinore, siue in uē
triculo fiat improspere
febres extendit ac succi
uitio exacerbat. Quō
magis in omni febre, ciborum con
coctioni maximē prospicere oport
tet. 1. 1. Methodi.

2 In febris continentibus dili
genter discernendum, quantum &
quando frigida aqua sit exhibenda.
Incommoda enim hæc sequuntur si
intempestiue immodiceue fuerit ex
hibita, quōd lentos crassosq; humo
res, siue hi obstructiones, siue putre
dinem, siue phlegmonem, siue qua
lis erysipelas, aut scirrhus, aut œde
ma est affectum creauerint attenuari,
digeriq; prohibent. Sed cum conco
ctionis humorum in ijs, notas uide
ris. de quibus in lib. de crisibus dixi
mus: audacter frigidam dabis, maio
riq; cū fiducia si frigida æger assue
tus

tus

tus fuit. Porro erysipelas quod uerū erysipelas sit, non alio medicamento sanatur. 9. Methodi.

3 Februm quas putredo accendit eiusmodi sunt differentiæ: una ex eo quod causæ ipsius putredinis iam adsunt, uel non adsunt. altera quod per totum animal diffusa putredo sit, aut eius aliquam partem occupet. Tertia quatenus cū phlegmone est, aut citra hanc. Causa putredinis quæ est transpirationis prohibitio, cum uarijs generibus orta sit, nempe densitatis exiguis meatibus & constructis corporibus, & humoribus tum abundantia, tum crassitudine, tum lentitia sua obstruentibus, singulas harum affectionum per contraria curari oportet. Densitatem per ea quæ rarefaciunt. Constrictionem per ea quæ fundunt, abundantiam per ea quæ uacuant, crassitudo per ea dissecant lentoribus, quæ detergent. Ac si quidem totum corpus dictorum iam singula occuparint, etiam toti per contraria succurrendum. 11. Methodi.

4 Si

4 Si certam febricitantium naturę
noticiam haberemus, non (arbitror)
dubitaremus eorum aliquos assidue
in aquis frigidis citra balneum laua-
re. Nam quod sint quidam, qui eam
desiderent, uel ex his, quos iuuat con-
stare potest, ut quibus frigida lauatio
haudquaquam cōtulisset, nisi eo tē-
pore opportuno ad eam affectum
habuissent. Verum quoniam exacta
nobis affectuum cognitio non est, ac
maxima ex errore impedit noxa, u-
trique eiusmodi pręsidia recusamus po-
tissimum in hecticis febribus. 10. Me-
thodi.

5 Si quando cataplasmate, uel em-
plastro dolorem mitigare febricitan-
tis, uel uenam secare, uel uacuare ne-
cesse est, nec aliter fieri possit, neque
pulsanā illi, neque aquam præbe-
bis antequam feceris, quę sunt ante
dicta. nempe ante uacuationem, &c.
In. 1. de morb. acutis.

6 Si corpus febricitantis iuuenili
adhuc robore & carnis firmitate con-
stitit, nec sit uenter inflammatus, &
laua;

lauari aqua frigida, & mundari ac nātare concedimus, & consulimus. 10. Methodi.

7 Periodorum febrilium uarietatis causa est humoris quidem putridi qualitas, & uirtutis expultricis ac meatuum in quibus continetur affectus. Siquidem humor: crassus ac uiscidus lōgiori per se mora expellitur quā tenuis, & facultas imbecilla tardius mouet quā ualida, & contrāctio angustiaq; meatuum diutius retinet, quā amplitudo ac collatio.

Cū igitur hæ motus causæ coiuerint crassitudo humoris, facultatis expultr. imbecillitas, & meatuum angustia, periodum morbi diuturniorē efficit necessariō. At contrariōrum contraria est ratio. 2. de febrib.

8 Vbi simul ipsa febre sentitur circa os uentriculi anxietas, morsus, & imbecillitas, prius sanē uacuandi humores non sunt, quā os ipsum uentriculi corroboretur, etiam si cruditate, aut cacochymia æger ipse laboret. Est autem consuetudo nō parui momenti

menti ad euacuationis indicationem. Quidam enim nunquam prius fuere uacuatī, alij contra & multis cibis sunt assueti, & euacuatī sæpe iam fuerunt: hos audacter uacuare oportebit si reliqua quidem persuaferint.
1. ad Glauco.

9 Febris putridæ generatio est humorum quorundam in uētriculo aut uenis corruptorum ad cordis concua, cum uapore elatio. Ephimere uerò inguium inflammatio, & aliarum enim carnis partium circum corporales cæteris accendentium, minimè tamen cor ipsum subeuntium. 2. de febribus.

10 Extrema ut aures, pedes, manus, nares, frigida, sæpe in febre acuta euadunt. Quod ubi accidit, aut uiscera plegmone afficit, oportet aut uentrem graui dolore premi, aut animo linqui & syncope teneri, aut calorem imminutum ac suffocatum nimia humorum repletionē. in 7. Aphorism.

12 Extrema illa initio paroxysmi
refri-

refrigerata, non significant mortem, sed calorem naturæ nitro compelli. In 2. Prognosticôn, aliquando eundem extingui si febris sit acuta. 3. Epid. Sudor aut frigidus in febre acuta mortem. In lib. de sig. mortis.

12 Putredo uel æqualiter in omnibus subsistit uasis, maximeq; principalibus (ea porro sunt inter alas & inguina) uel una quapiam partícula, quæ uel phlegmonem in se habet, uel etiam citra phlegmonem, ueluti in foco quodam principium febris in se continet.

13 Febricitare autē incipiunt nonnulli ubi magnam crudorum succorum copiam, unâ cum oris uentriculi (quod stomachum uocant) offensione, uel ex cruditatibus, uel alia quapiam occasione cōgesserunt. His & præcordia inflata, & totum corpus ampliore mole, quâ pro naturæ modo cernitur. Tum color bis ad albidius quàm pro naturali habitu, & aqua intercute laborantium magis simile est, mutatus nonnullis etiam ad nigri-

nigridius, aut liuidius, quos quidem medici plumbei palloris appellant. Omnib. pulsus arterię minores sunt, quàm caloris ratione. Pręterea obscuri omninoq; inæquales sæpe ea inæqualitate, quàm (Græci *συσματικῆν* uocant.) Semper uerò ea quę in uno est ictu. Nulli talium sanguis mitti sine maximo despendio potest. Cũ tamen uacuationem desyderent, uerũ nec sanguinis missionẽ, nec purgationem sustinẽt, utpote quos sint his syncope subito adoritur. Propterea remediũ magis idoneum aliud non est, quàm membrorum frictio, principio statim morbi tibiariũ à cruribus supernẽ deorsum. Deinde brachiorum ab humeris usq; atq; superno deorsum donec ad lassitudinem accesserit, eoq; solum tempore intermittens, quo somnus hominem occupauerit ad alimentum & frictio uerior facit. Ergo inuicem mediocriter adhibiti, iuuare se mutuo utiliter poterunt. 1. 2. Methodi.

14 Febrium intermittentium tria
R sunt

sunt genera tertiana, quotidiana & quartana, quarū prima illa ex bili putrefacta nascitur. Quotidiana uerò ex pituita, quartana ex melancholicis humoribus. Intermittunt autem humoribus commotis, & per uniuersum corpus dilapsis ac sensili motu recurrentibus. 2. de febr. b.

15 Continue sunt quibus humor putrefactus delitescit atq; continetur in uenis. Ex his autem quibusdam cum intermittentibus quædā est coniunctio, ijs quidē humor tertio quoque die recurrit, cum tertiana & dicuntur tertianæ continuæ, ijs uerò quæ die intermedia accessionem faciunt, nec intermittunt eum quotidiana, & dicuntur quotidianæ continuæ. Est & tertium genus earū quæ quartanæ accessionum similitudinem habent, & per rarō eueniunt, quartanæ continuæ dicuntur. 2. de febr. b.

16 Febris continua paroxysmo grauis & ad quadragessimū diem, producta inter acutas numeretur. 2. de Crisib.

17 Pu

17 Putridarum febrium maximū indicium est mordacitas, & acrimonia caloris, quæ proinde tactum, atque fumus, nares, & oculos rodere uideatur. Sed in principijs accessionū, quibus calor adhuc intus superfluitates, accendunt statim admota manu percipitur, sed per morā affertur ex pernitioribus & tunc sentitur. Comitatur etiam has febres pulsus initio parvus & uelox. Vbi uerò costiterunt, uelox simul & magnus. i. de febr. b.

18 Pro uarietate humorū in quos conuertitur sanguis febres fiunt sola bonitate, uel malicia differentes. Si igitur calor & uapidosus, & minus insuauis uideatur, à sanguine proficiscitur. Qui uerò molesti rodentes atque mordaces tegenti existunt, consequuntur utramque bilem atram & flauam. At ubi in primo occursum aliquid magis uaporosum, quàm acre se repræsentat manui, sed morā paulatim crescit mordacitas, eaque admodum inæqualis perinde ac si per cribrū excolari uideatur ex pituita pu-

R 2 tredit

tredine oriri talem febrem ne dubites. 2. de febrib.

19 Numerus horarum periodicarum, qui inter duo initia accessionū est medius considerandus est, atq; est typus febrium metiendus. Sic enim dicimus quotidianum typum sortiri horas uigintiquatuor, tertium quadraginta octo, quartanum 72. quintanum nonaginta sex. Quo similiter pacto cæteri perficiuntur, ex horarū 24. multiplicatione. Quod si in quotidiana periodum 8. horarum esse cōtingat, Paroxysmus enim sex erit, & duabus, tres tum quotidianas esse dicēs, siquidem 8. horæ sunt tertia pars periodi phlegmatici. Sic quoq; si 16. horarum paroxysmus fuerit, tres tertianas in egro iudicabis. 16. enim tertia pars est, quadraginta octo horarū. Eodemq; modo si 18. fuerit quatuor quartanas, q̄ 18. sit quarta pars 72. numeri. Gal. de typis, siue circuitibus.

20 Nulla febris pulsum naturalē recipit quamdiu febris est, etiam si tēpore

pore intermissionis, tēpore diu quie-
uerit, atq; huiusmodi fiunt in tertia/
na & quartana. In diaria autem ubi
paroxysmus quieuit, pulsus natura-
lis ad se redit. i. ad Glauco.

21 Quantum in corpore ægrotā-
tium humores mutantur tantum eti-
am accessionum circuitus. Quæcun-
que autem circa uictus rationem er-
rata ab ægrotantibus fiunt ordinem
circuituum peruertunt. Sæpe uerò
ob complicationem circuituum, quæ
à medicis ignorat, id est, ob id quod
non uidetur certam constitutionem
habere febris, uidentur absq; ordine
accessiones ægrotantibus fieri. Ibid.

22 Paroxysmi horam statam an-
teuertentes anticipare dicunt, & ma-
gnitudinem morbū proficiant. Si ue-
rò accessionis initium tardet, omnia-
quæ minuentur symptomata, declina-
tionis morbi indicium erit certissimū
Porro an ipse morbus augeatur, non
ex eo rātum coniecturari licet, quod
accessiones statum tempus anteuer-
tant, sed quod longiores fiunt uehe-
men-

mentiores & maligniores, ac cū multis prauisq̃ symptomatis accidunt. Item cū ipsum declinationis tempus erit breue, nec omninò facile, nec symptomatū accessionis expers. 1. de Crylib.

23 Signa tertianæ simplicis, quæ ex ægrotantis habitu cognoscuntur hæc sunt. 1. Rigor uehemens statim initio, quò ueluti aculeis pungi cutim sentit æger. 2. Sitis calorq̃ uehemens & breuis. 3. Pulsus item toto paroxysmo ingens. 4. Summus accessionis uigor, non ita multò post principium accedens. 5. Caloris æqualiter in uniuersum corpus dissipatio. 6. Caloris item uehementis initio manui tangenti, sub finē uerò sensim suppressi perceptio. 7. Vaporis calidi aqua pota ē corpore exhalatio. 8. Vomitus flauę bilis & fluxus uentris cholericus, urinaq̃ in qua bilis superet. Tria enim hæc plerunque simul fiunt. 9. Sudor uaporosus calidus & æqualis. 10. Accessionis longitudo productior. 12. horas non
exce

excedens. 11. Quies febris post sudorem. Ibid.

24 Quartanæ autem accessionis symptomata sunt. 1. Eximia quædam pulsum ad raritatem ac tarditatem conuersio. 2. Si fiat autumno, aut tempore frigidam & siccam inaequalemque temperaturam sortito.

3. Si regio talium febrium sit generatrix, aut ægrotantis natura atræ bilis obnoxia, talisque uictus ratio antecesserit, quæ humorem hunc aggregauerit. 4. Si eo tempore quartanæ febres populariter fiant. 5. Si homo lienus sit, uel febres erraticas passus.

6. Si augmentum & status plurimum contraria fuerint. 7. Tenuisque & albæ aquosæque urinæ reddantur. Ibid.

25 Sed quotidianæ sunt, non primo statim die cum rigore inuadere, sed progressu temporis, idque refrigerationes extremorum, magis quam rigores. 2. Inæqualis pulsus cum primis accessiones fiunt. 3. Non deuri, nec denuotare corpora & pallia iactare cogi. 4. Non multum ac fre-

R 4

quens

quenter respirare, ac ueluti flāma ex ore et flare frigidumq; potum expectere. 5. Minimē sitire. 6. Urinas in

primis diebus tales quales quartanis incipiētes mingere albas aquosasq;.

7. Non sudare primis diebus, sed progrediente tempore hoc accidere.

8. Natura humidior uitaq; ociosa & plena crapulis, qualis pueris assidue fit. 9. Oris uentriculi mala affectio

& simul hepatis. 10. Cruditates plurimæ antegressæ, coquendi mora & acidi ructus. 11. Præcordia præter

naturalem habitū, cum febrile incipiunt intimescentia. 12. Color cū

pallore albus. 13. Hybernū tempus. 14. Status temporis humidus.

15. Accessionum principium circa uesperam. Ibid.

26. Continua ardens exquisita omnia seruat eadem cum tertiana exquisita, præterquam quod non inuadit cum rigore, neq; ad infebricitationem desinit, & quotidiana ardens cū quotidiana exquisita, nisi quod ad infebricitationem, non desinit. Sic & quar

quartana continua cum quartana intermittente, nisi quod accedit quarto quoque die sine intermissione, nulla interpolita febris quiete, nec rigor in ea antecedit, nec sedit sudor. Ibid.

27 Cum ipse sanguis secundum naturam habens, trusus in locum fluxioni obnoxium putruerit: hic quidem affectus inflammatio est, si atræ quidem bili permistus dura, si amaræ erysipelatibus similis: si pituitæ, inflata. Simplex uero febris ex ipsa inflammatione accenditur, maximè ephemeris similis, quæ ex inflammationibus accidunt, nam & ipsa in generis inflammatio ex optimo sanguine fit. Liquet autem quod cum hic putrescere cœperit non amplius bonus, sed ad amaræ bilis naturam transit, unde illud triplex uniuersum simplicium febrium genus, biliosum, pituitosum, & melancholicum. eodem lib.

28 In tertianis cū apparuerint concoctionis signa de absynthio statim aliquid dabis: est enim medicamentum præ cæteris laudatum curandis

R 5 sto

stomachi ex eossione affectib. si præsertim, ex ipsius coma quantum sit satis melicrato intinxeris. i. ad Glauc.

29 Tertianæ cum uehementi, rigore accedit, quartanam uerò minimè uehementi uidimus. Torpet enim in ea rigendi uis, sed si diu teneat grauior molestiorq; efficit præter id quod nec statim ab initio hæc febris solet inuadere, sed alijs quæ antecesserint, subsequi, & maximè errabundis febrib. superuenire. Quotidiana uerò rarò absq; læsione oris uētriculi, sicuti rursus quartana absq; splenis & tertiana, absque iecinoris affectione. Ibid.

30 Tertianæ simplicis & exquisita indicatio ad maximum septem circuitibus completur, ex intermittentibus autem breuissima mitissimaq; est ipsa. Quod si sit spuria non item mitis erit, uidi enim hanc in puero quodam ab autumnus ad Ver productā. ad Glauc.

31 Rigoris ante statum non desinētis duplex est ratio, aut enim in accessio,

cessione febris cernitur, ut si paulò ante statum seu uigorē ipsius accessions desierit. Cuiusmodi est, qui ex uitrea illa pituita frigida oritur: aut in morbo uniuerso, ut si non ante statū totius morbi desinat, cuiusmodi in quartana accidit. Eius enim summus uigor nō nisi cum diminui rigor cœperit agnoscit. In tertiana uerò principio quidem uehemens cū fuerit, tamen ante statum quiescit. i, in 6. Epid.

32 Simplicem singulorū morborum affectum non solum per se, sed etiam per ea quæ accidunt cognoscere expedit, ueluti in ea febre, quæ tertiana dicuntur, non hoc tantum aduertat si tertio quoq; die fiant accessiones in sanitatem, uel in febricitationem desinentes. Nam si duæ tertianæ sint, aut duæ quartanæ, tertianæq; quolibet die, quartanæ uerò tertio quoq; accendantur necesse sit, ita ut duas tertianas, unam quotidianam putes, & duas quartanas, unam tertianam existimes profectò in errorē maxi-

maximum laberis. Quamobrem etiam accessionum forme diligenter inspicienda erunt. 2. de Crisib.

33 Febres ardentes non ex sola bili retenta, sed ex incenso calore in uasis aëre etiam calido, cibis calidis, ex labore, uigilijs, ira, &c. gignitur. 1. in 1. Epid.

34 Naturam febris spectare oportet, ut crislum deprehendas, nam si sit uehementer calida, iudicabitur per fluxum: si debilis & flammæ extinctæ similis, longa futura est. Sæpe uero etiam per egestionem licebit idem iudicare. 1. ad Glauc.

35 In febre acuta & calida si calidus acrisque humor ad uentriculū delapsus sit, non mouet periculosum est signum. Indicat enim facultatem sensibilem omnē propē iam absumptam esse. 1. in 1. Epid.

36 In febre calida uomitus quidē uarij significant, in intestinorum uenis, & concauo hepatis crudos infese humores, urina uero tenuis & aquosa in gibbo. 2. in 3. Epid.

37 Sym.

37 Symptomata febris calidæ duo sunt præcipua sitis perpetua, & calor uehementissimus, qui cū tangitur ardere uideatur. 3. in 3. Epid.

38 Si in febre calida & ardenti uideris facultates omnes naturalem uitalem, & animalem uigore, & concoctionis signa appareat potes cum fiducia frigidam egro præbere, hoc uno seruatō ne sit senex. 12. Methodi.

39 Febris calida fit ex putrefacta bili in uentriculo maximè, in stomacho aut concauo hepatis, nec usquā alibi. Præcipuumq; eius symptoma si crisis per fluxum ē naribus fiat, q; accidit sanguine sursum elato uenasq; erūpente. in 1. Epid. & 3. morb. acut. aut ex flaua bili, aut ex pituita sasa fieri dicit.

40 Si æger aërem frigidum ob caloris interni uehementiam desyderare uideatur, & tamen operimenta ob externum frigus petat, signū est mortis, maximè si post principium accessionis illud non accadat. 3. in 2. Epid.

41 Aëre frigido & si æger ardorē uehe-

uehementer sentiat spes certa nō est salutis: si uerò etiam nulla concoctio nis signa, & uires sint imbecillae nulla prorsus esse potest. 11. Methodi.

42 In febris ardentibus nos calorem clystere ex oleo & aqua restinguere solemus, lib. de Clysterib.

43 In quotidianis causa rigoris alia est atq; febris. Hæc cum ex pituita putrida, rigor autē ex eo quod putrefactum non est accidit. In tertiana uerò bilis una utriusq; causa est. 2. de febris.

44 Solent aut per circuitus quem admodum febres sic alij morbi partiales, ut lippitudines nonnulliq; aurium, capitis, oculorumque dolores, euenire quorum una causa est excrementorum aceruatio ob earū potentiarum, quæ in membris sunt, uel imbecillitatem uel robur, ob imbecillitatem quidem fortioribus à se plethoras & cacochymi pellētib; suscipiētib; autem imbecillioribus. Veluti cerebrū & uniuersum caput, ad aures, oculos, tempora, labra, dentes
malas,

malas, palatum, gingiuas, gurgulio-
nem. Paristhmia atq; glandulas ex-
pellit. quod si hunc quoq; firmę sint,
ad pulmonem, fauces, pectus, uentri-
culum, gulam fluxio delabitur. Qua
ratione & inflammationes hepatis
per circuitum à uicinis partibus, uel
ex remotioribus una aliqua genera-
tur, augentur, ac per circuitū exaspe-
rantur, ob robur aut inutilis materia
à particulis attrahitur: Veluti in cali-
dis, etenim calor natura aptus est ad
conciliandas fluxiones. Proinde in
corporibus plenis magna portio ad
eas defluit partes, quæ uehementius
incaluerit. 2. de febr. b.

45 Febres quæ per circuitum non
fiunt, ut continua non ex unius mē-
bri affectu possunt oriri, nulla enim
pars in his est, quæ præcipuē sit offen-
sa, sed qui in uenis, & arteriis omni-
bus continentur humores præcipuē,
qui in maximis & plurimo calore a-
bundantibus delitescunt, aut ob aliam
quauis causam, quemadmodum in
ephemeris, aut ob putrefactionē fer-
uentes

uentes febrem accedunt synocham, quæ à principio usq; ad finem nullā habet intermissionem, at tam diu deiecerit hominem, donec humores eam gignentes consumantur, aut coquantur, aut utrunq; patiantur. Ibid.

46 Intermissionem uoco quando febris in quietem desierit. Declinationem uerò omnem eius partē quæ uigorem ipsum subsequitur, usq; ad secundæ accessionis principium. i. de Crisib.

47 Quartanas ego theriaca propinata curauī hoc modo. Primum uacuabam quantū satis erat, deinde absynthij succum offerebam. Postremo electuarium theriacæ, quod bis uel ter sumptum liberabat hominem. de Theriaca ad Pisonem.

48 Cor primum si plus æquo incalcat hecticam febrem generat, deinde iecur, sed non ex se ut cor, uerum ob consortium cum corde, mox uentriculus, & post hunc quæcunq; alia possunt consortij lege secum cor calfacere. Præter pulmonem, qui quia
humidus

humidus est & per respirationem assidue refrigeratur non potest. Cum igitur sola illa constiterit balneo ut caterræ siccitates curabitur. Enimvero commistus sit erysipelatosus affectus, prius cibo & potu, & ijs quæ apponuntur exterius refrigeranda, tum in uigore frigida contertim exhibenda, aqua tamen initio abstinendum erit, nisi sit ei assuetus æger nec sitim perferre possit. Refrigerantia autem si exterius nihil profecerint, intra corpus assumentur, ut molles lactucę recentesque solummodo in frigidam aquam demersæ & ita assumptę, uel si placet prius aceto diluto intinctę, extrinsecus interim adhibito eiusdem succo, aut semperuiui, aut intybi, aut medicamine succo uuæ acerbæ, & portulacæ cui parum farinæ sit mistum confecto. Quod quidem duplici linteolo exceptum præcordijs prætendatur, donec repescere incipiat, deinde ipso ablato alterum admoueat: id enim omnium est præstantissimum. Gal. de marasmo.

S

49 Om

49 Omnibus hec̃ticis febrib. hoc proprium inseparabileq; adest indicium, quod allato cibo accendatur calor pulsusq; in magnitudinem, & uelocitate augeatur: lic ut uideatur oborta esse incompressa quædam accessio, id est, ab omni inæqualitate libera qualis alias febres sequit̃. In ijs enim tales insultus etiam absq; cibo solent accidere, in hec̃ticis autē nunquam accessio conspicitur, sed una febris perpetuò cōtinua est, ut illa quę synochos dicitur. .i. de febrib.

50 Febres hec̃ticæ ferē his de causis fiunt, cū pestiferus & malignus humor ad cor primū delapsus, tum ad hepar, & inde ad uentriculum ipsum penetrauerit: aut cum intemperie calida & sicca uehementer laborānt pulmo, pectus, meseraicæ, aut cum ad intestina primū uel matricē ut renes defluerit materia, & inde ad cor ipsum peruerit. Quod uerò ad diaphragma attinet ubi semel ipsum subijt humor, necessariò moritur æger priusquam ad tabem perueniat,

niat, nec unquam curatum quenquā
hoc modo affectum meminī. 10. Me-
thodī.

51 Optimum singulareq; in feбри-
bus, quæ ex constipatione sūt reme-
dium est uenæ sectio pro uiribus fa-
cta, & obstructionis magnitudine:
ijs uerò quæ est putredine, frigide po-
tus post concoctionem. qua ratione
multos uidimus sanatos. 8. Meth.

52 Continentium febrium, id est,
synochorum una species est, quæ e-
andem naturam cum diarijs sortita,
absq; humorum putredine in plures
dies extenditur: altera uerò contin-
git ubi in omnibus uasis ac potissi-
mum maximis æquabiliter succi pu-
trescunt, quarum sanè febrium præ-
sidium maximum si modo uires ua-
lentes sint, sanguinis diminutio uel
usq; ad deliquium animi. Sin minus
ualida uirtus subest, aut ætas nō per-
mittit tutius, quantum satis fuerit ui-
sum principio detrahare quod defu-
it iteratione supplere. Hoc uerò præ-
sidio omisso in summum ægri disci-

S 2 men

men ueniunt nisi eos, uel uirium robur, uel largum profluuium sanguinis, uel sudor copiosus ex manifesta perniciē eripiat. 9. Methodi.

53 Quibus febris accenditur propter mordentem acrimoniam ex calfacti attenuatiōe à sole, inedia, laboribus succi, maximum eius remedium est humidum nutrimentum, ediuerso ubi ob copiam humorum, uel obstructionem, uel phlegmonem, uel putredinem alicuius ex ijs humorib. febris est orta, maximo malo est cibus. Quare hos quidē nec in febris inclinatione citra noxiā nutrias, nedum accessione inuadente: Illos uerò, omni certē tempore, sed potissimum per inclinationem. Porro in omni agro morbi summus uigor & agrotantis uires erunt spectandi à quibus cibandi cōsilia petas. 10. Methodi.

54 In febribus quæ obstructione fiunt commodissima cibandi hora est postq̃ quieuit æger à dolore, & qua sanus edere solebat. 11. Meth.

55 Vbi

55 Vbi uel iecur, uel uenter prahendit perniciosissimum est ante accessionem cibare, ubi hec abest, quibus imbecilla uirtus est utilissimum. Ibid.

56 Materiam febris putridæ superfluam prouocatione urinx, uel solutione uentris, uel sudore purgabis. quod si in uenter defluxa, uomitum elicientibus eliciatur. alioqui non temerè in ijs processeris. 1 2. eiusdem.

S 3 DE



Minò quatuor sūt morbi tēpora, prīncipium, augmentū, summus uigor, uel status & inclinatio. Vix autem adhuc certo motum est, quod'nam ex ijs, morbi tempus debeat appellari. 1. de Crisib.

2. Sunt quidā morbi iijq̃ uehementiores quidem ut epilepsia, apoplexia, & huiusmodi quorum accessio, & inclinatio non longior est, quā capitis abscissio, ita ut tempora distinguere nequeas. Eiusmodi affirmant quidā symptomata esse ex alio morbo producta potius, quā morbos, sed eos unde profecta sunt quatuor temporibus contineri. de Temporibus morb.

3. Sēpē quidem in morbis nullum reperitur sensibile ipsius uigoris tempus,

pus, sed quarta adhuc accessione in-
dicia augmenti habere quinta super-
uenit accessio inclinationis adferens
principia, quod idem & augmentis
accidit. Nā sæpe prior accessio prin-
cipium simul habet ascensum & ui-
gorem, secunda enim manifeste uide-
tur statim inclinare. i. de Crisib.

4 Hydropilis nonnunquā ex du-
titie cōcaui hepatis ob ciborum cor-
ruptionem nobis, nec uidētibus, nec
scientibus nata, cū primum appa-
ret principium sui facit ignotum, lib.
de temporib.

5 Proprium cuiusq; morbi princi-
pium signis concoctionis definitur.
Etenim eo usque principium morbi
dum concoctionis signa appareant
appellamus, cum autē apparuerint,
augmentum uel accretionem. i. de
Crisib.

6 Perfecte cōcoctionis signa sunt,
quando in urinis subsederit aliquid
album, læue, æquale & continuum.
Debilis uerò quando ex aquosa me-
diocriter subpallida facta fuerit, aut

S 4

etiam

etiam turbulenta existens talis permaneat, Rufa etiam & tenuis ad idē genus pertinent. Itemq; quando ex crassa in tenuem mutabitur. Ac ubi quidem hæc fuerint nondū esse principij tempus absolutum significatur: Vbi uerò illa, principij finis erit. Ibid.

7 Principium etiam exactum significant in urina uel sola nebula alba, uel suspensio æqualis atque continua & alba. Præterea rubens nubecula & subsidentia talis, & absq; subsidentia probe colorata urina atq; crassitudine mediocris. Ibid.

8 Eas uerò quæ cum magno ac repentino certamine fiunt solutiones morborum (quæ præcipuè crises uocantur) febrium earum quæ ex calidis humorib. accenduntur proprias esse est putandum. Post hæc earum quæcunq; membrorum sunt principatū habentium facile mobiles calidæq; dispositiones. 2. eiusdē.

9 Morbi leues & inualidi siue crisi ferè sanātur, at graues semper post crisim. Crisim autem nūquam quiescit, aut

ta, aut intermittente febre, sed in paroxysmi motu percepimus, aut semel quidem (ut memini) ad summum in quiete. 3. de Crisib.

10 Concoctio perfecta nō nisi citius uigoris morbi tempora contingit, atq; hunc ut proximè quæq; crisis attingit, ita laudabilis est: quanq̃ perfecta semel cōcoctione, crisis nullo tempore mala esse potest. Ibid.

11 Primum & maximum instantis bonæ crisis indicium sunt concoctiones: secundum quod ab aliqua decretoria prius indicetur, cui sanè annexa est diei indicatoriæ potentia & facultas: tertium quod subito fit: quartum quod excretionis modus, seu forma morbo respondeat ac conueniat. Ibid.

12 Ex sudore optimè februm maximè calidarum crises fiunt, apostematum uerò, ex fluxu narium, eorū quidem certè, quæ cæteris partibus acciderint: at eorum quæ concauo hepatis ex fluxu uentris cholerico, aut ex sudore, aut ex uomitu, aliorum e-

S 5 tiam

tiam quę in pulmone pectore, aut hepatis gibbo fuerint, meliores exspu-
to crises, & morborum renum, uesi-
cæ, ac proximarum ipsarum partium exu-
rinis. Ibid.

13 Si febris exurēs sit, uel sanguis
ē naribus profluet, uel post uehemē-
tem rigore sudor multus & calidus
per totum corpus manabit, aut per
uomitum, aut per aluum biliosum a-
liquid excernetur, ita & tertiana uo-
mitibus & excrementis biliosis, & su-
doribus toto corpore fluentibus fini-
ri debet. Quotidianis plurimum pi-
tuitæ excernitur, & multi per totum
corpus sudores fiunt. Phrenitidem
finit sudor multus præcipue si calidus
ē capite fluxerit sudante simul reliquo
corpore, interdum etiā sanguis ē na-
ribus fluēs: at lethargus & peripneu-
monia fluxum sanguinis non amāt.
Pleuritis uerò medium obtinet locū.
Ibidem.

14 Sudores omnibus febribus pro-
prii sunt & præcipue exurentibus.
Finiūt autem quartanas febres, si a-
tra si-

tra simul cum eis atq; uaria excernantur. Semitertianas uerò si biliosa simul & pituitosa, soluunt etiam parotides, lethargos reliquosq; omnes affectus capitis. Ibid.

15 Vbi quis subito liberat à morbo omnino huic aliqua euacuatio effatu digna, aut abscessus contingit, præcedente tamen insigni quadam perturbatione, anxietate nimirum uigilijs, graui somno, difficili respiratione, uertigine, doloribus capitis, colli, stomachi. Aliorumque membrorum nonnullis aurium sonitu, uanis ante oculos imaginibus, lachrymis inuoluntarijs, labrorum agitatione tremula, obliuione, præsentium ignorantia, clamore assulta furenti & similibus. Tumq; multo sudore erumpente, aut uomitu non exiguo insequente, aut uentre subito soluto, aut fluxu sanguinis abundantí, aut simul his omnibus contingentibus, hunc solutionis modum uocamus Crisim: aliũ autem ubi non omnino absoluitur æger, crisim imperfectã, & incertam ubi

ubi scilicet, paulatim & citra illas perturbationes morbi solvuntur. Crisim per abusum. qui tres modi sunt, cum ægrotus est euasurus. 3. de Crisib.

16 Primum omnium dierum decretoriorum dicimus septimum esse, non numero aut ordine, sed dignitate ac potentia: omnes quippe decretoriorum notas sortitur. Nam plurimorum indicat & absolute, cum manifesta excretionem uel abscessu, & sine periculo uehementi. Estque ut plurimum quartus index illius. Nam si urinæ uel sputi, uel deiectionis, uel appetentiæ, uel cogitationis, uel sensus mutatio manifesta in quarto die contigerit, similis consequetur illam in septimo, bona uidelicet si ad salutem, mala si ad mortem. 1. de dieb. decretorijs.

17 Sextus dies est decretorius quidem, sed malus, quemadmodum septimus, bonus. Mihi quæuenit frequenter in mentem septimi naturam regi cuiuspiam benigno & clementi assimilare, sexti uero tyranno crudeli & immitti. Cæterum sexti diei ut septimi quartus

tus est iudex. At uerò naturam septimi maximū imitatur decimusquartus Proximi his sunt nonus, undecimus & uigesimalus, propter hos uerò decimusseptimus & quintus, post hos quartus, hunc sequuntur tertius & decimusoctauus. Si quando autē in octauum, uel decimū subita morbi solutio incidat, similis ferè ei est, quæ sexto accidit. Ibid.

18 Dies omnes post quadragessimū prorsus languent, concoctione potius morbos & abscessibus, quàm crisi-
bus terminantes. At usque ad quartumdecimum quidem magnæ sunt perturbationes in morbis, proximo loco sequuntur, quæ usque ad uigesimalū habentur: quæ post hunc ad quadragessimū, paulatim uehementiā remittunt. Cæteros post illum contemnere uidetur Hippocrates, cū tamen sexagesimi, octogesimi, & centesimi rationem habeat. Ibid.

19 Tot indiciorum quot dierum decretoriorum differentiæ existunt. Cæterum in duodecimo & decimo-
sexto

sexto, nullum unquam indicatum uidi. In septimo uero ne numerare quidem adhuc possim. Ibid.

20 Dies inter uigesimum & quadragesimum decretorij sunt, hoc ordine boni 21. 28. 27. & 34. Reliqua multitudo prorsus facultatis decernendi est expers: ij sunt duodecim numero, nempe 22. 23. 25. 26. 29. 30. 32. 33. 35. 36. 38. ac 39. Ibid.

21 Ad distinguendum utriusnam sit indicium, si duos dies attingat, crisis dierum natura obseruatur, hoc pacto. Si ambigas utrum noni diei uel decimi sit indicium, si quidem salubre, perfectum, atq; sine periculo sit, noni esse dicas si imperfectum, malum & periculosum, decimi Proportio actionem sic diei imparis magis est proprium indicium, si imparibus labore magis æger, quemadmodum parisi si paribus quandoquidem in accessionibus indicia magis contingunt. Numerus sic. qui dies sibi tempora duo uedicauerit (Sunt enim tria, decretoria, accessionis initium, decretoria

torix motionis principiū & ipse indicij finis) magis sibi indicium assumet. Ibid.

22 Imperfecta indicatio est ubi ex morbo quippiam relinquitur, infida seu incerta, quàm morbi sequitur residua: Periculosa, quæ cum grauibus symptomatibus accidit: Obscura, quæ citra excretionem, uel euidentem abscessum euenit: Siue signis uerò euenire dicitur, quæ à nullo priore die indicata est: Mala, quæ in ægri perniciem desinit. Ibid.

23 Morbi tempora uel longa, uel breuia his foreprehenduntur, natura morbi, anni tempore, & excrementis. Ac natura quidem ueluti si ex cholera nigra fiat ut quartana, aut ex phlegmate, ut apoplexia, aut alioqui si sit longa, ut methridis, arthritides, Ischiades, quæ & longum principium habent. At febris calida, pleuresis & peripneumonia, breue, statumque morbi proximū: adeo ut quanto cum acutioribus symptomatis dolor sit, eò breuius sit principium. Anni tempore

ni tempore uerò sic discernatur, si sit ægritudo orta æstate breuior status atq; principium, Hyeme uerò cōtra. Excrementis deniq; hoc modo, si statim cum ægritudine concoctionis signa sputo, urina, aut sudore appareant breue principium erit, sin tardius, longiora, reliqua cum expectanda. Ibid.

24 Vocetur iam peracutus morbus, qui ad septimum usq; diem extenditur, qui longius procedit simpliciter acutus. Et peracutorum quidam qui quartum diem attingit peracutus, qui uerò septimum, non exacte. Sic acutorum, qui ad 19. usq; porrigitur exacte acutus, qui uerò ad uigelimum, non exacte acutus. Ibid.

25 Crisis profectam fieri non potest, ubi multus humor ad minorem quandam partem corporis defluerit. Cum enim in eo capi non omnis possit, cogitur eò unde uenerat reuer ti, uel in partes solidas elabi, quod ubi accidit hominem mori contingit. 1. in 6. Epid.

26 Dies

26 Dies indicatorij per quaternarium ferè numerantur, ad uigesimali usq; suntq; his, 4. 7. 11. 14. & 20. à quo deinceps per septenarium, usque ad 40. ascendis, atq; inde rursus ad 120. per uigenarium supputans. Post 120. autem per circuitus mensium geminos, deinde per annos sitamdiu duret morbus. 6. in 2. Epid.

27 Post quadragesimum diem morbi crisis fieri non potest, neq; per sudorem, neq; per aliam euacuationis speciem, sed paulatim & cum tempore ex egestionibus, ac eiectionibus quæretur solutio. in 4. Aphorif.

28 In continuis febris ut fiat crisis numerandi sunt dies, numerandi sunt dies continuo pariter numero. In intermittentibus uerò per periodicos tantum paroxysmos. Veluti in continuis quidē quod indicat septimus, id in tertianis decimustertius, & in quartanis decimusnonus indicabit. in 3. Prognost.

29 Perfecta crisis etiam his sex signis agnoscetur, 1. Si purgatio sequatur

T

quatur

quatur coctionis signa. 2. Si sit cū
abscessu. 3. Si humores morbi cau-
sam purget. 4. Si ex latere ipso mor-
bis dolēte fluxus fiat ē directo. 5. Si
die critico. 6. Si cū lenitate & qui-
ete corporis non perturbatione. in 1.
Aphorif.

DE PURGANDI RATIO-
ne per sang. mētionem.

Sectio XL.



P Rincipes scopi mit-
tēdi sanguinis sunt
duo, nempe magni-
tudo morbi præsēn-
tis, uel imminētis &
uirium robur: qui-
bus si adiicias & florentem ætatem,
nil sermoni defuerit, modò sub ea pæ-
cedens sequensq; illam intelligant,
excipianturq; distincti one tårum se-
nilis atq; puerorum ætas. Gal. de ue-
na sect.

2 Quibus uoles ineunte uere san-
guinem

guinem detrahare si sit plenitudo, & potentioribus partibus ad infirmiores deriuare humores conabarís, ut inde sanguinem emittas, sin minus ex commodissimo quoq; membro. Ibid.

3 Quibus uenæ sunt amplæ ac refertæ si accidat & corporis macilentata affectio, & alius color ab albo, & caro rubricosa, ijs cum fiducia potes detrahare sanguinem. Quibus autē diuersa affectio est, non item. Ibid.

4 Vacuare puerum ante decimum quartum annum non est tutum quēadmodum nec senem post septuagesimum annum: nisi tamen in sene tā sanguinis copia est, ut uacuari sit necesse, & uires huiusmodi, qui non minus quā in iuvene ferre possint. Tū enim non tam annorum, quā uiriū & affectuum habenda ratio est. Minus uerò semper in sene, quā iuvene trahendum est. Ibid.

5 In febribus, quæ cum accidente urgent uacuandí humores, non etiā si exigat morbus, ubi hæc aderūt,

T 2 quæ

quæ sequuntur, ubi scilicet simul cum
 febre sentitur circa os uentriculi an-
 xietas morsus & imbecillitas, ubi di-
 stentione neruorum laborauerit, &
 uigiliæ molestant, & uires egroti de-
 bilitantur. Item ubi uentris erit pro-
 fluuiū, aëris ambientis exquisitè ca-
 lida, aut sicca temperies, qualis est tē-
 pore medio inter canis & arcturi or-
 tū, aut etiam ualdē frigida (ob hæc. n.
 in calidis locis aut frigidis admodū
 sanguinem mittere non audemus) u-
 bi etiam regioni temporis huius sta-
 tus consentiet. Nam ubi non consen-
 tit uacuamus quidem, sed minus q̃
 si neutrum prohiberet) ubi natura æ-
 gri calidi sunt & sicci, ubi nunquam
 fiunt uacuati. Præterea & si diffuen-
 ti carnem molli & tenella constat cor-
 poris habitus (in ijs enim alijs uacua-
 tionibus, quàm sanguinis missione
 utēdum moderatē) eodem modo si
 supra modū crassi uel macilenti sunt,
 aut deniq; si seniores uel pueri. Hos-
 ce enim omnes integrē uacuare ue-
 rendum, neq; enim id sine noxa tole-
 rant,

stant, sed paulatim, quoties dispositio-
nes ita hortabuntur, inedijs, modera-
tis frictionibus, clysteribus mollibus
contusionibus, atq; balneis. 1. ad Glau-
con.

Hoc enim ex eo libro, de his maxi-
mè, quæ ad deliquium animi & uiri-
um exolutionem pertinet collegimus.

6 Vbi corpus crudis humoribus
est refertum periculosa semper est ue-
næ sectio. Corpus enim sic infirmius
redditur, maximè cum febris adest,
tum uix unquam ad se redire potest.
Gal. de uenæ sect.

7 In corpore lassitudine affecto, u-
bi paululum uel circa sanguinem re-
stitum, uel ultra processum est succis
audacter mittendus est sanguis: ubi
plus, considerantius agendum: ubi
plurimū in hoc omnino nullus mit-
tendus. Inspicere & quantitatem cō-
ueniet, ut uerbi gratia, si bonus san-
guis exiguus sit, crudus uerò pluri-
mus, in his abstinendum à detractio-
ne sanguinis erit: Sin is quidem exi-
guus, sanguis uerò copiosus auda-

T 3 cter

Alter incidenda uena est: deinde alius deijcere pro abundantis succi copia & specie. Quod si quis detrahi sibi sanguinem nolit deijcienda largius est alius, aut si hoc illi sit quoque suspectum, alia ratione superuacuum est uacuandum. 4. de sanit. tuen.

8 Si quis etiamnum sanus, nec adhuc quicquam læsus sanguinis redundantia grauetur, non statim huic mitti sanguinem est necesse. Imò alij satisfaciunt inedia, alij cibi parcitas, alij soluta alius, uel purgatio, uel frequens balneum, alij sola exercitatio, (ut pila obequitatio &c.) uel multa frictio abunde fuit. 4. Methodi.

9 Sanguinem missurum diligenter antè omnia metiri oportet laborantis statum. Cui enim exiguus est in corpore sanguis, in hoc prius medicamentis ad id comparatis corruptos humores ad mediocritatem reducere oportebit, tum uenam secare deinde uictum idoneum præscribere. Post hæc rursus uenam, si robustus est æger, secare. Id uerò maximè fieri debet

debebit, ubi crassus lentusq; sanguis erit. 5. Methodi. De hemoptoicis, hoc est, sanguinem expuentibus. Vbi (inquit) ex casu uel præualida acutaq; uoce uas aliquod in pulmone rumpitur, multisq; sanguis statim cū tussi expiatur, iniūgendum laboranti ut silentium agat, nec respiret uehementer præterea uena cubiti interna protinus incidēda à qua his terq; postea sanguis est derrahendus auertendi gratia, tum posca diluta bis tertis horis potui danda, & emplasti cum aliquod aut astringens medicamentum, ex posca diluta primū, aut malorum myrtorum'ue decocto. Postero autem die (modo æger si robustus) ab ancipi iam uena parum detrahere, uictuq; & medicamentis eodē modo uti oportebit.

10 Si forte sectionis tēpore aut uenarum ora aperiantur, aut menstrui profluuium fiat, aut aliquid molle egeratur, intermissa sectione, excrementorum eiectorum uim omnem, & quantitatem spectare conueniet,

T 4

quæ

quæ si satis morbo fecerit, naturæ cōcedes totum opus : sin minus , quod supererit sectione perficies. 2. Meth.

11 Si quis sanguinis missione ege re uidebitur cui interim uētriculi deiectionio contigerit phlebotomiam differes quoad cibus fuerit concoctus, & superflua uacuata sint. Sin alio q̃ sanguinis missione sint opus non differes etiam accidēte deiectione. Ibid.

12 Corpore humoridus æqualiter ualentibus repleto, purgari oportet phlebotomia si potest uel alia quolibet ratione idonea, ut mēstruis purgationibus, hæmorrhoidibus, exercitijs, frictionibus balneis uictuq̃ conuenienti. in 4. Aphorif.

13 Sanguinis missionem differre nunquam oportet, siue dies sit, siue nox, ubi in corpore sanguis feruere cœperit, sed eo magis acceleranda ne partes solidas prius inuadat. Gal. de uenę sectione.

14 Cū subito sanguinis fluxu quicquā parti acciderit noxiū, ueluti cerebro apoplexia. Ea enim ex pleno

pleno subitoq; sanguinis in cerebrū incubitu oritur. Tum exploratis uiribus, ætate consuetudine, & plenitudinis quantitate celeriter quoq; uacuabis, priusquam aliquam perniciē illa concilient. Ibid.

15 Memini in febre ex sanguinis feruentis copia, contracta, secūdo etiā tertio & quarto die, ad libras quinque detraxisse. Ibid.

16 Vbi uires infirmæ sunt tutius semper est, non quantum conuenit primum trahere, sed sæpius iterare, manu perpetuò pulsui admota, ut uirium robur cum satis minutum erit, sentiarur.

17 Hoc summum bonū est in sanguinis missione, quod potes sistere uacuationem dum oportunum uidetur, ac rursus, si quando animis sit sinere ut fluat, quousq; uidebitur tibi rectē se habere negotium, id quod non licet in purgantis pharmaci exhibitione. Nam quod semel in uentrem deuoratū est medicamen, minus omne sit deuoratum fieri non

T 5 po.

pōtest, neq; oblatis partem auferri ubi plus quam conueniat purgetur homo. de uenæ sectione.

18 Sanguinē detracturo in phlegmone hæc erunt expendenda, plenitudinis tum quantitas, tum qualitas, uirium robur & infirmitas, naturalis totius corporis habitus, tēpus, regio, antea cta uita, cibi potusq; copia quibus sit usus, consuetudo, res præter consuetudinem actæ, excretiones, præterea num crassior, aut gracilior sit factus. Plenitudo quidem quoad uires tanto creuisse cognoscitur, quanto grauior homo sibi uidebitur: altera, quæ quoad uasa uocatur, tanto, quantum auctus tensionis fuerit sensus. Virium robur ex partiū functionibus cognoscitur & ex pulsu. Si igitur tensiua sit affectio magisq; si phlegmonodis incidas uenam nil distinguens: at si degrauians sit, quoad uires non semper molienda est detractio, fieri enim pōtest ut sit talis affectio ab humoribus crudis per corpus collectis. Que succum frictioni-

ctionibus unctionibusq̃ modicē cal-
facientibus & potionibus cibisq̃ue
crassitudinem humoris incidētibus,
magis quam sanguinis missione ua-
cuare expedit. Ibid.

19 Vbi uehemens morbus & uiri-
bus æger, ualet profectō prudēs me-
dicus, nunquam prohibebit uenę se-
ctionem etiam si an ex redundantia
sit morbus ignoret. Quōd si ex alio
quā sanguine esse certis signis cog-
nouerit, & fluat uenter, uomitusq̃ se-
quantur, non iam secare, sed corrup-
tos humores corrigere prius oportea-
bit. 4. Methodi.

20 In febribus continētibus, quæ
ex styphone meatum accenduntur,
quoniam ualida plerunq̃ uirtus est,
citra periculum uacuatione utendū,
in alijs morbis, potissimum ex corru-
ptis humoribus productis. 9. Me-
thodi.

21 Ego uenā in his affectibus nū-
quā dubitavi, secare podagra, arthri-
tide, epilepsia, melancholia. Reiectio-
ne sanguinis iam habitu quodā inue-
terata,

terata in angina, peripneumonia,
pleuresi, phlegmone, hepatitis, ophtal-
mia, fluxu sanguinis, tam ex uenis q̃
à naribus, & uteri suffocatione. In his
enim uenæ sectio certissimum est re-
medium, si uires & ætas supeditet.
de uenæ sectione.

22 Aestimare diligēter debet, qui
in ulcerosis ex lassitudine affectibus
sanguinem mittere instituerit sit ne
in thorace, an in lumbis, uel in capite
potius & collo tensio pulsans q̃ do-
lor. Sanguinem enim nō parum, sed
nisi quid obstat ad animi usque deli-
quium trahere potest, n̄s quidem qui
bus in capite dolor est ab humerali,
alijs uerò ab interna. Si uerò omninò
æqualiter ægritudo occupat corpus
ab ambarum media. 4. de sanit.

23 In transuerso nerui uulnere, de-
trahere largiùs sanguinem ac tenui
uti uictu, tum in quiete omninò ac
lectulo molli hominem continere o-
portet, tum oleo calenti ubertim in
axillis, collo, tendonibus, ligamentis
& capite uti. 6. Methodi.

24 Po.

24 Poterit sanē quis cōmodē sanguinē mittere, uel quacunq; diei noctisq; hora, si in febrētibus quidem inclinationem circuitus expectabit, & cibi uentriculi concoctionem. In alijs uerò sine febre affectibus ueluti lippitudine & similibus idem poteris. Si magnitudinē aut doloris, aut phlegmones, aut totius affectus expectaris. Quod si doloris nil sit eiusmodi quod urgeat, aut prohibeat, & tamen uenam secare uelis, præstabit manē post circiter horam. de uenę sectione.

25 In mittendo sanguine obseruandum erit, ut quibus partes collo inferiores patiuntur, interior uena (quæ iecoraria & axillaris, & lienaris, & basilica dicitur.) in ijs uerò quibus partes supra collū ut facies, caput, &c. laborant, exterior, id est humeralis, seu cephalica: at ubi uena parti patienti propria obscurior fuerit media, quā & medianam, funem brachij nigram & matrem uocant, incidatur. 3. anatom. adm.

26 Par

26 Partibus proximè hepate superioribus affectis cubiti uena secatur, inferioribus uerò, poplitum malleolum. in 6. Epid.

27 Dolor oculorum, laterum, pulmonis septi transuersi, lienis, iecoris, & uentriculi secta uena, axillari leniatur, aut certè etiam medicamina. Coxendix uerò uterus & uesica per poplitum, & malleolorum uenas curantur. Renum aliquando ex cubito si recens sit phlegmone, & communitur sanguinis copia, sin sit inueterata ex poplite. Sic uteri inflammationes multo quàm magis quàm renum. de uenæ sectione.

28 Ischiades si causa est sanguinis plenitudo, primùm omnium sanguinis missione sunt curandæ, nequid tantum ex uenis pedum, sed ex cubito fieri oportet. 10. de comp. secundùm loca, & de uenæ sectione.

29 Ischiades, ubi non à frigore, sed ob impletas sanguine, quæ in coxa sunt uenas proueniunt, secta in poplite uena curabis. Scarificatio autem

tem nil prospicue eis prodest.

30 Fluxum sanguinis ex ore uenarum reſerato reprimere oportet, uenis cubiti ſectis, trahere uero, poplitum aut malieorum. Quod idem etiam obſeruari debet in cohibendis cingendisq; menſtruis. de uenæ ſect.

31 Vbi iecur aut pulmo phlegmonem contraxiſſe cœperint erit pariter, tum euellendus, tum educendus, qui eò confluit ſanguis, interna in dextro cubito ſecta uena, propterea quod e regione & ampla uia cū uena, quę caua dicitur ſacietatem habet. Hac uero non comparente media ſecanda eſt. Quod ſi nec ea ſe oſtenderit, reliqua ac tertia eſt incidenda. Pariq; modo ubi caput fauces, palatū, os, aut linguam phlegmone tentare cœperit, incidere humeralem cubiti ſi ea non cernitur, mediam, ſi ne media quidem, internam. 13. Meth.

32 Liene affecto, perinde iuuerit uena ſiniſtro brachio ſecta iuxta digitum annularem, atque ſi internam ſecueris. de uenæ ſectione.

33 At

33 At partib. quæ in occipite sunt phlegmone afflictis, etiã eam quæ in cubito est uenam, nec non eam, q̄ habetur in frõte incidere oportebit. Renibus uerò & uesica, & pudendo, & utero sic habentibus eas, quæ in curribus sunt sitæ, ac potissimũ, quæ citra poplitem: Sin minus eas, quæ iuxta malleolum. 13. Meth.

34 Perpetuo in omnibus secanda quæ & directo est, ut si iecur phlegmone inuadit, sin lienem, quæ in sinist. Ibid.

35 Sanguinis fluxum è naribus si uena secta, & cucurbita iecori appositæ non sedaris, frigefaciendum non est cerebrum, sed occipiti cucurbita affixa in aduersam partem reuellendus sanguis. 5. Methodi.

36 Secare arterias quæ in temporibus, & quæ secus aures consistunt: illas quidem, infestantibus oculos fluxionibus tum calidis, tũ spirituosiss. Has uerò quæ secundũ aures sunt, in uertiginosis maximè & ijs, qui calidis, & diuturnis spirituosissq; capit
tis

tis doloribus, in medici consuerunt. Verum quia uulnerata arteria a grē supprimi possunt, ob id eas incidere metuunt. Quamquam etiam magnā absq̃ aneurismate ad cicatricem perducere est facile totam transuersum dissectam. de uenæ sect.

37 In melancholia & eius similib. morbis, si signa sanguinem uenarū esse melancholicum ostendant mediana uacuare, quantum conueniet oportebit. At si iam apta uena non esse melancholicum iuxta signa uideris cohibito sanguine uenam ocludes. qui certissimus secūdi est canon. 3. de locis affect.

38 In quartana, neque principio sunt adhibenda ualida medicamenta, neq̃ alio modo uacuenda corpora nisi redundare sanguis uideatur, q̃ ubi acciderit & secta uena rubrum ac tenuem sanguinē compereris statim uenam esse crabis. .i. ad Glauco.

39 Hydropisim quoq̃ in mulieribus ex menstruorū suppressione, aut sanguinis fluxu in naribus, aut uenis

V. retentis

retento, principio statū uenæ sectione curare oportet, antequā facultas defecerit. 7. in 6. Epid.

40 Quemadmodum fluxionē ad oculos cucurbita occipiti affixa cum ramus reuulsione, ita cerebri fluxionē uenę frontis sectionem me, eademque ratione. 1. de humorib.

41 Vbi iam melancholicus factus est humor crassus atque plenus, sanguinem detrahare primum, deinde purgare. Si uerò adhuc crudius erit, prius purgabitur idque summa cautione, ne in morbum incidat æger, nam si iam inciderit, purgandus non erit. de uenæ sectione.

42 In scirrhusa splenis affectio, per seuerante post adhibita medicamenta malo cucurbitas cum scarificatione affigito, aut uenam retro sinistra aurem secato, & detractio sanguine lienę partes cōfricato. 9. comp. secundum loca.

43 Cucurbita in ipsa parte, quæ phlegmone urgetur affigenda inter initia non est, sed ubi totum corpus uacua-

Uacuaueris. 11. Methodi.

DE CVRANDI RATIO.

ne per medicamenta soluentia.

SECTIO XII.

I.



Medicamenta purgantia uentrem omnia praesertim uero stomachum, quod sensibilis & nervosus maxime existat, laedunt & affligunt. Ob eamque causam eorum, quae boni sunt odoris id est, aromatum mixtio inuenta est, ne sola synceraque purgantium uirtus os ipsum uentriculi offenderet. 2. in lib. de uictus ratione.

2. Medicamenta mixta uel composita ex pharmacis diuersis, quorum unum protinus, alterum longo postsumptionem tempore mouere natum sit, omnino sunt purgando inepta. ibidem.

Addit Moyses.

Subito mouentia & lacticia & scammonia, per moram uero ut opo-

V 2

panas

panacum, galbātum, serapium, succus cyrenaicus, & ammoniacum.

3 Aromatica semina medicamentis admixta, eorum maliciam corrigunt, & obtundunt, operationemque iuuant. Incidunt, attenuant qualique uehiculū uias aperiēdo, cetera per meatus trāsuehūt. Qua ratione & ptisanā sumpto medicamento sorbere prodest, quod deorsum trahere id quod uia ex medicamento adhæsit, & qualitatem ipsius, seu saporem in gutture & stomacho manentem, tum mutare, tum temperare possit. Ibid.

Addit Moyses.

Si quis hodie ptisanum (ut ait) assumpto medicamento lauando gutturi & ori præbeat, profectò totum statim medicamentum uomitu eliciat. Nec adhuc ualde usurpatum uidi, abhorrent enim ægri, si quis propinet. Quamobrem melius hodie receptum est, ut parum aquæ cum radice althææ, & eius semine, anisoque ebullitæ, deinde per saccharum colatæ detur, eluendis illis uiscosis aromatici-

maticis, saporosisq; qualitatibus. cui si addatur semen myrthi, nil magis aromaticum cum uiscoso cogere potest. Vbi autem hæc purgata sunt, iusculum gallinaceum dari commodè potest, & si sitim patiatur, æger pro myrthi semine in aqua miscetur psillium.

4 Medicamenta soluentia omnia attenuandi ui prædita esse oportet. Ea q; non nisi necessario adhibenda, atq; id non repente, sed si per uomitum purgandum est, prius eo sæpe excitato: sin per uentrem, eo emollito. 2. & 4. Aphoris.

5 Crudi omnino lentè mouentur ob crassitudinem & frigidam qualitatem. Si igitur medicamento pallantur, continuo meatus obstipabunt, quò melius ac consultius semper est concocta medicari. 4. de sanic.

6 Flauam bilem purgare non est difficile, sed atram & pituitam crassam lentemq; difficillimum, ultimo Aphorism. Quare uehementioribus in hac, quàm illa utendum medica-

V 3 men-

mentis .4. eiusdem.

7 Plenitudo humorum malignorum, quæ quò ad vires dicitur, soluentibus curanda medicamentis, multorum uerò quæ repletio quoad uasa. uenæ sectione. 6. de sanit.

8 Qui ex erosione uitiosi succi phlegmonem, in pulmone patiunt, si tussiant nec sanguinem reſciant, & ex fluxione capitis afficiatur, purgamenti præsidio quod diuersas facultates habeat, curantur. Cuius generis sunt nostræ pilulæ, ex aloë, scammonia, colocynthide, agarico, Bdelio, & gummi arabico, ad plures uidelicet, excrementorum purgandas species Postea uerò etiã si res postulat, ijs quæ nigram bilẽ expurgent, utare capiti prouidebitur, ex cerati uſu quod fit ex rhapsia. 5. Meth.

9 In immodicis purgationib. semper humor naturæ molestissimus, in quem pharmacum exhibitum agit, primus uacuatur: deinde reliquorum quodq̃ pro tenuitate substantiæ sequitur. Qui uerò naturæ familiarissimus

tenus est, ut sanguis postremus, ut si quod pituitam educit exhibitum medicamentum fuerit, prima quidem omnem ipsa uacuabitur, deinde flaua bilis, postquam atra bilis. Postremo uerò loco sanguis. Sic si quod flauā bilem educat detur, pituita sequetur, tum atra bilis, postremus sanguis erit. 3. de simpl.

10 Corpus medicamenti portionem sumpturum tribus antè continuis diebus lauare, & ita parari oportet, ut humores crassiores emolliant, & si quæ pars intensior sit relaxetur. 5. in 6. Epid.

11 Tumores biliosi & phlegmatici una plerunque, aut altera portione soluuntur ac curantur. Melancholici uerò ut cæcer, lepra, gangrina, &c. etiam quarta & quinta, uix curantur. in 1. Aphorif.

12 Melancholiam purgare sepius & mediocriter, & accommodatè nō solum ægris, sed sanis etiam prodest plurimum. 3. in 2. Epid.

13 Intemperantes & uinolentes

V 4

ueni

uentricq; & gulæ deditos, nec purgatione, nec missione sanguinis magis opere iuueris; nam per uitæ intemperantiam rursus crudorum humorum, quàm ocysimè colligunt. quare ne is quidem manum admoueas. Eis uerò qui præceptis salutaribus obsequetur plurimū proderis, si principio ueris primū quidem uacua ueris. Dein ad exercitia salubremq; uictus rationem perduxeris. de uenæ sectione.

14 Fluxum uentris oportet quiete prius ad certam horam factā continere, tum pro qualitate & quantitate contentorum soluere. i. in 6. Epid.

15 Medicamentū p̄fuisse ex qualitate excrementorum sic agnoscetur, si mutata materia fuerit, nec ex intestinorum substantia corrasa ramenta habeat, si non sit sanguis purus si nil foetidum. Quod enim purū eijcitur ex caloris uehementia procedit, quod foetidum ex putrefactione, quod melancholicum ex adustione. Ibid.

16 Sunt qui statim accepto medicamen-

ramento purgentur, alij nō nisi ægrē possunt, his quidē ualidiora, illis uerō ubi præsertim febris adest, remissiora omnia danda sunt. in 2. de morb. acut.

17 Medicamenta uirtutem minorem ac imbeciliorē reddūt, ut nec cibi totum coquere, nec alterare possint quantum ante portionem. Propterea, post purgationem & minuentur cibis erit, & exhibendus, qui cōfacillimē concoquatur. Ibid.

18 Fluxum materię uel sanguinis non incommodē accidentem, neque cibis astringentibus, neq; similibus alijs cōuenit retinere. Retenta enim huiusmodi sursumq; relata febrē & hepatis inflammationes plerunq; attulerunt. 2. in 6. Epid.

19 Medicamentum propinaturū prouidendum est, ne quid accessionum uigore, aut criticis diebus præbeat. Omnino enim illis uis prodiit atque corrumpitur, si humoribus ad contrarium uacuationi partem nempe ad superiora uergentibus detur.

V 5 2. in

2. in 6. Epidom.

20 Infantes purgaturi medicamē
nutricibus propinare solemus, ut ex
acte medicamen uirtutem sorbeant,
id uerò in cæteris quoq; animantib.
compertum est. Siquidē multi sunt
quibus solutus uenter est ex lactis ca
prini potu, credo ob scammonia &
lacticia, uim quib. quorum ramis
uti solent caprae, alij uerò membrorū
tensione capti sunt ex coturnicum e
su, quæ helleborum depasta erant. 5.
in 6. Epid.

21 Clystere uacuare ubi uires ad
huc ualidae, Glandibus uerò (uulgò
suppositoris) ubi sunt infirmæ. 3.
morb. acut. & 6. in 6. Epid. Clyste
ris ratio pro humorum qualitate ha
benda est, si enim in intestinis sint a
cres, rodentesq; humores ex abster
gentibus fieri clysmos oportet, qua
lia sunt mulsa & ptissana. Sin iam con
cocta uacuentur ex mitigantibus &
firmantibus. 6. in 6. Epid.

22 Dolorem colico sic curari qui
dam præceperunt, supposito lapillo
salis,

salis aut nitri, habere enim salem extrahēdi facultatē, Tob. de colico dolore & 1. de humorib. Clysterem ex aqua salis ei conficimus, cui intestina vulnere putrefacto affecta sint, ut sic abluantur & putredo extrahatur.

23 Quibus corpus laue rarumq; est, & quibus obelum, aut macilentū nullum medicamentum est tutum. quare eos purgari convenit potissimum temperata uictus ratione, dein defuſione, leuibus, clysteribus, distillationibus, emplastris, glandibus, balneis & huiusmodi leuioribus curationibus. 1. ad Glauco.

24 Matricibus exulceratis & hemorrhoidibus, & ano clyster aptissimus est, ex lacte cui lapis uel ferrum sit extinctum. 1. 6. de simpl. med.

25 Ego nō, quib. in diuturnis morbis uenter sistitur. (contingit enim id post longum morbum in conualescentia) aluum ducere soleo, non acris per inferna infusis, sed tantum oleo, id quod sauis similiter utile, 5. de sanitate.

26 Fo.

26. Febrem hecticam ex putredine, & obstipatione conflatam solutione uentris primum aggredi oportebit. Re uerò non succedente, infuso clystere ex oleo, aqua & melle.
10. Methodi.

27. Vlcerebus intestinorum clysmi aptissimi sunt, qui ex simplicibus abstergentibus incidentibus, uel soporiferis & emollientibus, ac leuientibus ex parte compositi sunt uel omnino, id quod pro magnitudine, uel leuitate morbi. Miscenda autem his ptisfana & uinum aliquod astringens. 9. de comp. secundum loca.

Addit Moyses ex Ebilule filio Zor, ad Maraney filium suum prescribente medicamentorum rationem.

Obserua (inquit) medicamentis propinandis, ne quid temere agas. Vbi autem res postularet, concoctionem humorum preparato, & meatuum reclusionem, uiamque excrementis facilem. Tum prudenter quoque ad uacuationem accedito: Si enim frigus erit miscendum aliquid ex liquefacientibus.

bus, quale sal omnis generis & piper. Sin sit æstus, nil aliud præterea, quæ uentriculum & stomachum cōfirmare possunt. Vt mastichen, anisum, absynthium, quæ utrique etiam tempori cōueniunt. addes præterea aliquid quod iecur & intestina à medicamento uiolentia uindictet, ut sunt ficus, amygdalæ, oleum ex ficub. &c.

Ex eodem.

Medicamenta diuretica & cathartica, id est, urinam & uentrem subducentia, neq; cum uino fieri, neq; sumi debent: tantum enim abest, ut membra corrigant, aut emendant, ut eorū uitium augeant. Præterea solidarum partium ea natura est, ut uehementia medicamenta nulla ferre citra noxā possint.

Addit Moyses ex se.

Verū illud est, si uacuantia medicamenta ex uenenosis, & toxiferis qualitatibus constēt, cuiusmodi sunt colocynthis, & turpetum, & catapodia. Sin nullo ueneno cōstent, sed sint pura & leuia, ut agaricum cum uino sumpta

sumpta multo plus conferunt, id quē
sum expertus in capitis dolorib. fœ-
licissimē. Colocynthis autem para-
tur ex nucleis ficuum, & amygdala-
rum. Electuarium uerò ex floribus
nymphæ, uulgò nenuphar, & ex o-
leo amygdalino si melius habere
uelis.

Ex Theminio.

Ad dolores ex medicamentis sub-
ortos. ℞. semen. nasturtij, quantum
conueniet, & lacti ebullienti impo-
ne atq; incoquito, tum tepidum for-
bitioni dato. Influit enim per uentri-
culum lac & intestina, repurgatq; ip-
sa à medicamenti malicia.

Addit Moyses.

Verum est si modo lac sit caprinū.
At si (ut hoc ex corollario addatur) si-
tiant fortē uehementius æger, qui me-
dicamentum sumpserit, & calidiorē
uentriculum queratur, tum pſyllium
cum aqua & serapio rosaceo exhibē-
dum erit.

Rursus ex Theminio in Isagoge.

Cepe contusum naribusq; apposi-
tum

tum nauseam ex assumpto medicamento cohibet, & uomitum.

DE PURGATIONE

per uomitum, Sectio XIII.

1.



Vllam bilis portione in uentriculum immisit natura, ne ipsum exactiori sensu, quam ieiunum præditū, si quando ipsa influat, cogeret alimentum, priusquam cōcoctus esset detrudere. Et paulò post.

Quamobrem rectè præcipiebant ueteres medici, uomitus à cibis in singulos menses repeti, alij quidem semel, alij bis. Omnes ij qualitates in eum usum comedendorum acres & absterforias deligere consuluerunt, ut pituita omnis à corpore purgaretur. Nam quæ mordent & abstergūt cribaria biliosa sunt, & cancochyma omnia. 5. de us. partium.

2 In lassitudinibus cruditati copulatis uomitu minimè utēdum ne succē-

ci reuellantur, intrò mordaces, qui ui
delicet carni cutiq; inhærent, sed de
uitanda, q̃ refrigerant astringuntq;
cutim omnia, ne à cute ipsa motum
humorum ad interna concitent, quẽ
admodum uitantur exercitatio, fri-
ctio, fomentatio, balneum, unctio-
nes, iracundia, & quæ humores ab al-
to euocare possunt, ubi circa hepar
cruditate coaluerint. Nam nec qui
extrà sunt, rectè intrò reuocàtur, nec
qui intus, foràs. Imò qui foris sunt le-
uiter per habitum educendi erunt. 4.
de sanis.

3 Humorem melancholicum per
inferiora semper, nunquam per uo-
mitum purgari oportet. in 4. Apho-
rism. Et paulò pòst. Humor
acris tenuisq; sursum petens hyemis
tempore non est purgandus, sed con-
sumendus.

4 Syncopen ex humoribus acriter
stomachum rodentibus calida aqua
sola, uel oleo mixta per uomitum cu-
rare oportet, qui si tardius sequatur
pectore & plantis manuum ac pedũ
calida

calida aqua lotis accelerandus erit. Si
uerò ne tunc quidem moueatur, ole-
um quàm poteris optimum calefa-
ctum præbere. Etiam si enim uomitū
non accit, plerunq; tamen materiam
egestionis emollit. i. ad Glauco.

5 Quibus lenta pituita infixæ est
uentriculo, si ad uomendum apti sint,
non inutile fuerit per radiculam ex
oxymelite uomere. Sin uerò nec len-
tus humor sit, nec crassus, utiq; abun-
dè fuerit à ptisanæ solius cremore uo-
muisse, item à mulsæ. Quo casu sumē-
dum utriusuis plus est, quàm uel nu-
trimenti, uel etiam deiectionis causa
sumeretur. 7. Methodi.

6 Narcissi radix uim maximam e-
trocandi & uomitum ciendi habet.
Qui mobrem & ijs quibus humorē
cibi superfluum purgari opus est, uel
tres ante cibum præbere soleo. in 6.
Epid.

7 Qui ad uomendum sunt faciles,
iis purgando phlegmate corpori an-
te cibum optimus est uomitus. Qui
uerò difficiles & inepti, iis melius est

X

post

post cibum uomere. de morb acut.

8 Sæpe iam repetit Hipp. uomitum ad purgationem crassiorum & lentorum simul humorum in uentriculum confluentium, facere plurimū. Iam nemini uomere quotidie assuefacto uomitus prohibetur. Illis uerò, qui rarò, non cōceditur. in Hipp. de natura humana.

9 Motus post potum uehementior, uomitum mouet ex humorum ad superiora elatione, quod in nauigantibus cernitur. 4 Aphorif.

10 Quæ ad uomendum exhibentur, lente sumi debent, ut per otium liceat hīs, quæ in uentriculo sunt crassiora incidere atq; attenuare. in Hipp. de natura humana.


11 In hīs qui temperamēto sunt bilioso, si bilis uentrem superiorem peccat, per uomitum expellēda est, post exercitationes aqua propinata, nam uino tunc utēdum non est, nisi difficulter uomāt ex aqua. Quippe eiusmodi quædam naturæ sunt, quibus uinum dulce, ubi aquā præbierint, est

est concedendum. Præterea etiã ma-
gis ubi temperamentum eorum ab-
initio, calidius siccius q̃ fuit, uomitio
petenda est. Quin & exercitari his u-
tilius, non acutis exercitationibus &
præuegetis, sed potiùs tardis & mol-
libus. 6. de sanit.

12 Cerebrum omne cibus pituito-
sior crassiorisq̃e succi. Eccitat uerò
nausẽã omninoq̃ uomitioni est ac-
commodatius, si concinnatum cum
incidentibus. & calefacientibus fue-
rit, ueluti oleo liberalius coctum
& post cibum datum. 3.
de alimentis.

X 2

DE



Vtrida ulcera quum
ambientes partes de
pascunt, nomas pro-
priè appellant. Qui
affectus uehemētis-
simis medicamentis
indigent, ut sæpe etiam in ijs, cante-
rijs utamur. 5. de comp. secundum
loca.

2 Carbunculus ulcus est crustam
citò cum ualida phlegmone circum-
stantium particularum excitās, adeò
ut febres uehementes & extrema pe-
ricula inferat. Quare ipsi particulæ la-
borati quod ad inflammationem at-
tinet, imponi cataplasma oportet q̃
ex plantagine cōficitur, aut quod ex
discocta lente, scilicet miscendo his
micam panis, qui furno sit coctus. Su-
per ipsum uerò ulcus ualēs aliquod
medicamentum cuiusmodi est An-
dronis, &c. Liquariq̃ cum uino dul-
ci ad

ci ad sordium crassitudinem dedebit. Scarificari etiam post sanguinis missionem alienum non est, sed incisiones altiores mediocribus propter infestantis humoris crassitudinem esse debent, & inflammatione cessante ad cicatricē similiter reliquis perduci. Ibid. & 14. Methodi.

3 Sinus liquidioribus: Caua uerò in superficie corporis ulcera pharmacis crassioribus indigent. Quare merito id genus uitij, ceratū ualde abstergentibus admiscemus in sinibus oleum uel rosacei plurimū. 2. de cōp. secundū genera.

4 Quibus inter pulmonem & thoracem iucceuerunt puris sordes, hi nunquam nisi multitudine empyematis præmente (quod ex sputo ceratur) cauterio sunt curandi. in 6. Aphorism.

Addit Moyfes.

Non contradicit ijs, quæ secundo de simpl. dixit, nisi enim summa sit necessitas, non præcipit cauterium.

5 Cauterium neq; ferro, neq; me-

X 3 dica

dicamentis, urentibus adhibendum, nisi quando ingens morborum vis fuerit, & humorum magna corruptio, quale quiddam accidit ulceribus ægrè sanabilibus, & malignis. 6. in 6. Epid.

6. Hydropicum refecare ventrem non est tutum, nisi si quando tanta humoris putrefacti copia est, ut virtutē prorsus obruat. Pulmonis autem ulcus maturè aperiendum antequam putrescat 7. in 6. Epid.

7. Postquam ulcus secueris & pus uacuaueris cauendum est, deinceps ne oleum aut aquam imponas. Quod si quando uulnus abluere oporteat melicrato, uel oxycrato, & uino, & mullo est utendum. 2. ad Glau.

8. Ulcera maligna, acriora medicamina postulant, & quæ igneas vires possideant, quale est miseri Chalciis, Arsenicum calx, atq; sandaratha. Sæpe uerò ubi ista cesserit admouemus ignem. Ibid.

9. Putredini apta medicamenta sunt, oxymel, farina, orobilolij, uer: itē faba-

fabacea, sal Trochisci Andr. Polyidæ
Passionis, &c. Ex quibus diligendū
cuiq; parti maximē congrua. Ibid.

10 Cānceri morbum per sui initia
sæpe sanauimus medicamentis, quæ
atram bilē educerent, ubi uerò in mo-
lem insignē attollitur curari sine chi-
rurgia nō potest. Nempe toto quod
uitiatum est exciso. Non caret tamen
id periculo proflauij sang. ob uasorū
magnitudinem præsertim si fuerint
arteriæ. Quod si laqueo excipias, per
consensum afficiuntur continuæ par-
ticulæ. Sin radices exurere uelis, non
deest & principibus partibus peri-
culum. Ibid.

11 Incisæ post aures arteriæ graui-
oribus capitis affectibus multū pro-
sunt. cuiusmodi sunt hemicrania, uer-
tigo, caros, &c. At si quando uapo-
res noxij sursum ad reiformem plex-
um ferantur, tum nō ita fortasse po-
test hæc incisio conferre. . . de locis
affect.

12 Vbi neruus punctus est, dolo-
rem qui ex necessitate incidere huic

X 4

quām

quàm reliquis partibus maior solet
 exsentiendi quod obtinet acumine,
 imprimis mitigare commodum est,
 & cutis uulnus apertum inglutina-
 tumq; custodire, quò per id ex neruo
 uulnerato sanies effluat, totumq; cor-
 pus superuacuis humoribus libere-
 tur, & phlegmones generatio prohi-
 beatur. Tertiùs uerò etiam fuerit si
 quis cutem latius incidat ac totũ cor-
 pus sanguinis missione inaniat, utiq;
 si fortis sit uirtus. Si uerò uitiosis suc-
 cis repletum sit corpus protinus pur-
 gare medicamentis humori dominan-
 ti commodis. Aqua uerò calida non
 ut ne humida iam ex se substantia in-
 terum excoacta, & humectata solu-
 uatur ac putrescat, sed potius oleo ca-
 lente fouere, ut omnis sic materia dis-
 geretur. 6. Methodi.

13 In Cancro, ubi totum quod uis-
 tiosum est excideris, sic ut nulla su-
 per sit radix, si ne effluere sanguinẽ,
 nec properẽ eum inhibebis, sed pri-
 mendo potius uicinas partes, ex pre-
 mes ex ijs succum crassiores, mox a-
 lijs si

his similiter ulceribus curabis, ultimo Methodi.

14 Strumæ, glandulis in scirrhum affectum mutatis factæ, his maxime, quæ uel salinam, uel lac, uel genitale semen, uel pituitosum quendam humorē in mesenterio, faucibus uel larynge generant, curandæ similiter alijs partibus ad quas tum uenæ, tum arteriæ perueniunt. Ut reliquarum, quæ quod in medio uasorum in diuerfas partes diductorum habent, implent pro cuius diductionis firmamento sunt, earum inquam alia curationis est indicatio, qua simul cum uitio pars ipsa tollitur. Quod fit dupliciter, nempe uel totum quod uitiatum est excidentibus, nobis ueluti in Cancro, uel putrescere id medicamento cogentibus. Ibid.

15 Abscessum exteriorum, quæ Atheromata, Steatomata, & meliceres à similitudine contentorum dicuntur, curationis indicationes sunt communes, id uidelicet quod continetur, uel digerere, uel putre reddere, uel

X s exci-

excidere. Meliceris igitur à contento humore mellis simili sic dicta, triplicem illam admittit curationem, Atheroma uero duplicem quippe quod tum excidere, tum putrefacere tantum licet, Steatoma unicam manuum operationem, excisionem cum nec putrefieri possit nec digerit. Ibid.

16 Amouendarum cicatricum pterygiorum, & similium per chirurgiam ratio, tripliciter indicatur. Prima est ut quod maxime tempestive potest cures. Secunda ut citra dolorem. Tertia ut tuto & certo. In quo postremo tria sunt propria quibus intentus sis oportet. Vnum primumque ut omnino absolutionem operis consequaris. Alterum ut certe non ledas, si non assequaris finem propositum. Tertiū ut uitiū ne ut aduertatur prohibeas. quibus consideratis cognosces chirurgiæ potissimum, aut quando medicamentorum ope sit curandum. Ibid.

17 In excisione, plerumque cum affectu ipso etiam pars affecta exciditur, ut

tur, ut in herniosis aliquid peritandi
in testiculis & cruribus, una cum uar-
icibus ipsæ uenæ. Sic in naso tunica
cum polypo, & foratus dens cum fo-
ramine. Ibid.

18 Pterygij sanatio dum paruum
adhuc est & molle, per ea quæ deter-
gent perficitur ut sunt trachomatica.
ubi magnum durumq; euasit, chirur-
giam postulat. Ibid.

19 Vbi multum puris erit in ocu-
lo, uacuabimus diu sa tunica, q̄ cor-
nu est specie, paulò supra locum quo
cōmittūtur uniuersæ tunicæ (quæ vo-
cant irim seu coronam) aut per medi-
camenta, quæ paulatim expellāt, aut
cōcussione ut ab eo loco defluat hu-
mor. Ibid.

20 Medicamenta detergentia si-
mul & excalfacientia laxatis inferius
columellis, nec tamen inflammatis
mirè conferunt. Eas autem excisione
curare consueuimus, quando præser-
tim albiiores & sanguinis inanes fue-
rint. 6 de comp. secundum loca.

21 Oculus quādo acerrimè est sen-
sus,

sus, si quando sit læsus mitiora medicamenta infundi sibi postulat' quale est oui humidum ophthalmicis mixtum, superiorem genam, primum leuissimè attollendo, nullaq; cōcussione quemadmodū in capite, facta. 13. Methodi.

22 Oculus totus cōtrahitur, & intrò pellitur ex cōuulsione excisæ corneæ tunicæ, effluitq; humidum aliquid tenue album & liquidū, ea parte, qua acum affixerit chirurgus, qui est humor noxius. 10. de us. part.

23 Conuulsioni nerui conferunt, quæ ab alto saniem educunt omnia, sed commodissima sunt, quæ cū mediocri calore exiccāt. 3. de comp. per genera.

24 Conuulsioni nerui conducit sulphur, quod ignem expertum non sit, quodq; lapidosum non est, sed omninò tenuium partium, si tantum eius tenui oleo mixtum sit, dū quod ex utrisq; mixtum erat, sordium balnei habeat similitudinem. Item Terebinthina resina per se quidem in pueris, &

is, & mulieribus, & ijs generaliter, qui non sunt carne. Cum Euphorbio uero in ijs, qui dura non secus autem & propoli non per se modo, uerum etiam cum Euphorbio mollita. Quod si durior esset, cum tenui quopiam oleo, quin & sagapeno in duris corporibus sit usus utique cum oleo & terebinthina id miscendo, sed & opopanax ad eundem modum, quo & sagapeno. Et lota calcem oleo similiter admixta, & applicata. Maxime si marri per æstatem sub æstu caniculæ lota sit. 6. Methodi.

25 Si multum cutis est adaperturn & nervus per directum diuisus appareat, non iam Euphorbio & similiter acribus, quæ emplastri modo applicantur uteris, sed calce optimæ elota, in multo oleo soluta, & calida applicata, aut pompholyge similiter lota, & largo rosaceo liquato siue sale, tamen applicato. Ibid.

26 Humoris, qui in hydrocelis uisitur, sicut & aquæ in ascitis contenta uacuationem, uel medicamentis, quæ

que digerant molimur, uel chirurgia
in hydrocele quidem immisso sypho-
næ, in ascite uero adhibita punctio-
ne (quam paracentesin uocant) exci-
sa quadam parte peritoneo. In colu-
mellas uero non erit properandum,
ad eas excidendas, sed quando exiles
erunt, & ad loci tenuitatem redactæ.
ultimo Methodi.

27 In uulneribus uentris principio
id agendum ut recondantur, si quan-
do intestina exciderint: ne in tumo-
rem surgant, & per angustum fora-
men imitti nequeant. Secundo ut
sumat. Tercio medicamentum impo-
natur. Quarto ne qua præstantior
pars inde simul afficiatur. 6. Meth.

28 In uulneribus uentris situs la-
boranti appositus fuerit, cum in infe-
riore parte factum uulnus est, si sur-
sum uergat, cum uero in superiorib.
si deorsum. Ex qua ratione conueni-
et, si in dextris sit uulnus corpus in
contrariam partem inclinetur. Si ue-
rò in sinistris, in dexteram, sicut quæ
uulnerata pars est semper altiore
locum

locum occupet. Ibidem.

29. Omni recens facto uulnere, nisi in uentre sit expedit ex ipso statim, sanguinis plus minusue effluere, quippe phlegmone minus tentabitur, tunc ulcus ipsum, tum quæ illi sunt circumposita loca. 4. Meth. ex Hippoc.

30. Sanguinis eruptionem ex uulnere putrefacto sistendum est, uel crustificis medicamentis, uel ignitis feramentis, uel certe pro incrustantibus medicamentis, uti pharmacis astringentibus. melius erit, qualia sunt, Chalcitis misq, atramentum, si quæ siue uistis, siue crustis. At si ex uasis effluat sanguis, prohibendus est, aut ad contraria reuellendo, aut ad uicinas partes deriuando, aut totum corpus refrigerando. Præcipue uero partem afflictam frigida pota, uel infusa, aut pusca & uino acerbo, quod *στυφνόν* uocant, aut alio quodam astringente medicamento refrigerandi uim habente. 5. eiuldem.

31. Cui sanguis ex alto uulnere profluit, si uena sit unde profluitur citra uin-

uinculum medicamentis suppressendi sanguinis uin habentibus res tentanda est, qualia sunt emplastica ex frisa resina, & farinae triticae tenuissimo polline & gypso, & alijs id genus confecta Sin sit arteria duorum alterum aut uinculo amplexi, aut tota praecidere utique transversam. quod praecipue in his fit, quae ex profundo loco assurgunt commodè praesertimque per angustas, uel principes particulas. Quippe ita retrahitur utraque pars ad se relaturque ac integitur superiacentibus corporibus uulnus: tutius tamen est utrumque facere, & uinculum uasis radici inncere, & quod deinceps habetur praecidere. *Ibid.*

32 Ulcera inueterata per sanguinis missionem crebro curamus. Quod si pars affecta uel humore nigrescit, uel rubra iam conspicitur sanificationem addimus. Exin sponsa sicca magis quam humida detergemus, tum & medicamenta exiccantia apponemus, uenamque postea iterum si sit apud secantes. 4. Methodi.

33 Ulcerum labra si sint dura, callosa, liuida & nigra, excidere ad uinū non est dubitandum. Sin diuturnum sit, lentē uacuandum. Ibid.

34 Fistulam à medico aperiri, non nisi post diuturnū fluxum suppressam tutò licet. 2. in 6. Epid.

35 Ulcera maligna etiam clystere ex mulsā & cineris aqua purgare licet. Minus autem mulsæ ubi infirmior ægritudo est requiritur. Item ex uino & mulsā, sed mulsā melius deterget. Vbi autem his ritē purgatus est locus affectus ex solo uino, bonū est clysmo uti, deinde unguentum proprium apponere, quod spōgia uino madefacta ulceri alligetur. Ligandi autem modus esto, ab inferioribus ad os usq; ulceris stricto emplastro. Idq; ternis quibusq; diebus soluto, & renouato unguento. Quod si forte inferius dolor iaceat, labrum uerò ulceris superius, ita ut commodē dolori applicari medicamen nō possit, excisione inferius ad dolorem facta uacuandum erit. 2. in 6. Epid.

Y

36 Affe-

36 Affectus unde primum maximumque imminet periculum, primus curari atque etiam interdum solus debet, ut cum ex uena arteriaue sanguis immodice profluit, si totum uas per transuersum praecideris, ulcus quidem eius postea sanare non poteris, periculum tamen quod ex sanguinis profluvio impendebat, sustuleris. Sic neruum punctum saepe cogimur transuersi praecidere quoties uel conuulsiones, uel deliria, uel ambo magna aegreque sanabilia, superuenire uulnerationi cernimus. Similiter ubi luxatio cum ulcere, in aliquo maiorum articulorum incidit, ulcus prius sanamus, luxationem insanatam relinquimus. 3. Methodi.

37 Partium quae cum aliquo praeter naturam tumore exulceratae sunt, earum prius sanandus est tumor. Vbi autem labra tantum ulceris decolorata durave plusculum fuerint, excidenda ea sunt ad sanam usque carnem. Sed si altius serpiunt deliberatione est opus excidendum ne, quod praeter

ter naturam cernitur, an temporis
spacio curandum, & consulendus æ-
ger. Ibid.

38 Optimum omnium quæ noui
medicamentorum, quo etiam ad ce-
rebri membranarum, & sphagtidū
uenarum hæmorrhagias tutissimè u-
temur, est quod subiiciā. Recip. Thu-
ris partem, aut eius mannæ, i. Aloës
partem s. misceantur ita, cum oui can-
dido, ut perueniāt ad crassitudinem
mellis, postea lepōris mollissimis pi-
lis excepta, tam uasi, quàm uniuerso
ulceri liberaliter admoueantur, allig-
genturq; foris. Scus fascia ex tenui
linteo, cuius fasciæ primi quatuor
quinque uel amplexus, ipsi profluen-
ti uasi inijciēti ducunturq; mox uer-
sus eius radicem, nisi quibus partib.
id non licet, ut in cerebri inuolucris.
His factis ubi tertio die solueris si tu-
tò adhuc medicamen ulceri adheret,
aliud rursus sup impones deligabis-
que ut antea. Si uerò prius linamētū
deciderit, impones alterū, ac sic quo-
ad carne muniatur curandum uas e-

Y 2 rit,

rit, particula uulnerata à principio fur-
pina mediocriter seruata. 5. Meth.

39 Quæ de profundo erumpunt,
nec uinculo, nec deligatura, nec cau-
terio, sed reuulsior & ad uicinia loca
declinatione, nec non cibo & potio-
ne emplasticis, refrigerantibus, & a-
stringentibus curanda. Ibid.

40 Varijs autem instrumētis, pro
partium proprietate id fiet ueluti, in
intestina per clysterē, in uterum per
metrenchytas, in uesicam per cathe-
teras medicamenta, immittuntur. I-
bidem.

41 Phlegmone suppurans nō est
incidenda protinus, sed digerēda me-
dicamentis ad id ualentibus. Quod
si quando puris copia medicamen-
torum uim superet secare abscessum
oportet, eò potissimum loco, quo est
editissimus. Post sectionem medica-
men quod sine morfu siccet impone-
re. Si uerò computruisse aliqua por-
tio uidebitur excidi etiam eā necesse
est, sectione myrthi folij, figura non
planē magna longitudineq; maiori,
quā

quàm latitudine, in inguine per trāfuerſum ducta: non autem per rectitudinem membri. Nam ſic cutis, dum membrum flectitur melius ſibi applicatur, & tandem manna affectam partem implere. 13. Methodi.

42 Si ab humida ſubſtantia aut lēta, & craſſa ſimilarium corporum, aliquando membrum offendatur (nam intermedia illorū ſpacia, ut plus uel minus, huius uel illius humoris continent, ſic membrum ostendunt) purgare ipſum oportet incifione, uel medicamen abſtergente. Primū, tum humiditatem ipſam medicamentis membro appoſitis repellere. Gal. in arte medicinali.

43 Si eas quæ ex fluxionibus ſiūt inflammationes ſcarificaueris magnum adferes malum, ac per initia præſertim. Quæ autem iam in ueterate exiſtunt, & poſt totius corporis uacuationem, quaſdam durities atque nigrities retinent, ab his per ſcarificationem auferre ſanguinem nil prohibet. 2. ad Glauc.

Y 3 44 In

44 Inflammationem curaturum principio uacuare totum corpus oportet. Deinde inflammata particulam profundere & linire, ijs quæ repellendi quod influit uim habeant. Vbi uerò non amplius humores influunt, sed quod prius fluxerat hæret iam membro impactum, scarificare. Ibid.

45 In quibus difficulter tumor ad suppurationem peruenit, nec facile discuti potest, sed suspicio est humores crassiores, & tenaciores ibi impactos esse, in ijs tamen conueniet, ea quæ fit per profundiores scarificationes curatio. Cōuenit etiam id quod ex caricis pinguibus, dulcibusq; & decoctis conficitur cataplasma. Cuius præparatio est hæc. Decocto caricarum adijce aliquando farinā hordeaceam, aliquādo panem syncomistum. Hoc est, miscellaneum, qui ex generoso confectus sit tritico. Ibid.

46 Quoniam in ipsa ulceris primæ carnis generatione duplex excrementum oritur: alterum quidem tenuius,

nuius (quod in ulcere sanies dicitur)
alterum uerò crassius, quod nuncu-
patur sordes. Atque ex tenui quidem,
humidū ulcus redditur, ex crasso au-
tem sordidum: Duplicibus sanē me-
dicamentis est opus, siccantibus pro-
pter humiditatem, & expurgantibus
propter sordes. Qualia sunt, thus hor-
deacea, fabacea & carni farina, irides
radix aristolochia, panax (quæ cæte-
ris plus siccant) Cadmia atque pom-
pholix, ex his pro corporis natura &
ulceris erunt quæque deligenda. In hu-
midiori ulcere illud, quod magis sic-
cet, in humidioris corporis natura, quæ
minus. Siquidem quatenus natura
naturæ interest, ex ulceribus æquè hu-
midis, quod in sicciori temperamen-
to consistit, utique magis siccari postu-
lat, quod uerò in humidiori, minus.
3. Methodi.

47 Glutinatorium medicamentū
nec deterget, nec expurgat, sed pror-
sus substantiam omnem in idem co-
git, quare plus siccet, oportet quàm
quod carnem producit. Huiusmodi

Y 4

autem

autem sunt austera & astringentia, ut galla immatura, malicorium, & Aegyptiæ spinæ fructus. Quemadmodum multò siccior quod cicatricem inducet, quàm quod agglutinabit esse medicamen oportet, cuiusmodi Chalcitis, æs ustum, squama æris, mīssū, quod cæteris ualentius existit. ibi dem.

48 Sternutamenta iuuant præcipue illos, q̄ capitis grauedine, ob cerebrum crassis uaporibus oppletum tenentur. Atq̄ inde obtusius olfaciunt: qualia ex nigella oleo intrita inspirantibus ægris, & capite resupino instillare naribus soleo, idq̄ prius ore aqua repleto, Gal. de instrum. olfactus.

49 Recitauit mihi quidam, cū inueteratū ulcus in coxa habuisset, doctum quēdam medicum consulisse, qui uena in brachio. primū ternis diebus incisa, tum medicamentis purgantibus adhibitis, & ulcere postremū curato sanitati sic restituit, Gal. de atra bile.

50 Timidum incisuro morbum at-
tractare, & partes affectas tangere le-
niter fingendum, ut facilius dolorē
fallat. Antidoto 3.

51 Ossa iuuenum fracta glutinari
prius, quàm puerorum dixit Ascle-
pius. Quia pueris opus sit cibis etiā
id quod solutum est reficientibus ac
cōplentibus, non medicamentis tan-
tum. in 1. Hipp. de reductione ossiū.

52 Post quadriduum, os luxatum
ad situm naturalem reducendum nō
est, alioqui plurimum lēditur æger,
ut periculū sit maioris morbi. Ascle-
pius in 3. de reductione ossium.

53 Galenus uerē, coalescere (inquit)
nequeunt ossa iuuenum adolescen-
tum, nec non senum, ob eorum maxi-
mam siccitatem duritiemq̃, at quæ
abundē sunt mollia qualia in pueru-
lis cernuntur, ea sola unionem reci-
piunt. 3. Methodi.

54 Certissima transpositionis fra-
ctorum ossium indicatio ab integro-
rum exemplari sumenda est. Ibid.

55 Quæ per transversum fracta
Y 5 sunt

sunt in directum, & cōtrarium agenda, quę retrorsum ea prorsum magis impellenda, altera fracti ossis ad contrarium etiam ducta. Quę uerò prorsum, hæc retrorsum reliqua parte similiter sensim prorsum ducta: sicq̃ de cæteris differentijs adhibita cautione in contrario illo motu, ne extantia fractorum ossium frangantur. Ibid.


55 Commissorum ossium deligaturam non admodum arctare oportet, ut comprimat fracturam, nec remittere ita ut sit laxa. Sed pectori quidem latissima fascia, artubus & iugulo angusta congruit, uersutum tamē numero amplior illa esse debet. Ad hæc eius principium super fracturā inijciendum bisq̃ terue circumducendum, tum ad membrum reliquū dispensandum. Splenia etiam cum fasciis exterioribus adhibenda, tertio uerò die soluenda ne dolor aut pruritus creetur. Reponere autem figura à dolore omninò imuni, in brachio quidem angulosa, in crura uerò quę
pau

aulò minus porrecta sit, &c. Ibid.

DE MORBIS

mulierum.

SECTIO XV.



Non deprehenditur morbus ex menstrui sanguinis suppressione ortus, ne secundo quidē mense, nisi admodum obscure. Tertio uerò ubi matrix iam plena est, nec capere ampli⁹ potest, fursum regurgitare quod denuò fluit cogit, ita morbus suffocationis cernit. Gal. in Hipp. de morb. mul.

2 Quæ ex cruribus fiunt euacuationes, menses promouent, si tribus quatuorue diebus ante tempus consueti mulieri circuitus administrent, idq; aut uena incisa, aut scarificatis unius cruris talis, atque inde exiguo sanguinis euacuato. quod & postero ac similiter faciendum erit, sic tamen ut quibus diebus uacuas, atque quatuor, aut quinque potius ante illos mulie-

mulieri extenuantem uictum institu-
as. Menses etiam abunde prouocant
nepita, pulegiumq; in pollinem reda-
cta & melicrato cocta, maxime à bal-
neo etiamq; linteo inuolutis propi-
nata. Sed ualentiora sunt, fauina &
dictamnium, ususq; eorum illis simi-
lis: hoc tempore uerò hiera picra da-
tur, illa potissimum in cuius compo-
sitione, centum aloës drachmis, aliorū
medicamen senæ tantum miscentur,
cum cinnamomo. Galen. de uenæ.
sect.

3 Sanguinis retenti causa est, uel
uirtutis attrahentis imbecillitas, uel
uenarum matricis obstructio, uel e-
iusdem contractio. Gal. in Hipp. de
morb. mul.

Addit Moyſes.

Hæ causæ (Lector) sumptæ sunt ex
ratione continentis cū etiam fluit
sanguis, non ex contenti ratione ubi
iam defecit, siccatusq; est.

4 Menstrua nullo in mammis ap-
parente lacte suppressa his notis indi-
cantur. Grauitas enim totum corpus
infe-

manifestat & fastidium atq; horror inæ-
qualis. Item lumborū & colli ac syn-
cipitis dolor, qui ad oculorum usque
radices extenditur præterea febres
ardentes nigricantes urinæ, cum ru-
bra quadā sanie, proinde ac si aquæ
in qua nuper macinata carnes ablute-
runt fuliginem quis miscuisset. Qui-
busdam urina supprimitur aut diffi-
culter redditur. Si autem per alium
corpus corporis locū effluerit san-
guis, aut inflammatio, uel erysipelas
excitetur, an menstrua purgentur in-
terrogabis. Si quidem nil horum acci-
dere solet ijs, quæ integræ sint repur-
gata. 6. de locis aff.

5 Quemadmodum uirorum qui-
dam effœminata carne, id est, mollī
delicataq; & minimis etiā noxis ob-
uia sunt, sic mulierum quædam robu-
sto ualidoq; corpore cōstant non cui-
uis periculo, obnoxio. His sanē medi-
camenta menses euocātia minus pro-
fuerint. 2. in 6. Epid.

6 Nonnūquam ex ocio & nimia
quiete coalescūt humores superflui
in ue-

in uenis matrici coniunctis, quos ipsa matrix attrahit, inde uerò & uteri dolor esse potest. Gal. in Hippoc. de de morb. mul.

7 Omnia quæ genitales partes cōstituunt uasa testes nutriētia, principia uasorum, & in masculo & fœmina eadem uidentur, ac omninò & numero, & substantia conuenientia, sed positione magnitudine eo differentia, quòd fœminæ intus, masculi forâs existunt. 2. de semine.

8 Quibus uterus aut sursum, aut ad latus reuellitur inguinibus, & coxis cucurbitulas applicamus: narib. quidem ea quæ foetidissimum habent odorem, matricibus autem odorata & ea quæ laxare calfacereq; possunt. Quod si sequatur animi deliquium ob uentriculi imbecillitatem, ea quæ roborandi uim habent oportet emplastra adhibere, quale & quod fit ex palmulis, uino, farina ordei, croco, aloë & mastiche, plurimum uerò iuuat sic affectos extremorum frictio, &c. 1. ad Glauc.

9 Vre-

9 Vteri inflammationes magis, q̄
renum à uenis in cruribus sectis iuuat
tur: quæ enim ex cubito fiunt euacu-
ationes, purgationes menstruas re-
primunt, sanguinemq̄ retrahunt ad
supernas corporis partes, atq̄ uentri-
culo sic nocent. Gal. de uenæ sect.

10 Mulier quieta, si menstrua faci-
le emittit, minus coitū appetit, quia
humores superflui à quib. irritari ma-
trix solet toto corpore affluxerūt Ga-
len. in Hipp. de morb. mul.

11 Conuellitur matrix, quemad-
modū musculi & spina, & ossa, quan-
do nimio sanguinis effluxu siccata il-
la manent: at suffocatur cum ex sup-
presso sanguine completa, undique
natar, uasaq̄ omnia (quib. plurimis
abundat) tendonesq̄ & ligamēta ple-
nitudine tendunt ac sursum trahunt,
quò motu & uētrīculus, & diaphra-
gma ita uexantur, ut nec spiritus mīt-
tere diaphragma possit, nec uentricu-
lum officium suū facere. ita in morb.
mul.

Sed in 6. de locis aff. q̄ est ultimus.

Agita-

Agitationis uteri(inquit) quam mulieres percipiunt, non est causa ascensus eius usq[ue] ad regionē diaphragmatis, ut nonnulli putant, sed uteri ipsius tensiones, potius: qui tangentib[us] obstetricibus modo sursum, modo in lacus retrahi uidetur. Et paulò post.

12 Quę citra peruersionem aut retentionem mēstruorum uiduas molestant noxę, hæ ob retentum semen euenire putantur. Pro multitudinis autem qualitatis'ue ratione ipsorū menstrui & sanguinis, aliàs aliæ accidentiū species oriri solent &c. de hoc multa in eo libro.

13 Nuper quidem uidi uiduā mulierem, cui cum uitiatum semen ex retentione cōputruisset, matrix, uti obstetrix referebat, sursum contracta atque suffocata erat. Huic igitur medicamēta consueta, nempe aromatica, et calefaciētia manu immitti iussi, ex quibus statim leuem spasmum, ueluti in coitu passa, mox eiectis crassioribus, qui in ea constiterant humoribus

bus conualuit. 6. de locis affect.

14 Profluuium sanguinis in grauida muliere, ab eruptione uenarum in ceruice matricis positarum, nō ab ijs, quibus in interiore utero annexę sunt, secundæ semper est. Gal. in lib. de morb. mul. & in 6. de locis aff.

15 Mulierum corpus si pauco tēpore multum augetur, aut si singulis mensibus plurimū sanguinis excernat, signum est maximi cum humiditate caloris iuncti. de morb. mul.

16 Venter, utraq; uesica, & uteri, ubi uel multitudine eorum, qui continent grauantur, uel qualitate mordentur quod offendit abijcere properant. Quorum utrunq; aliquādo uio lenter incidit, eoq; casu prouocatur abortus, qui uel medicamen eū prouocātia, uel tensionem uteri semper sequitur, sicut partus motiones uehementissimas foetus. 3. de nat. facult.

17 Prauas qualitates appetunt iij, quibus uentriculi tunicę sunt, prauo aliquo excremento imbutę, ueluti mulieres prauis succis refertę potissimum

Z mum

mum ubi uterum gerunt & acrida, amara, carbones, lutum & similia appetunt, qui affectus citra seu pica dicitur, duratq; quibusdam ad tertium mensem alijs ad quantum usq; , dum foetus nutriri coeperit, & illa uel uomitu eiecta sint, uel ui uentriculi concoquantur. Cibos autem non capiunt, unde & marcescunt. 2. de sympt. causis.

18 Mares dextris, foeminae sinistris uteri partibus magis continentur, atq; raro aliter accidit. 6. de locis affect.

19 Similiter proprie conceperit, secundo autem aut tertio, aut quarto mense foetum eiecerit, circa uteri acetabula humorē pituitosum abundat, atque ideo uasorum ora eius loci debiliora, quam ut foetū ferre queant. Ibid.

20 Praegnantium pulsus, maiores, crebriores & celeriores sunt, caetera uerò tuentur. In eis siquidem praeter usum, priorum mutatum est nihil. In crescit autē his & augetur, quod mulier

lier non sibi iam respiret ac pulset, sed
foetui etiam. quare celeriores, maio-
res & crebriores fiunt pulsus. 3. de
caus.

21 Formatur foetus in utero 35.
aut quadraginta, aut certè 45. dieb.
Mouetur eodem numero geminato:
nascitur aut hoc ipso triplicato. Gal.
in 4. de uict. ratione.

22 Foetus membra interdum con-
tingit phlegmone tētari, quod fit po-
tissimum in difficili partu, sanguinis
menstrui suppressione, partim ex co-
natu & uehementi mulieris agitatio-
ne. 2. in 2. Epid.

23 Superfluous & inutilis crassus q̄
sanguis post partū ad matricem cogi-
tur aut hæret, lenitutibus & inciden-
tibus cibis est prouocandus, ueluti
ptisana & similibus. 6. in 2. Epid.

24 Nutricis lac si sistitur aut si defi-
cit ægritudo est. Sin abundat, robur
& mammillarum integritas. Gal. de
morb. mulierum.

25 Mulier concipiens si lac emi-
serit, foetus infirmus erit, utpote a mā
Z 2 mil-

millis attrahere sanguinem non satis ualens, at si firmum durumq; continetur, ualidum fore signum est. 6. in 2. Epid.

26 Matres lactare infantes suos omnes decet, siquidem earum lac cū eiusdem, cum sanguine & natura infantis substantiæ sit, multò melius ceteris semper erit. Quod si non potest ipsa, aut si ipsum in ea sit corruptum ex quàm simillimo nutriri oportet. in lib. de uictus ratione.

27 Concretio & coactio sanguinis in mammillis signum est futuræ in muliere mania. in 2. Epid.

28 Cū Boëthi uxor laboret muliebri profluuiō cui superuenit, postea grandis in uentre tumor tractareturq; ab obstetricibus, proinde ac si prægnaſset contigit, ut in prima balnei domo grauissimus dolor eam inuaderet. Ab eo uerò aquosæ humiditatis, adeò grandem excreuit ut animo protinus linqueretur. Igitur clamore muliercularum audito, insilio actutum, eamq; in ulnas excipiens

piens nardino unguento os uentris
perfricui, iussiq; astatibus ut pertitis
officijs hæc manus concalfaceret, il-
la pedes, aliæ bene olentia naribus
admouerēt. ita sanè quàm celerrimè
illam restitui. Gal. de Præcog.

Idem paulò pòst.

Ea quibus profricabatur uentris
regio, erant mollissima & præhumi-
da. Humiditas autem illa, quæ erat
affecta per siccantia simul & calfaci-
entia ex communi medicorum, qui
confluxerant cōsilio curata, hoc mo-
do. In maris arena & quidem excal-
facta eam reclinauimus. Dein talem
hunc uictum institui, ut quam mini-
mo potu uteretur, frictiones & un-
ctiones uniuerso admoueret corpo-
ri, q̄ solo melle cōstarēt: primū qd̄ e-
lixato q̄ optimè, dein instar fontanæ
per æstatem aquæ refrigerato. Non
solū autem per cutim illas superflu-
itates humidas digerendas indicaui,
sed etiam per uesicam urinis, & per
alium medicamentis soluentibus.

Idq; diebus septem ab illa magna ua-
cuatio-

Z 3

cuatio-

uatione factum est, tum diebus binis sequentibus medicamento aqua ducente curavi, & simul asari apud decoctum propinaui. Quo facto cum nil iam profluuij appareret, rursus tertia modicum quiddam ex medicamento aluum purgante exhibui. Posthuc singulis diebus melle illeui corpusque perfricui mollissimo primum linteo, postmodum asperrimo. Victu interim uel ex carnibus montanarum auium, uel ex saxatilibus fuscib. praescripto. Quibus per quindecim dies peractis, ne minima quid affectus nota extitit, & bene colorata reddita est, Mense demum exacto Boë-

thius 400. aureos dono
mihi dedit.

DE

DE SANITATE TUENDA.

Sectio XVI.



AD sanitatem tuendam nil ocio & gerte diuturna peius, neq; exercitio moderato melius: adhibita tamen cautione, ut ante cibum fiat. nam qualiscunq; post cibum motus, alimentum ex uentre, crudum in diuersas corporis partes distribuit. Gal. de Euch. & cacoch.

2 Hippocrates in 6. Epid. Diuturna (inquit) sanitas est saturitarem & ociū fugere. ubi Gal. Omnibus (ait) cuiuscunque affectionis hominibus semper profuit post cibum largiorē abstinencia.

3 Motus sit non omnino nullus, ut eorū qui dies noctesq; totas chartis inuigilant, sed mediocris & æqualis, id est, ita compositus, ut quælibet pars suo ordine & pondere iusto mo

Z 4

uea-

ueatur, non externæ tantum, sed etiam internæ, neruus, musculus, caro, uenæ, arteriæ, &c. Gal. de somno & uigilia.

4 Duplicem scopum efferationis uictus oportet unū, ut quod exhaustum est similibus naturæ partibus instauretur: alterum, ut quæ relicta sunt excrementa expellātur. His enim duobus facile tertium remoraberis quod est senectus. i. de sanit.

5 Calor naturalis curæ in primis esse debet, quare danda opera est, ut hunc q̄ maximè & foueas, & iuues exercitijs non solum corporis, sed etiam animi. Ibid.

6 Exercitatio, cibus, potus, somnus, uenus omnia mediocria, eiusq̄ ordinis, quo hæc uerba sunt posita, fieri debent. 6. in 6. Epid.

7 Veneris scopus sit corporis alacritas, non dissolutio: accedaturq̄ ad eam corpore non calido, neq̄ supra modum frigido, non uacuo, neq̄ repleto, non humido neq̄ sicco, sed temperato. Quod si in alterutrā partem pecca-

peccatum sit, in humidum & calidū
potius sit uitium quā cōtraria. Ga-
len. in arte medicinali.

8 Venus ei, cui ex intemperie cali-
da fuliginosus humor in corpore cre-
uit pro optimo semp habetur reme-
dio: siccatur enim & refrigeratur ex illa,
qua laborat intemperie corpus. 5. in
6. Epid.

9 Capiendo cibo non post balne-
um aut aliud uehementius exercitiū
omninō hęc cautio esse debet, ut nō
ante quā flatus & anhelitus resede-
rint, capiatur. Alioqui enim in stoma-
cho crudus natat, calore nimirum à
quo oportebat concoqui per exteri-
ores corporis partes latē sparso, & ca-
put grauatur, & membra nutrimen-
to suo fraudantur. 3. de ratione uict.
in morb. acutis.

10 Status eorum pessimus est, qui
genitale semen copiosum calidum cō-
gignunt. nam siue Venere eijciatur
ad quam procitat, siue retineatur u-
troq; modo obest. Illo enim uentris
os resoluitur, & ipsi toto corpore im-

Z 5 becile

becilli, & sicci graciles, pallidi, cauiſ-
 quē oculis ſunt. Hoc uerò non mo-
 do capitis moleſtiam, ſed ſtomachi
 offenſionem faſtidiaq; ſentiunt, nec
 ex continentia magnopere iuuantur.
 Sumere igitur ij debēt non cibos mo-
 do, uerum etiam medicamenta, quæ
 ſemen extinguant, & exercitationi-
 bus uti, quæ ſupernas tantum partes
 exerceant, ut ludo pile, iactu lapidis,
 frictione & unctione lumborū à bal-
 neo oleo potiffimum omphacino, &
 roſaceo, & melino, quæ refrigerant.
 Tum ſi urgeat dolor. Cibus etiam bo-
 ni ſucci modicè repletos in cœna, cō-
 cubere dormientes, & poſtero die
 cum ſatis dormierint ac ſurrexerint
 iubendum eſt, linteo fricari quod ro-
 bur per cutem appareat, mox aliqua
 ex oleo frictione, uti, tum exiguo in-
 terpoſito tempore panis aliquid fer-
 mentati, & in clibano cocti, & puri
 ex uino mixto illis guſtandum porri-
 gendum, atq; ita ad cōſuetum dimit-
 tendum, magnam enim hinc utilita-
 tem experiuntur. de ſanit. tuenda.

11 Ci.

11 Cibis mali succi, quantum potest abstineri uolo, etiam si facile concoqui possint: neque enim fieri potest, quin huius uitij aliquid in uenis hæreat, quod ex succo in corpus distributo prouenit. 2. de alimentis.

12 Optimę constitutionis homo, si statim ubi editus est in lucē, arti sanitatis tuendę tradatur erit fortunatissimus. Sic namque ad animi quoque affectus non nihil lucrifaciet: ipsa nimirum recta uictus ratione mores quoque probos agente. 1. de sanitat. tuend.

13 Optima corporis constitutio, quę temperatissima est meatus per quos humor fertur patentiores habet, quā quidem talem, conseruat ante cibos exercitium mediocre. Galen. de Euch. & cacoch.

14 Multum ad sanitatem facit statim capiendo cibo rēporis obseruatio, & uentris quoties insistit solutio. 6. de sanit.

15 Probare suum quisque cibum debet, priusquam utatur, neque statim quod

quod arridet palato sequi more brutorum. Itemq; Venerem, quo minime tempore ab ea lædat, &c. de cæteris eodem modo. Sic enim ratione bene constituta in cōtrarios sibi aut cibos, aut libidines nunquam cadet. Ibid.

16 Optima uictus ratio est ei, quē reficere ex gracilitate oportet, ut maneliquidioribus cibis utatur, qualis est ptissana: serò uerò duriusculis ut pane aut carnibus, aut frugibus, quæ sunt species duriorum ciborum. i. de alimentis.

17 Ptisana probè cocta & ex optimo hordeo confecta inter cibaria omnia prorsus omni noxa caret, nutrit tamen quam panis minus, sed & si eam ad sanitatem sumpseris nō idcirco boni succi generationem impedias. Gal. de Euch. & cacoeh.

18 Consuetudo in uictus ratione magni est momenti, atq; adeò ubiq; tutior, quàm immutatio quælibet etiam in melius facta sit. Gal. de consuetudine.

19 Ego

19 Ego plerosque etiam nulla uictus ratione constituta, uidi sanos tamen uiuere & bene habere, cum aceto scillitico & eiusdem herbae serapio frequentius uterentur, tanti est morbi attenuans illa & salubris uictus ratio. Gal. de atten. uict. ratione.

20 Inter pisces, alimentum corpori saluberrimum praebent saxatiles, quod non modo concoctu est facile, sed sanguinem etiam medium consistentia generat. 3. de Alimentis.

21 Seruator quidque ipsidem plane generibus quibus corrumpitur, ut animi mores corrumpuntur praua consuetudine cibi potus, exercitationis, uidendi, audiendi ac totius denique mulices. Quarum rerum peritum medicum esse oportet, qui sanitatis tuendae curam suscipiet. 1. de sanit. tuend.

22 Vinum puero sanitatis regula educato ne gustare quidem quam diutissime suaserim, quod humectet nimis & calfaciat corpus caputque halitu repleat. Sed ne adulto quidem nisi modice sumptum concesserim, quod uidelicet

uidelicet, ad iram & libidinem præcipites facit, & partem animæ rationalem hebetem atq; turbidam reddit. Ibid. Quod modicè dico: quæ ad bilis excrementa mitiganda uel expellenda, & ad siccitates ex immodico labore, aut propriè temperamēto in solidis partibus prouenientes nō minū esse utile potest.

23 Optima uictus ratio est senibus, si mane ex oleo fricent post somnum, deinde in ambulatione gestationeq; pro suis uiribus utantur. Postea dulci balneo lauentur saepe si assueti sint, & uinum bibant s. aue, deniq; alimentis humidis simul & calidis, quā maxime possunt nutrantur. §. de sanis.

24 Sciendum est uinum ut pueris aduersissimum sic senibus amicissimum esse. Hoc enim maximum illis commodum ex eo accedere, quod omnia eorum membra calfacit alterum, quod per urinas secum sanguinis purgat. Quæ omnia præstare tunc simul & flauum, eūq; calidissima sint,

sint, si colorem spectes, flaua, minime calide, alba: media prout alteri accedunt, ita uim habeant. Ibid.

25 Lactis comoda sunt, uentris moderata delectio succi bonitas & nutritio. Non tamen omnibus est senibus exhibendum, sed is qui id probe concoquant, nec ullum ex eo symptoma in dextra praecordiorum parte sentiant. Ibid.

26 Senibus, ficis etiam & prunis alijsq; id genus, quae aestate autumnoque uigent soluenda alius & urina mouenda. Hyeme uero caricis, prunisq; Damascenis aut elixis, aut in mulso cui plusculum insit, Attici mellis maceratis. Ibid.

27 Pituita & obstructions hume-
ctanti uictu in senibus curanda nempe alica ex melle, cui aceti aliquid mistum sit, aut ex mulso uinoq; falerno exhibenda, aut lacte utendū, aut ptisana bene cocta, quae piperis pollinē acceperit, aut maturis ficis aestate, sicut hyeme caricis. Ibid.

28 Carnes senibus & atrophialaboran-

borantibus uno ante die quam sinuant, parantur: ut refrigerentur, tum bene coctæ ex uisculis, aut huiusmodi cibarijs apponuntur. At iuuenib. & robustis recentes siue assæ, siue elixæ meliores. Gal. in 4. de uictus ratione.

29 Ex tribus senum generibus *ἡλικία* seu iā iam senescentibus, senibus & decrepitis ultimi soli sunt, qui balneū non ferant, quod ut nunquam ferē acres calidosq; humores congerunt, sic minimis cruditatibus grauantur. 1. de sanit.

30 Senium uitari quidem non potest, sed produci potest uictus ratione bene cōstituta, humidorum ciborum usu lauatiōnū, mollis lecti, &c. omniumq; contrariorum, id est eorum, quæ siccent ac refrigerent abstinentia. Gal. de tabe.

31 Vacuationes non debētur corporibus ob consuetudinem aliquā, sed ob causam, quæ illas postulat ueluti ob uitiosorum humorum aggregationem ex malo uictu, aut praua corporis

Corporis affectione. In his si quod re-
dundat, antequam in morbum inci-
dat corpus, detractum sit toties, quo-
ties morbum, aut praesentem, aut ad-
uentantē senserit homo, non ob con-
suetudinem fiet talis medendi ratio,
etiamsi in eam uersae uideatur. Gal.
de consuet.

32 Aloēn senibus ad deijciendam
aluum haudquaquam sumi suaferim
nisi maior aliqua necessitas urgeat.
Nam etsi bi duo astrictus uenter, ter-
tio non soluitur, sat tamen est mercu-
rialem herbam, & marinam brassicā,
& enicum in ptisana dedisse. Sic & re-
binthi, resinam nucis ponticae ma-
gnitudine, aliquando duarum trium
ue, quae non modo aluum, sed etiam
uiscera, iecur, linēē, renes, pulmones
que abstergere citra noxam potest.
Exhiberi tamen eorum nullum co-
piose oportet. 5. de sanit.

33 Qui temperamento sunt cali-
do & sicco, similiter educandi sunt ijs,
qui optimae sunt naturae, ad aetatem
usque adolescentiae dum bilis pallida,

Aa

& fla-

& flaua, quæ in ijs abundat temperetur. Quod si uentrē ipsum superiore petat, per uomitum expellenda est, post exercitationes aqua tepida propinata: nam uino tunc utēdum non est, nisi difficulter uomāt ex aqua. Si uerò exercitari non debeant, ut sunt qui hoc statu sunt, graciliores leuis inambulatio, balneum, & mollis frictio ex oleo adhibeatur. Sed si præterea circa præcordia sentiant dolorem, danda quæ iecur obstructum liberent. Liquor in quo macerata sit absynthij coma, & medicam ex ea coma aniso & amaris amygdalis confectam, ex oxymelite bibendum eo tempore, quod inter surgēdum à somno & lauandum intercedit. Purgentur etiā & cōpositione ex aloë, q̃ picram uocant, & uentri extrinsecus admotis unctionibus modicè astringentibus, ut melino æstate mastichino uere, & nardino hyeme. Opulente autem mulieres foliato unguēto & spicato, quæ uentrem & roborare possunt & calfacere. Gal. 6. de san. tuen.

34 Corruptio ciborum in uentre si descendit per aluum ex se, maximū est sanitatis compendium, sed si hæret prouocanda est ijs, quæ deſciūt leniter. Diospolitico medicamen ex ficis & cnico composito, alijsquē ex cnico uel epithymo, corrupti cibi reliquias elicientibus, ita tamen ut sine erosione & pūctura fiat deiection. Ibid.

35 Qui theriaca utuntur ad sanitatis conſeruationem, uidere debēt, ne ante exactam ciborum concoctionē ut uenter exoneratum accipiant. atque tantum aquæ, quantū pro modo exigitur, admisceant exempli gratia, si magnitudine Aegyptiæ tabæ ſumant duo cochlearia miſceant, ſi auellanae aut circiter tria, proportionē utiq; ſeruata. At nec eſtate, nec iuuenis, nec calido tēperamento prædit⁹ uteris, aut ſi neceſſitate coactus id facis, minimum erit. Neque uerò puerò dabis, ne forte præ imbecillitate uirium uacuatione incitatus omni ſucco exhauriatur, quemadmodū

Aa 2


nuper

nuper cuidam accidit à patre ad id
coacto. Sed & si senex capias, cum ui
no accipies nō cum aqua. Galen. de
Theriaca ad Pisonem.

DE EXERCITATIONE

SECTIO XVII.

I.



Vi potest exerceri ante
cibum, is haud sanè ad
modum exquisitos ci
bos desiderat. Cui ue
rò negocia & occupa
tiones impedimento sunt, non mo
do huic probato innoxioq; uictu,
sed salubribus quoq; medicamentis
(quæ reuandū tūm possident) est o
pus. Gal. de Eucly. & cacoch.

2 Parua sphaera exercitium cæte
ris omnibus, cū alijs bonis, tum
uerò his duobus antecellit, quod æ
qualiter omnia membra exercent, &
citra periculum (quod alijs omnibus
quodāmodo inest) corpus pariter &
animū uegetat. Gal. de parua sphaera.

3 Vti

3 Vtilissima omnium exercitatio-
num videntur, quæ non corpus solū
exercere, sed animum etiam oblecta
re possunt, quales sunt parvæ sphæ-
ræ, ludus, uenationes. & aliorū ani-
malium capturæ. Adeo enim poten-
tes sunt huiusmodi exercitiorū mo-
tiones, ut multi sæpe morbis liberati
ex delectatione fuerint, ex conturbati-
one autem nimia in morbos incide-
rint. Ibid.

4 Humores tenues crassique simul
in eo gigni solent, qui omisso exerci-
tio nunc in ocio agit, crassi quidem
ex ocio presenti, tenues ex omisso ex-
ercitio. 3. in 3. Epid.

Exercitiū à mala concoctione non
est commodum. 3. de sanit.

5 Ab exercitio, quod repleto fit
corpore, gignuntur pro qualitate re-
dundantium humorum modo epi-
lepsiæ modò apoplexiæ & huiusmo-
di. Excalfacti enim ex eo humores li-
quescentes prorumpunt & maliciam
edunt. in 3. Aphorism.

6 In ocioso corpore duo repletio-

Aa 3 nis

nis genera fiunt. Repletio quantita-
tis, quæ est in uasis & qualitatis seu
uirtutis, quæ est in humoribus iplis.
Gal. in Hipp. de nat. humana.

7 Exercitationes acutæ & uehe-
mentes quia siccant & indurant, mē-
tem etiam ledunt, quod in athleticis &
baiulis ac rusticis cernitur, qui ut plu-
rimum mente sunt stupidi. Galen. de
somno & uigilia.

8 Senes neq; nimium exerceri, ne-
que omnino in ocio desidere oportet:
Illo enim modo eorum calor ut
pote tenuissimus cōsumitur, hoc ue-
rò refrigeratio augetur. 5. de sanit.

9 Calido & sicco temperamento
præditis utrius est, non acutis exerci-
tationibus & prænegetis uti, sed po-
tius tardis & mollibus. Acutæ enim
exrenuant, lentæ implent corpus. 6.
eiusdem.

10 Eorum qui repleti cibo se exer-
cent non nullis caput repletur uapo-
ribus & in iecinore, aut ponderis, aut
distensionis, aut utriusq; dolor perci-
pitur. Succurrendum est igitur in am-
bula

bulationibus potissimū ante cibū,
& celerioribus, aut post cibum, sed
quā maximē lentis. Ibid.

11 Laboris appellatio idem uide-
tur, cum communi exercitationis ap-
pellatione significare, at non motus
quiuis exercitatio uidetur, sed tantū
qui uehemētior. Cuius terminus est
alteratio respirationis, id est accretio:
In quib. enim nulla fit respirationis
mutatio, hos nōdum exercitationes
dicimus. 2. de sanit.

12 Exercitationis tempus cōmo-
dissimus est, paulo antē prandīū, aut
cōenam, cū hesternus cibus dupli-
ci concoctione iam prorsus confe-
ctus fuerit, nempe ea, quæ in uentri-
culo, & ea quæ in uasis sanguinis agi-
tur, ac iam denuō cibādī tempus in-
stet, cuius nota est urina rufa. Quod
si prius aut posterius facias, aut cru-
dis humoribus hominem impleue-
ris, aut pallidæ bilis prouentum au-
xeris. Ibid.

13 Cū urina mediocriter rufa
est, adeundum exercitium, sed expul-

sis prius excrementis, quæ uel in uentriculo, uel inferioribus intestinis continentur, ac partibus solidis molli simul frictione concalfactis. quæ linteolo suauiter perfricando fiat. Donec floridus quidam robur per totam eius cutem fundatur, tum oleo nudis pedibus totum ipsum subigere medio inter molle & durum modo. *Ibid.*

14 In quartana, potest qui laborat nullo detrimento etiam diebus intermissionis mediocriter negotiis suis corpus exercere. 1. ad Glauc.

15 Exercitia nonnulla sunt tantum exercitia ut pancratium lucta, pugilatus, quædam simul & ope a, ut cum aliquis fodit, aut remigat, aut aliud exercet in usum mortalium. 2. de san.

16 Exercitiorum triplex in uniuersum est usus, aut enim operis gratia fiunt, aut meditationis, aut exercitationis tantum. Quorum nullum ut exercitium perpetuum diem obitur, nec alio tempore, quam ante cibum. *Ibid.*

17 Exercitatio pueri membra
exuta

exuta frictione primum molliantur. Posthęc exercitetur donec intumescat corpus, & color illi floridus appareat, & motus proprię equabiliter, & concinnę edit, & sudorem cum calido uapore mixtum uideas. Horū uerō aliquo mutato, inhibeatur exercitatio. Ibid.

18 Senibus quę præcipua ad sanitatem exercitia sunt, hæc per ualentiores corporis partes sunt obeunda. sed habenda cōsuetudinis imprimis ratio: nam quę cōsueta sunt ut minime lassantur, quos exercent etiam delectant, sicuti ediuerso, quę insuetatū displicent, tum uerō lassant. 5. de sanitate.

Aa 5 DE

1.



Auacrū exercitatis omnino medio temperamento eligendū est, ad propositam ætatē atq; naturā quod non protinus, sed ubi summus exercitationis uigor remissus atque sedatus fuerit adhibeatur. 2. de sanīt.

2 Balneum exiccatos seu tabe cōfectos conspicuē humectare reficereq; cernitur, ut facile in ijs possimus uidere, qui æstate uel iter faciunt, uel alio quopiam modo exercentur sub sole. Hos enim omnes atq; etiā eos qui siticulosi sunt, humidos reddit & siti liberat, siue ex uigilia, siue ex curis, siue ex uenere, siue ex edulijs, siue ex ira, uel medicamentis fuerint exiccati, in putridis etiam febribus, si cocti sint humores & hec̄ticis, si sola sint quouis tempore balneum remedio

dio est. Galen. de tabe.

3 Balneum excrementa potissimū cuti proxima purgat, interiora enim altius hærent, quàm ut eò pertingere possit. 3. Aphorif.

4 A balneo abstinere debet, qui fluxum sanguinis patitur, & cui subuersus est uenter: item cui uirtus imbecillis est, ne deficiat, aut in syncope incidat. Gal. in 3. de morb. acut.

5 Balneum desinentem febrim si uires suppetant, soluit omninò & coquit, sed si ante concoctionem adhibeatur potissimum in quotidiana ex pituita salsa grauius malum efficit. Ibid.

6 Febres quæ ex inguium inflammatione fiunt curare omnes quidem balneis oportet, & quæ ex cutis densitate (densatur enim cutis aut ex frigore, aut ex aliqua qualitate astringente) si in aëre balnei immorari iusseris ægrotum. nam reliquos omnes quā citissimè oportet ab aëre remoueri, nisi uelint ipsi diutiùs immorari. i. ad Glauc.

7 Bal-

7 Balnea calida ex aqua potabili tertianis etiam profunt, tum quia bilis aliquod educūt, tum quia sua qualitate humectant & potentia refrigerant, qui scopus in omnibus balneis esse debet. Ibid.

8 Qui ex calida & sicca intemperie hectica febricitāt ac potissimum, qui iam marasmodes fiunt, ijs tutus non est frigidi solij usus, nisi prius fuerint in balneo æqualiter excelsi. Atq; huius rei causa ad imbecilla corpora iuuentæ sunt balneæ, quæ ea præcalfaciant, atq; ad frigidum solij præparent. 10. Methodi.

9 Balneum quatuor partibus uaria facultate præditis constat. Prima in qua calfiunt, q̄ ingrediuntur aëre calida tantum. Altera in qua calida aqua lauantur. Tertia in qua frigida utūtur. Quarta in qua sudores detergentur, quibus tempestiuè omnibus est utendum, quòd qui intempestiuè lauantur, in horrorem cutisq; densitudinem incidunt. Ibid.

10 Si ijs qui fuliginosum & fumi-
dum

dum ex corpore exhalat, ex frigore febricitet educendus in balneum etiam erit in remissione febris. Si autem cum grauedine & destillatione febricitet priusquam hæ concoquantur, lauandus non est. Atqui exustione, ñ uel cum hæc adsint lauari debebunt. Post lauacrum uerò amborum capita oleo rosaceo madefacienda erunt, eorum quidem qui ex uustione febricitant refrigeranti, qui uerò ex frigore calfacienti ut sunt irinum & nardū nū unguentū. 8. Meth. *Additio.*

11 Fumidus uapor ex tarditate concoctionis aut cruditate in qua ructus sentiuntur acidi non excitatur, sed ex materijs semiustis & fuligo ex immodicè assis ustisq; , quod in ñs, q̄ sunt extra cernitur. Est enim fuligo uapor terrestris, fumus uerò mistio quædam ex terrestri & aquea substantia. ex Gal. in eodem lib.

12 Si quis febrem ex stipitatione ortam toto prius corpore uacuato relaxantibus medicamen curet, ubi scilicet maxima febris non adest, utique pro-

prodesse aliquando potest, si tum etiam
am lauerit 11. Methodi.

13 In balneo quod in quacunque fe-
bri adhibebis, tribus his intentus sis
oportet. Vni quod citra horrorem sit
administratum. Secundo quod nullum
primæ notæ uiscus sit imbecillum. Ter-
tio quod multitudo crudi humoris
in primis uenis non contineatur. Hor-
rore namque non solum accedere iam
præsentem febrem potest, sed etiam
quæ non fuit inducere. Partes uero
imbecillæ liquatos iam humores re-
cipiunt magis, quam ante liquatio-
nem. Crudorum uero copia in totum
corpus digeritur. Ibid.

14 In progressu morbi nempe fe-
bris putridæ quo tempore & absum-
pta iam superuacua sunt, & tum cru-
da, tum putrescentia concocta, & ca-
taplasmatibus relaxantibus, & balneis
intrepidè toti licebit. Ibid.

15 Aptissimum balnei tempus in
febris, quæ intermittunt & repe-
tunt, id est, cum exhalare iam cœpe-
rit febrilis calor. Statim enim corpus
ad

ad nutrimentum parat. Cauendum
tamē à frigido solio his est, quoniam
& crudi, & putrescentes succi minus
apti ad exhalandum, redduntur si q̄s
in eo moretur. Ibid.

16 Quibus ex calida intemperie
caput malè habet hos frequenti bal-
neo dulcis aquæ fouere expedit. Ca-
lidarum aut quæ sponte nascunt, ue-
luti sulfurearū, bituminosarū, alumi-
nosarum noxi⁹ his usus est. 6. de san.

16 Quod à sumpto cibo nauseam
aut hepatis dolorē, aut grauitatem,
aut tensionem pati contigit, à balneo
post cibum omninò arcendi sunt. So-
laq; constipatio prior curanda. tenu-
is succi alimentis, &c. Ibid.

18 A' balneis igitur (ut una sum-
ma colligatur) uacuatur quicquid in
corpore, uel humidum, uel fuligino-
sum præfuit: Reducuntur ad natura-
lem symmetriam, tum caro ipsa, tum
cutis: corrigitur solidarum partiū ari-
ditas & calor non modo is, qui ex la-
uacro, sed qui etiam præfuit ex frigi-
dæ usu extinguitur: quod sentiunt n̄,
qui

qui feruenti sole exiccati, huiuscemodī balneo lauantur. Gal. 10. Meth.

DE ALIMENTIS.

SECTIO XIX.



Aetera quidem & curationis, & sanitatis methodus ex quo precio habetur. At quæ de alimentis est, hūc præter illa scopū habet primum, ut quam optimè concoquantur: deinde ut ex ijs concoctus ac digestus succus omnium partium naturæ conueniat. Gal. de Euch. & cacoeh.

2 Cognitio alimentorum, cognitione medicamentorum maxime hoc præstat, quod illis sanis, & ægris uti necesse est, his uerò non nisi egrotos. 1. de alimentis. Item, Nutrimentū à medicamēto uenenofo eo diffidet quod hoc uim corporis uincit, illud ab ea uincitur. 3. de facult. nat.

3 Vitiō

3 Vitiosum sumpti cibi succum purgat abstinencia, sicut & contrarium ipsi intemperantiæ alimentum, exercitatio consueta, & somnus longe à cibo captus. Ibid.

4 Posteriores sumendi sunt cibi, qui tardè permeant quemadmodum omnium primi, qui celeriter, corrumpunt tamen si in uentriculo morantur diutius. 2. de alimentis.

5 Alimenta citi tardiùe transitus comperiuntur, aliàs ob naturalem naturam ab initio cōstitutionē, aliàs ob uētris dispositionem, aliàs etiam ob esculentorum ac potionum peculiarē substantiam, ut quod sint lenta aut perhumida, &c. 1. de aliment.

6 In uniuersum quod suauius est cibariū facilius ijs, quæ ex æquo sunt salubria concoquitur. 2. eiusdem.

Et paulò post. Tametsi nos utilitatem, quæ ex cibis prouenit spectemus non uoluptatem, tamen quia cibi insuauitas plerunq; officit quominus ipsum conficiamus, satius fuerit interdum condire mediocriter, non

Bb uti

uti coqui faciunt, quorum condimentum
ta plus interdum cōcoctioni obsunt
quàm profunt.

7 Alimenta quantò sunt humidiora
eò sunt excrementosiora & minus
nutrientia. Nam humida ut distribu-
untur, ita etiam solidioribus discuti-
untur celerius. 3. eiusdem.

8 In uniuersum aut acris & amara si
edant corpus parcius nutriunt. Inspi-
da autem & ipsa adhuc magis dulcia,
multum: & multò etiam magis si cō-
pactam adhuc habeant substantiam.
2. eiusdem.

9 In ipsa uictus ratione temporū
ratio est habēda, sicuti & regionum,
& anni temporum. Etenim aut om-
nino melancholicis ac siccātibus ab-
stinere, Hyeme aut uti oportet, quē
admodum æstate humectantibus si-
mul & refrigerantibus: at uerè medię
qualitatis cibi sunt dandi. 1. de ali-
mentis.

10 Exhaustos & graciles paula-
tim reficere oportet, tantum cibi &
potus exhibentes, quantum coque-
re fa-

re facile possint. In ijs autē potionis is
modus erit, ut nec uentriculo innatet,
nec fluctuationis ullius sensum
inuehat. Ciborum uerò potissimum
ut ne grauent quidem ipsum, tãta ui-
delicet prima cibatione exhibita quã
ta priusquam, secunda sumatur tota
prorsus sit concocta. Deinde ut quã
celerrimè concoquantur, quod non
nisi à leuioribus contingere potest.
Tertium ut excrementum eius disce-
dat, & uacuis purisque uenter se-
cundum excipiat sine molestia. Atque
ubi meliores sunt effecti, mutanda sub-
inde ciborum qualitas & quantitas,
sic ut tum plures, tum ualentiores ex-
hibeantur. Volatiliaque opponatur &
suillæ carnes immunis porcelli, qui si
hyems sit etiam pridie iuguletur. Nã
hesternum quàm recens faciliùs cõ-
coquitur, æstate uerò sat fuerit, si ma-
nè inmolatus circa solis occasum cõ-
medatur. Sic enim ualentius semper
alimentum uesperis exhibendum cẽ-
suimus. 7. Methodi.

Nutrimenta simplicia medicamẽ-

Bb 2

tosis

tos admixta corrumpuntur. At si simplicia sumuntur semper integra profunt.

11 Cibariorum alia sunt quæ mor dicatione sua, uentris partes ad expulsiõnem exuscitât ut melicratum, &c alia substantiam habent ex cibo pharmacoq; compositam, quæ uentrem subducunt, quod medicamentosas in se facultates habeât commistitas. Alia deniq; solum alimēta sunt, mediū temperamenti nullaq; uincen ti qualitate prædita, tale animalis corpus conseruantia, quale assumpserât, quorum maxima est nobis raritas. 1. de alimentis.

12 Inter panes plurimum nutrit siligineus, post hunc similaceus, tertio loco medius, qui & miscellaneus dicitur *αὐτόπυρρον* & *συνκόμυρον*, ex farina & furfur, quarto furfuraceus, qui minimè omnium nutrit, sed omnium maximè per aluum descendit. 1. de alimentis.

13 Panes purissimi copiosiori fermento subactioneq; longiori egent, quàm

quàm furfuracei quia omniū tardissimè deſciuntur, & exigua mole plurimum ponderis habent. Neq; tam citò aſſari poſt ſubactionem, neq; tam cito ex clibano moueri requirunt. Ibid.

14 Panis homini neq; iuueni, neque exercitationi dedito ſaluberriſmus is eſt, qui tum ſalis, tum fermenti habet plurimū, quiq; maximè fuerit antequam aſſaretur ſubactus. Modus autem ſalis & fermenti ſit is, qui guſtui ſenſum triſtem non inferat. Ibid.

15 Amylum, hoc eſt farina citra molam ex tritico facta, lotis panibus ſimilem facultatem eſt ſortitum, minus enim alimenti præbet, ut illi quā panes non loti, nec calfacit cū cæteri panes calfaciant. Ibid.

16 Ex animantibus quorum natura ad gignendos bonos humores aptiſſima eſt, ſues mediocris iam ætatis habentur. Ex pedestribus enim animalibus ſuilla caro, cibus probatiſſimus eſt, deinde hœdina, mox uitu-

Bb 3 lina

lina. Porcelli uerò excrementis sca-
tent, & agni mucosiores sunt. A cæ-
teris igitur pedestris generis, meo iu-
dicio, abstinent, qui sanitati ac boni
succi generationi consultum uolet.
Gal. de Euchy. & cacoch.

17 Volantilia quò sunt tenuioris
substantiæ, eò magis bilem mouent
præsertim si calori dominantî occur-
rerint. in 6. Epid.

18 Ex coctis carnibus assatæ po-
tissimùm corpus solidant, ac post has
frixæ reliquis omnibus magis elixæ.
4. de uict. in acut.

19 Cibaria quæ assentes homines
manent, aut in sartagine frigentes, ea
corpori siccus dant alimentum: quæ
uerò in aqua præcoquunt, humidi-
us, quæ in patius condiuntur inter
hæc media sunt, quanquam inter se
pro modo condituræ multum diffe-
runt. 3. de alim.

20 Animalium gressilium testes
concocti sunt longè difficillimi. So-
li uerò gallorum gallinacei sunt, un-
de quæ præstantissimi & potissimi
eorum

eorum qui saginati sunt. Ibid.

21 Caro eorum quæ in montibus degunt ob contrarias causas domesticis est durior, nulliusq; proius pinguedinis aut paucissimæ ob idq; pluribus diebus imputris seruatur. Alimentumq; exhibet minus excrementum, proinde & nutrit ualentius, & succum gignit meliorem. Ibid.

22 Vinum mediocriter temperatum non solum humoribus quoque temperandis est aptissimum, sed etiã calori naturali excitandæ & reliquis partibus confirmandis summèq; bonum. in ultimo Aphorism.

23. Dulcia & nigra crassos humores gignunt, tenuia uerò discutunt urinamq; cient fulna & mediocria, moderatè succos temperant. 6. de sanitat.

24 Vino ut utantur omnes, quib. refici corpus est opus, cōsulo: modo non febricitent. Esto tamen id & aquosum, & astringens leniter. Aquosum natura appello, quod tenue est & purum minimamq; aquæ mistio-

Bb 4

nem

nem ferens. Cauendum autem à uinoso est quod feriat uires imbecilliores. Rursus nouellum, tum aquosius tum imbecillius quodammodo est, quàm ut uino conueniat, adde quod ægrius concoquetur, ac magis excrementosum est. Antiquius uerò ut uinosius est, ita uehementius, quàm ut propositis gracilibus sit ex usu. 7. Methodi.

25 Hepaticis dolorib. si phlegmone absit nec intemperie calida uexetur, nil uino esse melius potest. si quidem & morbum coquit, & partē affectam afficit, & si quid humidæ frigidaue intemperiei fuerit, corrigit. 8. de comp. med. secundum loca.

26 Frigida ante cibum pota hepatis & musculo noxia est, in Hippo. de natura.

27 Pessima omnium aqua est quæ ex glacie aut niue liquefit: soluitur enim quicquid in ea est attenuantis uirtutis & crassitudine oppletur, ita ut nunquam postea aquam pluuiam æquare bonitate possit. in 2. Hip. de aqs.

28 Aquæ

28 Aquæ uitia pendent ex eius frigidityate omnia, cuius culpa & moratur in præcordiis diutissimè, & fluctuationes excitat, & inflatum uertitur corrumpiturq̃, adeoq̃ uentriculi robur resoluît, ut deterius proinde concoquat. Sed nec digerendo per corpus alimento magnopere conducit.
7. Methodi.

29 Aqua fontana & recēs alijs est præferenda. Quæ autem omnium optima est ea penitus non gustui modo, uerum etiam olfactui omnis qualitatis expers. Videbitur eritq̃ iucunda gustui & celeriter pertransibit præcordia. Porro quæ ex petra ad septentrionem fluit, solemq̃ auersum habet ægrè concoquitur & tardè incallescit, tardèq̃ transit. Cuius ad orientem solē erumpit fons quæq̃ per terram colatur, ea calefit & refrigeratur ocysimè, omniq̃ ætati utilissima est.
1. de sanit.

30 Aquam quæ celeriter incallescere & refrigeraret. meritò dixit Hippocrates, nam quantò tenuior, tantò

Bb 5 pati

pati promptior erit, quæ autem tenuior, minimum his imi terrestris. 1. de simpl. med.

31 Oxycrati potu æstate quidam refrigerantur & sitim extinguunt, cuius refrigerationis causa est aqua non acetum, à quo ipsa tanquam vehiculo in partes digerit. Sic etiam si cum uino bibatur aqua efficaciusque sitis extinguitur, quam si sola, iudicandum est. Ibid.

32 Lac probatissimi succi habetur cum animal ex quo sumitur, boni habitus fuerit. Quare nonnulli pulmonis ulcere affectos, portionis tantum lactis curari putant, antea scilicet quam id ipsum ulcus uastius atque callosum fiat. Sed præ cæteris lac muliebri probatur, tanquam familiarius, quod Herodotus & Euriphon, ab ubere sugendum, ita affectis consuluerunt, quæ simul atque emulctum est, non nihil naturæ bonitatis amittit. Galen. de Euch. & cacoeh.

33 Scire autem oportet lac ex iis, animantibus quæ boni habitus fuerint,

rint, boni esse succi, ex ijs uerò quæ deprauati non secus ac sanguis, qui in illis habetur cacochymum esse. Ibi dem.

34 Thoricis & pulmonis partib. lac omne est utile, capiti uerò nisi, q̃s ipsum habeat admodū, firmum, non est commodum: ut neq̃ hypochondrijs, quæ læui de causa inflammatur plurimis, siquidem in uentriculo in flatum uertitur. 3. de aliment.

35 Lac triplici dissimiliq̃ substantia constat serosa, crassa & pingui ex qua fit butyrum, ex quibus camelinum asinumq̃ plus serosi humoris, ouillum, plus caseosi & crassi, bubulū, plus pinguis. Galen. de Euch. & cacoch.

36 Inter omnia quæ mandimus lac optimum, optimi succi est, nam quod uitiosum est, utentium corpora uitioso succo replet. 3. de alim.

37 Lac serosum etiam si semper eoutaris, nil unquam adfert periculi. raro enim in uentriculo huiusmodi cogitur, si ut primum mammis excidit, calidum

calidum fuerit epotum. Quod si sal
& mel adiſciantur fieri non poteſt, ut
unquam coagulatur. Ibid.

38 Nocet autem uſus lactis aſſidu-
us tum dentibus, tum longiuis, has
quidem humidas, illos pueridos red-
dens. Sed occurritur huic malo ſi di-
luto, aut meraco uino, cui nonnihil
mellis ſit admiſtum: aut primò quidē
melicrato, deinde aſtringente uino,
os ipſum ſumpto lacte colluat. Ibid.

39 Caſeus omnis craſſi, uetus ma-
li ſucci eſt, recens uerò ſucci prauitate
caret, qui quidem ex melle ſumptus,
aluum ſubducit. Gal. de Euch. & ca-
coch.

40 Olerum cibus omniū tenuiſſi-
mus, ſicuti & fructuum quorundam
cortice duro cōſtantium. At uires of-
fendunt omnes & uitam miro uſu
breuiant. 5. in 6. Epid.

41 Ex cleraceis nihil eſt quod bo-
num ſuccum præſtet. Lactuca tamē
in ijs, quæ boni maliq; ſucci ſunt me-
dio criter ſe habet. Poſt illam malua,
poſt hanc portulaca attriſplex, blitū,
rumex,

rumex, cætera agrestiaq; omnia ultio-
sum succum gignūt. Gal. de Euch.
& cacoch.

42 Pepones, cucumeres, & melo-
nes nisi citissimè egerantur, succus in
uentriculo putrefaciunt, non admo-
dum à ueneno alienum. Ac cucurbi-
ta sola ex talibus fructibus culpanda
non est, si tamen corrumpatur, uitio-
sum etiam succum facit. Ibid.

43 Radices olerum in se acrimo-
niam habentium, ut allij, cepæ, pori,
raphani, & pastinacæ syluestris malū
succum producunt, sed ari, cari q; ra-
dix & rapi media in ijs, quæ boni pra-
uiq; succi sunt. Ibid.

44 Olerum radices omnium ex-
crementitiæ & concoctu difficiles,
aduersissimæ uerò rapæ. his paulò mi-
nus bulbi omniū pessimi, fungi. De
atten. uict. Et paulò post.

Solæ itaque radices acres & calida
sunt gustandæ, ut allia, cepæ, & radi-
culæ ex q; pro pharmacis potius, q;
per alimentis habendæ.

45 Allium, cepæ, porrum, nastur-
tium,

tium, synapi, postilla, smyrnium, pyræ-
thrum, origanum calamynthæ, sisym-
brium, Pulegium satureia, thymum
attenuantia sunt, uiridiaque omnia
mandantur, exiccata uero non am-
plius sunt cibi, sed medicamenta. I-
bidem.

46 Semina sunt suæ plantæ facul-
tate similia, nisi quid magis tenuant
siccioraque sunt. Semen autem papa-
ueris est herba ipsa præstantius, pa-
uibusque tanquam innoxium permix-
scetur. Refrigerare autem ipsum sig-
num est, quod caput grauat & soporiferum est.

47 Fructus qui horrhæi appellat
autumnales omnes malum succum gi-
gnunt. Ac ficus & uuæ passæ ceteris
præstantiores, carica cum nucibus,
& cum amygdalis præstantissimi eti-
am succi, reliqui arborum fructus mali
succum sunt, neque potissimum quos syl-
uestres plantæ & arbores ferunt. de
Euch. & cacoeh.

48 Pomis bene coctis si quid uitæ
superest, semper minus eo est, quod
crudis

etudis inest. de atten. uict.

49 Palmæ fructus, id est, dactyli præcipuè caput feriunt, si largius sumatur: at reliquum etiã corpus crasso lentoq; succo replent ob pinguedinem, & hepar obstruunt ob dulcedinẽ, quæ huic succo admista est, unde horrores & rigores diuturni. 2. de alimentis.

50 Capparis surculos uirides & teneros non aliter, quàm terebinthi mandũ in aceto simul & muria, aut solo aceto condientes, ad excitandam autem appetendi uim & pituitam. Ventrem detergẽdam lienisq; & hepatis obstructions purgandas, ante alios omnes cibos ex oxymelitæ uel oxecleæ uti oportet.

51 Palmæ uerticem edimus & tenellas spinas elixas, aut crudas uoluptatis magis gratia, quàm necessitate coacti. Cæterũ omnia id genus & parcissimè nutriunt, & prauis succi sunt productiua, 2. de alim.

52 Oliuæ quod quidem ad propositam dietam, id est, tenuẽ uictus ratio-

rationem, attinet medium quodammodo sunt, medium quodammodo sunt edulium. Edunt autē homines has quidem (nempe caducas) cū pane maiori ex parte, sine pane uerò quas halmadas & colymbadas uocant, idēq; garo profusus & ante alios cibos uentris subducendi gratia. Galen. de atten. uict. ratione, & 2. de alimentis.

53 Oliuæ halmadæ & colymbadæ succum astringentem habēt plurimum, proinde stomachū roborant & appetentiam excitant. 2. de alimentis.

54 Vuæ passæ cum alijs uuis eandem habent rationem, quā caricæ cum in ficibus. Cæterū ut dulces temperamento sunt calidiore, ita austeræ frigidiorē, quæ quidem stomachum roborant, & uentrem constipant, & his multo magis acerbæ inter quas mediam cōstitutionem dulces obtinent. Inter eas autem præstantiores sunt, quæ tū pingues, tum cuticulam habent tenuem, quæ in ueteratæ

stata & preuacerata, multò meliores redduntur. Ibid.

55 Optimum in pirrocholis nutrimentum est prissana. Proximum alia cui paulum aceti admixtū sit. Tertium, eadem sint aceto liquida non crassa aut lenta qualē nonnulli præpareāt ad similitudinē pulti. Itē in furno coctus panis utilis est cibus, sicut ē piscibus saxatiles omnes, ex uolantibus optimi perdices, ac mōtani omnes passerēs, &c. s. Meth.

56 Excrementosa sunt omnia alimenta animalium, quæ exercitatione carēt sicut & lacustria, & palustria omnia. Ibid.

57 In omnibus animalium cibus fugiendi sunt, tum uētriculorum, tū recens editorum. Illi namq̃ duri & cōcoctu difficiles. Si uerò nimiū humidi & mucrosi. Ibid.

58 Cibi crassi glutinosi q̃ sunt Panis, qui nec fermenti, nec salis quod satis continet, neq̃ probē maceratus nec coctus: caseus omnis. Placēt ex caseo & melle cōfecta: cochlea qua

Ce dura

dura ponissimum frixa. Pisces citacci
ut thynni, Pelamides &c. fungi om-
nes præter boletos, qui sunt mino-
res. Fructus arborum castaneis exce-
pris, quæ si in uentriculo concoquan-
tur etiam si crassi sunt succi, nūquam
tamen mali sunt. de euch. & cacuch.

59 Qui exercentur uehementius,
estate cauere debēt, ne ante exercitiū
comedant mora, aut pruna, aut ceri-
lia, aut cucumeres, pepones, melo-
nes, cucurbitas aut similia. Qui uerō
ratione uictus utuntur pro exercitio
balneum exhibebit, tum cibis boni
succi, aut cum condimento paratis
fruetur. Ibid.

60 Omnium saporum ualentissi-
mē nutrit dulcedo, cui proxima est
pinguedo. Cæterorū uerō, ut quis-
que ad hanc proximē accedet ita ma-
ximē nutrit. 4. de simpl med.

61 Vinū puero optimæ, id est, me-
diæ constitutionis, quā diutissimē
ea natura est. ne gustare quidem sua-
serim, quod humectet nimis, & calfa-
ciat corpus caputq; halitu repleat.

Qua-

Quare nec iam adultis, nisi modicè
sumptum est utile, quanquam ad bi-
lis excremento purgāda uel mitigan-
da est, sanè non inuile. 1. de sanitat.
tuenda.

DE MEDICAMENTIS

*ὕγιαινοῖς, id est, salubribus uel sa-
nitatem conseruantibus.*

SECTIO XX.



Vtrimenta medicamē-
tosīs facultatibus præ-
dita, curationi sunt a-
ptiora, quàm quæ alē-
di solum sunt habilia.

His autem neq; uten-
dum est simplicibus, sed cum alijs cō-
positis, quæ ad substantiam eorum
altricem magis accedant, quàm ad
medicamentosam. 2. de uict. ratione.

2 Inuenta medicamenta salubria
sunt, quæ tenuandi tūm possident,
quæq; obstructionem liberent. Quā-
quam horum frequētior usus, uel se-

Ec 2 rosunt

rosum, uel biliosum, uel melancholicum, procedente tempore sanguinem reddit. Huiusmodi enim non solum incidunt & tenuant, sed etiam immo dicè calfaciunt, ob idq; & solida mēbra exiccant, & crassum humorē reddunt, quò in renibus asso, gignuntur calculi. Gal. de euch. & cacoch.

3 Deiectionibus alui grauioribus astringens uinum, calidis uerò mannis aqua, necq; uehementer odorum tribuendum. 2. de morb. acut.

4 Vini præcipuè dotes sunt, quod concoctionem horum imperfectam compleat, ut urinam ciat ac sudorem & somnum conciliet. 4. de sanit.

5 Reliquæ uinorum laudes, uitij aqua cōtrariæ sunt, inflata enim præcordia subsidere faciūt, nec inibi moram trahunt propter caloris mediocritatem. Digestionis uias aperiunt & nutrimentum celeriter deducunt. Præterea sunt boni succi & ad miscēda coquendaq; ea quæ in uentriculo, & uenis consistunt idonea. Vires quoq; organorum adaugent, & expellens

pellendis excrementis uiam faciunt.
7. Methodi.

6 Aqua uitia præterquam quod fluctuationem in uentriculo mouet, & concoctionem impedit, siim etiã in tussi excitat tantum abest, ut secretionem efficiat, in bilem uertitur uentre uacuo pota, caput offendit hepar obstruit, & lienem. in 3. de morb. acutis.

7 Ptisana ex optimo ordeo confecta, ipsum p se satis absterget, ut hyssopo non magnopere egeat. Sin aliquando intendere uim eius uelis nõ mel, neq piper admiscetur. Nisi ubi pectori & pulmone curandis uti libuerit. de att uict. ratione.

8 Hordeum ex quo conficienda est ptisana, aliquandiu in aqua præmacerandum, postea in mortarium coniectum usq; eo terendum re qua dam aspera, dum is, qui in superficie est cortex abijciatur. Quod si non quicquid est paleaceum, deciderit, ptisana elixa quidem magis deterget, nullam autem aliam noxam accipiet.

Cc 3

capict.

ci piet. 1. de alimentis.

9 Lac quod ignitos lapillos, aut orbiculos ferreos extinxerit, uentrē sistit & ijs auxiliatur, quibus uenter acrium excrementorum morfu infestatur. Facile tamen sic paratum lac in uentriculo cogitur ob idq̃ mel illi & salem adiicimus, & aquam etiam, quæ seri acrimoniam corrigit. 3. de alimen.

10 Prodest etiam abscessibus acrē mordentemq̃ materiam excrementibus. 10. de simpl.

11 Lac celerrimē mutari est aptū, utiq̃ genitalis seminis ritu, q̃ nec ipsum aliquam diu extra uasa propria, ut uires seruet, morari patitur. Propterea utilissimum, si ex ipsis māmilibus quis hauserit. Gracilibus potissimum & siccatīs muliebre, utpote cognatum, sed quoniam pleriq̃ recusant asininum ipsis admota asina, ut asinis dari conuenit. 7. Methodi.

12 Lac omnē facultatem deijcendi alui à sero habet, sistendi à casciosa substantia. Quare plurimo sero deijcien-

ciendam aluum ueteres usi sunt. Cui tamen mellis optimi, & salis adiiciendum, quantum citra stomachi euer-
sionem suaue sentiatur. 3. de alim.

13 Ad crassos lentosq; humores attenuandos & expellendos, optim-
um est melicratum secundum opy-
meli. Tertium ptisana. Quartum ui-
num suaue. 3. de morb. acut.

14 Idoneum uerò est in intempe-
rie humorum, & si mulsa in qua inco-
ctum sit absynthium bibatur. Nam
id quoq; tenues succos, quicunq; ui-
delicet in ipsius uentriculi ore conti-
nentur, commode deorsum impellit.
7. Methodi.

15 Butyrum ex melle deuoratū di-
stributumq; mire admodum pro-
dest pulmoni, & lateribus phlegmo-
ne affectis, ut sputum moueatur, id
est, pleuriticiis peripneumonicisq; af-
fectibus, cum hoc quod eos etiā con-
coquat. Digerit autem & concoquit,
proinde & cataplasmatibus indi-
et, quæ extrinsecus imponuntur parotidibus
hypochondrijs bubonibusq; 10. de
simpl.

Cc 4 16 Sa-

16 Sanè acetum non modo tenuis-
 um est partium, sed etiam non medi-
 ocrem reprimendi uim habet. Quo
 rationabilius profectò in principijs
 affectuum ipso utuntur rosaceo ad-
 miscentes. Procedente uerò tempo-
 re ad cerebri & membranarum phle-
 gmonas etiam spondilij & serpilli,
 (quibus non iam modo partium te-
 nuitas, sed etiā calor inest) admiscent
 aliquid, quò scilicet tempore transire
 ad ea, quæ concoquant & digerant,
 conuenit, atq; hæc utraq; ualentiora,
 quàm postulet ipsa pars affecta deli-
 gere: ceu uiribus eorum per ea, quæ
 intersunt ossa remittentibus cerebri.
 11. Methodi.

17 Sanè & castoreo ad phlegmo-
 nas utimur, cū tamen in alijs phle-
 gmonis ei minime utamur, quamuis
 etiam in summa sint inclinatione, est
 enim id calidius, quàm ut his sit ido-
 neum. Phlegmonis autem capitis cir-
 ca cerebrum, si iam inclinant est uti-
 lissimum, quoniā non continuò his,
 sed ossibus primū interiectis occur-
 rant. Ibid.

18 Ace-

18 Acetum matricibus & cæteris huiusmodi partibus neruosis, & inimicum propter refrigerationem, quod habet cum acutissima tenuitate coniunctam. in 3. de morb. acut.

19 Serapium ex aceto non nisi ualentibus uiribus præditis est propinandum, alioqui enim humores, qui per sputum uacuari debent exiccat, effunditque incidendo quicquid in pulmone & pectore est crassum uel lentum, ex quo hominem suffocat tandem 3. acut. morb.

Et paulò post.

20 Vbi uerò modicè temperatum aceto fuerit os, & palatū emollit, sputum promouet, sitim extinguit, obstructū hepar recludit & leniter purgat, bilem ex melle conflata incidit, flatum discutit, urinā ciet, materiamque deorsum pellit quā ocysimè. In summa nullo incommodo afficit, nisi quod siquid sapius utatur, dysenteriam parit. ibid.

21 Epileptico, oxymelite audacter utendum est, ex quo etiam capparitis

Cc 5 sum-

sumi potest, pauxillo olei instillato. Quod si acetum ipsum stilliticum fuerit, coxymeli longè magis iuuabit. Cæterum si oxymel bibere puer uelit temperetur copiosiori aqua: & hyeme calidum, æstate frigidum offeratur. Sic quidem præter cætera maximè sitim sedat. Consil. de puero epil. Cæterum acidissimum quartam ad mel aceti partem habet dulcissimam octauam. Ibid.

22 Corpus exactè frigidum & simul tenuium partium inuenisse fortasse non est. Nam acetum cum omnium (quæ nouimus) potestate refrigerantium planè tenuissimarum sit partium, admixtam sibi aliquam caliditatem habet. Præterea corpora quæ contingit siccat, quâuis ad imaginem sit humidum. Quò fit ut ad eos affectus quos humectari & refrigerari expedit, solo eo non utamur, sed tanto aquæ frigidaæ admixto, ut possit bibi. 10. Methodi.

23 Quemadmodum nonnunquam serapum pro cibo sic etiam ptisanâ,
pro

pro medicamento usurpamus atque utrunq; in quibusdam sæpe morbis fecimus, in morb. acut.

24 Reperire etiam est medicamēta, quæ cum una sint ipsa vires contrarias habeant, siquidem lapathi folia ventrem soluunt, semen uerò restringit, sic gallinaceorum iuscula: itē brassicæ soluunt, caro ipsa astringit. Aloë squamæq; æris excrecentes ulcerum carnes astringunt, sumpta uerò per os uniuersum corpus purgāt. Lactis serum bibitū soluit, caseus cohibet. Trifolium decoctum impostumq; ferarum moribus auxiliatur, si sanæ parti affricetur non secus, quā uiperæ morsus affligit. Præterea ueratræ coturnicibus, & cicuta sturnis, cibis, hominibus sunt pernities. Gal. de Theriaca ad Pisonem.

25 Quæ uehementer sunt austera & pontica, ut quæ uocantur præcocia & mespili, sorbi, &c. tenui uictus rationi sunt aduersa. Soli autem uentris fluxui, aut uentriculo stomacho, ue imbecilli s conferunt. Galen. de
attin.

attin. uict. ratione.

26 Medicamenta in suo genere odoratissima & flagrantissima semper sunt eligenda. Cæteris qualitatibus, quæ sunt maximè temperata. 5. de com. med. secundùm loca.

Addit Moyses.

Asclepius (Hodie inquit) non proponamus helleborum album pituitosis corporibus, siquidem præter uacuationem habet nimiam quoque refrigerationem, sed pro illo, agarico utimur & similibus.

27 Non omnibus aquæ membris conferunt quælibet medicamenta, sed nonnulla certas partes iuuant, alia uitiunt, ut lepus marinus pulmonem exulcerat. Cantharis peculiariter uesicam. Econtrariò iuuat affectum iecur herba eupatoria, myrobalanus lienem, Saxifragon & betonica renes, &c. Gal, de Theriaca ad Pison.

28 Caricæ cum amygdalis obstructions aperiunt, non tamen ita bonum succum præstant nutriuntque, ut cum nucibus commiscentur. Suntque
caricæ

caricas cū nucibusq; præsumptas uenenis aduersari fateantur. Galen. de eueh. & cacocn.

29 Vinum, lac, acetum, cum sale ebullita prosunt aduersus uenenum, uenenososq; succos corpori nascentes. 6. in 6. Epid.

Addit Moyfes.

Accipe illa non singula tātum per se, sed pro ratione ueneni composita sumi oportere.

30 Crudo succo refertis, quando præcordia turgent, & facile quicqd sumpserint in flatu uertunt, non inutile fuerit & lōgi piperis, aut albi, aut nigri aliquid dare, sed album supra reliqua alium roborat, nigrum quod pondere præcellit, eligendum. 4. de sanit.

31 Lassitudini phlegmonosæ, si carnem uelit gustare æger, saxatiles pisces, uel onitrois ī albo iure (quod anetho, sale, oleo & porri exiguo in aquam coniectis conficitur) benè elixos dabis.

Additio.

Latitudo illa est tensiua cū ex abundantia

dantia sanguinis in thorace uel dorso, uel lūbis, uel capite, uel collo, uel toto corpore tenſio pulſansq; dolor ſentitur. Ibid.

32 Allium itidem ſtatuſcitra ſitum reſoluit, ſed maiori uehementia, quā ciborum alijs quiſquam. 2. Method.

33 Obſtructio lienis aut phlegmone ſcirrhoſa uehementiora ea tum, q̄ eximant, tum quę phlegmonem diſſecent poſtulat. Nam quale medica-
men eſt iecinori abſynthium, tale eſt lienī capparis cortex. Quale ruruſ iecinori quod uocant eupatorium, tale eſt lienī ſcolopendrum. Itaq; etſi capparis ex oxymelite edatur, utilis ſanē utriq; eſt uiſceri. Sed lienī copioſior & ex minus diluto oxymelite erit utilior. 13. Methodi.

34 Infeſtiſſima eſt aloë uel lota, q̄s qui citra uitioſos intemperie laborāt calida & ſicca ſtomachi, etenim intēperantiæ in humoribus conſiſtentes pharmacis ipſas euacuantibus egerit, quæ uerō ſunt in humoribus, penitus in tabem commigrant, ob phar-
maci

maci hieræ picæ ex aloë constantis
exhibitionem. 8. de comp. med. secū-
dum loca.

35 Absynthium miscetur in pastil-
lo Asclepiadis ad stomachi uoluulo-
sas s. buersiones, quod habeat uim
extergendi, repurgandi, & subducen-
di, uitiosos humores stomachi, quod
que constringat & denset roburq; af-
fectæ particulæ addat. Ibid.

36 Bdellium sufficienter concoct
emollitq; necnon moderatè discutit,
sic Therebinthia, sed præterea an-
gustos meatus exterget expurgatq;
quibus rationibus utrunq; hepaticis
remedium est. Ibid.

37 In nardo est non modica uis
cōcoctoria omnium frigidarum ui-
scerum affectionum sita. In celtica au-
tem minor quàm in rudica. Crocus
uerò humorum crudorum est conco-
ctionis, atq; item uirulentarum affe-
ctionum. 9. eiusdem.

38 Hiera confert ijs, qui ob uitio-
sos humores & præcipue biliosos tar-
dè concoquunt. Siquidem quibus
bilis

bilis altius tunicas uētriculi infestat,
 ij præstantius pharmacum non inue-
 niant. 8. eiusdem.

39 Facultatum alexipharmacarū
 natura est duplex. Quædam enim al-
 terant & conficiunt uenam in corpo-
 re, idcūq; aut una qualitate ratione con-
 trarietatis, aut duarū cōiungatione,
 aut deniq; tota sua substantia. Alia e-
 uacuant deleterum medicamen. idcūq;
 substantiæ similitudine aut calidita-
 te subtilium partium. 5. de simp.

40 Omnia quæ deleterijs aduer-
 santur medicamentis si largius sum-
 pta fuerint, grauitèr animantis cor-
 pus offendunt. Quapropter ea mo-
 deratione exhibeantur, ut nec nimia
 copia corpus lædant, nec exiguitate
 sua à deleterijs uincantur. Ibid.

41 Theriace utendum est post ab-
 solutam concoctionem, interdū qui-
 dem instar Aegyptiæ fabæ, cum binis
 aquæ cyathis, interdum uerò auella-
 næ nucis magnitudine ex tribus a-
 quæ cyathis, cum plus temporis ad
 pharmaci distributionem es habitu-

rus.

rus. Galen. de theriace ad Pisonem.

42 Theriace prodest & sanis si crebro ipsam assumant ut conseruetur, nam hoc auxilio sepe succurrimus elephantiacis, nec minus ualet ad animi, quam corporis morbos, quippe melancholicis si saepe exhibeatur, medetur bilem ipsam exhauriens. Item aqua pauorem, qui morsos a cane rabido infestat omnium morborum pessimum tollit, non modo epota, sed etiam admota cum rosaceo, & indita uulneri, ut cucurbitulae instar unius exugat, & extrahat. Ibid.

43 Retulit mihi medicus quidam peritus, circa Antiochiam, morbum pestilentialem inuasisse magnum mortalium numerum absumentem. Cum cetera omnia minus efficacia experirentur medici, theriacam ipse apponi iussit, qua sumpta & morbo iam infecti curabantur, & qui integri erant adhuc seruabantur. Ibid.

44 In confectioe theriaces, bestiarum ex quibus fit capita & caudae auferuntur, quod in his partibus omne

Dd earum

earum uenenum resideat. Reliquū corpus euisceratur excoariaturq̃, omni adipe amoto, tum in fictili uase, cū aqua quantum satis esse uidetur, & germine anethi addito recentisq̃ salis pauxillo coquitur carbone potius quā ligno, donec facile à carne sputæ amoueri possint. Tunc carnes ipsæ & uase exemptæ, cum panis purissimi medulla contunduntur ac lenigantur, & affuso insculi quantum uidetur, manibusq̃ opobalsamo intinctis conficiuntur orbiculi, qui in umbra repositi, ad totius antidoti cōpositionem seruantur. Ibid.

45 Crocodyli piscis puncturā appposito ex eiusdem substantia medicamento sanauit, item mustelæ & ferarum multarum, applicata ex ipsis decepta portione. Ibid.

46 Saporum calidorum quatuor sunt genera, dulcis, salus, amarus, & acer, frigidorumq̃ totidē astringens, austerus, acerbus, & acidus. Vnctuosus uerò mediæ inter utrosq̃ qualitatis. 2. de simpl.

47 Acri-

47 Acrium quædam idonea sunt
 esui, quibus pro obsonio utimur, &
 dulcem quandam etsi obscuram qua-
 litatem habent. Alia non eduntur,
 quæ aut mortifera sunt, ut ne gustare
 quidem audeas, ueluti cantharides
 & thapsia, aut simpliciter medicamē-
 ta, quæ uel ex odore pugnantiam cū
 homine indicant. Cicutapapauer
 mandragora, lycopersium & hyoscy-
 anisuccus. Huius generis exedē-
 tes, urentes crustam molientes, & col-
 liquantes sapes, si uel ipsi cuti im-
 ponuntur. 4. eiusdem.

48 Amara minimè putrescunt, sed
 sunt animantibus propè uniuersis e-
 sui inepta, cū animal omne sit hu-
 midum. Absynthium autem usui est,
 quæ non solum amarum, sed etiam
 astringens. Ibid.

Quod amarum est nunquam fit
 odoratum. Siquidem generatio ama-
 ri saporis ex dulcibus proficiscitur à
 calore extenuatis ac proinde amara
 calidiora simul & tenuiora sunt dul-
 cibus. Ibid.

49 Exploranda est acidi saporis natura in exalide & oxylapatho, ut in quibus reperiatur maximè syncerus & simplex. Etenim quod propriè saporibus appellatur acidum, à sola lingua percipi potest sicuti & acrae. Sed quod utriq; cōmune est, nempe mordacitas etiam à tactu sentitur. Sunt autem acida essentiae tenuis & frigida, ut constitutio borealis, nec nasci sine calore possunt, quemadmodum nec ipse aër. 4. de simpl.

50 Sola dulcia omnia pro dulcedinis modo, calorem etiam protinus continent. quia circa eorum, quæ admodum dulcia sunt, nullum est frigidum. Porro dulcia omnia proximè accedunt, ad eorum quæ talia videntur, idq; aut proprio calore, ut mel, aut acquisitio ut sūt ea, quæ ab igne preparantur omnia. At mustum non solum suo, sed etiam acquisitio dulce esse videtur. Et quæ inueterantur uina calidiora fiunt. Nam cū primū quidem dulcedinem quandam acrimoniamq; habeant, acrimonia cum tem-

tempore deposita dulcescunt, rursus
uerò incremente acrimonia dulcedi-
nem abijciant, & in dies amarescunt
unde constat, dulce esse calidius au-
stero, sicuti & dulci amarum. Ibid.

51 Acerbus sapor (qui est au-
stus) omnis est frigidus, nempe à
frigore, sicut & acidus proueniens,
sed magis terrenus quàm acidus. Sen-
titur autem ab acerbo sapore lingua
manifestè contrahi siccarè asperariq̃,
quæ omnia unius frigoris sūt opera:
exempla sunt in fructu ilicis, qui acer-
bus ad extremum perseverat, item ar-
buti fagi & corni. Myrti uerò, puri a-
grestis & roboris acerbus est, simul
& dulcis. Ibid.

52 Ego astringens, perpetuò frigi-
dum comperi, nonnullaq̃ modicè
dulcia aut amara, aut acria simul cū
astrictione sum expertus etiam aptè
refrigerare. Porro astringens idem ui-
detur significare, quod austum, aut
utriusq̃ commune genus esse. Sed
falluntur, qui astringentia omnia re-
frigerare dictitant, siquidem chalcit-

Dd 3 tis,

tis, chalcanthos & misij, ualenter astringunt, sed tanta caliditate, ut nos etiam exurant. 2. de simpl.

53 Salsa cognominamus, quæ linguam non contrahunt, neque constipant, sed detergunt potius & abluunt, etiam si astringentium quippiam admistum habeant. Ibid.

54 Aromaticum odorem inferentia omnia sunt calida & acris inciduntque & extenuant: humores uero quanquam non æquæ ac mordicantia & rodentia, & insigniter ealfaciētia. Gal. de att. uict. ratione.

55 Abstergunt siue acrimonia ualida hæc, facca farina, alice aqua, lini semen frixum, lac ex ficibus siccis, id est, rarieie coagulatum: sapa etiam rarefacit. At ualentius abstergunt hæc therebintina, thus, manna orobi farina, radices iridis & opopanacis. 7. de comp. med. secundum loca.

56 Medicamenta emollientia uocantur medici, quæ indurata frigore corpora leniendo laxant. Faciuntque potissimum ad apostemata & huiusmodi affe-

affectus materia superfluam in se continentes, quod plurimum calfacere ac coquere, & modicè siccare ualeāt. In quibus affectibus maiore medicamento, quàm parti calorē esse oportet, ut resolvere innatam duritiē possit. Huius uerò generis sunt. Ammoniacum, bdellium, ceratum, corussa, colophonia, &c. 5. de simpl.

57 Inueteratum dolorem siue ex humoribus sit, siue ex flatib. calidis, uel frigidis, medicamenta calida primo gradu siue astrictione iuuant maxime, cū enim sint tenuissima maiorem digerendi, & attenuandi uim habent. 7. de comp. secundum loca.

58 Putrefaciunt maxime, quæ calida sunt & humida, ut quæ hominis in hoc temperamento sint similia. at lotioni commodissima cum aqua tepida uel oleo mixta, & instillationi, oleum mediocriter calfactum In farctiui uerò triticea farina cum oleo & aqua.

59 Ad proritandam abundè urina medicamenta uehementer calida

Dd 4 po

potissimum conueniunt. Huiusmodi sunt. Semen apij, foeniculi, iridos, dauci, siseleos. Ad calculum uerò dissecandum, mediocriter calida, siquidem is ex uehementi calore & siccitate concreuit. Melius ea incidunt temperata radices asparagi, uua passa & oxymel scilliticum. 5. de comp. secundum loca.

60 Eodem genere qualitatibus continentur, quæ lac gignunt, & quæ mēstrua mouent, & quæ urinam prouocant. Omnia enim sicca sunt pariter & calida, sed non æquæ, nam quæ lacti gignendo sunt apta natura, ea mediocriter calfaciunt, nec ualde siccant. Quæ uerò mensibus ciendis, magis calfaciunt, sed non magis siccant, quæ ex his composita, urinas prouocant. 5. de simpl.

Huc pertinebunt simplicium in usum uenientium gradus, qui ex Fuchsio, aut alio docto poterunt describi. Moyses 265. numerat, quæ corpus intrēt, & 20. quæ tantum

tum extra adhibeantur, ex sentē-
tia nescio cuius filij Euferi. Tutius
uidetur hac in parte recentiorum
& cū præsertim ille ex Gal. non
sumpserit nostrorum sequi ordi-
nem.

61 Flauam bilem interdum medi-
ci pallidam uocant. Sciendum tamē
est, flauam tantō esse pallida calidio-
rem, quantō & crassiorē. Nam sero
so cremēto flauæ bili permisto, pal-
lidam constitui contigit, sicuti & fla-
uam ipsam plusculum exalfectam
consistentia reddi crassam, colore au-
tem flauam. Quin & in animalibus
apparet flaua quidem ijs, quæ magis
sunt calida, quæ uerō minus, pallida.
Et ubi calida illa aut fame, aut siti tor-
quentur, ad atrum colorem uergit, in-
terdum habent illum æruginosum,
interdum cæruleum, interdum fu-
scum. 10. de simpl.

62 Vbi ulcus diuturnum fuerit ac
multam saniem, & pus cōtinebit, sic-
ciorem bilem adhibemus puta ouis,
Dd 5. quæ

quæ paulò est acrior suilla, hac etiam magis caprarum, cui adsimilis quodammodo est urforum & boum: at taurorum his ualentior est, inferior uerò bile hyænarum, uolatilium omnes sunt acriores & sicciores quam quadrupedum. Inter ipsas quoque uolucres gallinarum & perd. cum biles ad medicinæ usum probatiores. Ibi dem.

63 Humectantium refrigerantiumque omnium simplicissimum optimumque ad erysipelata, & pudendorum phlegmonas, inter initia priusquam aliqua subindicaretur, putredo hoc ceratum est. ℞. olei rosacei ex omphacino, oleo citra salem confecti uncias 3. uel 4. Cerae albæ, & elotæ unciam unam. Liqueantur simul in uase duplici ac fiat ceratum humidum, cui abundè refrigerato misceatur paulatim tantum aquæ frigida, quantum in se accipere possit, dum cum ea molliatur. Non debet autem super ægrum corpus manere, dum manifestè incaleat, sed assidue subinde mutari,

tari. 10. Methodi.

64 Agrestis quidem allio comesto uinoq; ad uesperam meraciori bibito, à dolore colico liberatus est, neque iniuria. Allium siquidem flatus discutit, ac minimū sitim infert. Quare ipsum Theriacen agrestum appellare soleo. Est ijs omnibus commo-
dissimum, qui regionem frigidam incolunt. 12. Methodi.

65 Quod intestinorum dolor ex crassis succis citra febrem exercet, ijs & allium esse, & theriacem bibere licet. Sin cum febre sit, principio fauentum siccum ex milio, si ferant, adhibendum. Si ab hoc non quiescūt, semen aliquod flatus dissipans in oleo renuium partium coquere, mox per lintheum colare. Dein anseris aut galinaceū semē, nec falsum, nec admodum uetus in ipso oleo liquare, & p sedem infundere. Ibid.

66 Cataplasma ex caricis pingui-
bus dulcibusq; & decoctis confe-
ctum, cui aliquando hordeacea fari-
na, aliquando panis syncomistus, id
est,

est, miscellaneus ex generoso tritico
 confectus adijcitur, conuenit tumor/
 ribus in quibus suspicio crassiores te/
 nacioresq; humores impactos esse
 & difficulter ad suppurationem pro/
 uenit. 2. ad Glauco.

67 Farina hordeacea resoluit plu/
 rimum, sed triticea maximè ad suppu/
 rationem promouet. Si igitur resol/
 uatur tumor, minus tamen quàm o/
 ptes, cum caricis hyssopum & origa/
 rum simul coquere oportet. Deinde
 farinam ordeaceam detracto priùs
 furfure, insperge, & postquam
 plurimum ebullierit ap/
 pone cataplasma.

DE

DE MEDICAMENTIS

per se & ui sua operantibus.

SECTIO XXI.

1.



lrum esse non debet si
uiperarum capitib. &
caudis ꝑcis reliquæ
partes efficacius me-
dicamen reddunt: Nā
ceterorum quoque a-
nimalium pleręq; partes multis mor-
bis per se opitulantur. Veluti muriū
capita, quæ uisita, ex melleq; illita alo-
peciam sanant. Quod idem & eorū
simus ex aceto, & uiperina pellit reda-
cta in pollinem, & cum melle im-
posita efficit Gal. de theriaca ad Cæsa-
rem, siue in Pison.

2 Cameli cerebrum arefactū seu
exiccatum, potumq; ex aceto comi-
tialibus morbis medetur, & mustelæ
similiter: hirundinis uerō ad suffu-
siones oculorum, & ouillum ad den-
titiones infantium cōducit, ut ad ua-
cillantes etiam aliorum ceruinis cor-
nura-

nuramentum adustum cum uino tritum & circumlitum. Ibid.

3 Taurini cornu rasura, cum aqua pota sanguinis ē naribus eruptionē cohibet. Item & fœmora combusta, ut sæpenumero aluum solutam. Ibidem.

4 Bouis talus ex lacte potus educit rotundos lumbricos ascarides dictos, ex oxymelite lienem incrassatū consumit, & attenuat, leucasq; tollit, illitus mediocriterq; uenereus existit Ibid.

5 Item terræ intestinum, id est, uermes terreni triti, & ex melicrato bibiti arcuato morbo, id est, ictericis subito auxiliant. Sic Scarabeus oleo ebullitus, uel frictus & aurium doloribus instillatus. Adeps anatis uel anserinus liquatus, oleoq; rosaceo mixtus, phlegmonis, Hippopotami cutis, usta & lenigata ex aqua phymatibus digerendis: Cancer fluuiatilis tritus.

Illitusq; spiculis & surculis extrahendis:

Alanda usta & comesta colicis,

Vaccini lactis potus dysentericis:

Testis

Testiculi castoris poti conuulsionibus,
Crocodili adeps partibus ab ipso laxis.

Milui caput absq; plumis combu-
stum & quantum tribus digitis com-
prehendi potest bibitum, podagre.
Ibid. Vino imbecillo & aquoso ser-
uando ne ace scat. Stœbæ copiosa in
calidissimam donum coniecta. qua
industria usus est, & pater meus. In-
funde bat autem, ut a scopo non erra-
ret, uinum nouum non nouis uasis,
sed ex quibus aliquod iam uetus ua-
cuasset. i. de antidotis.

6 Lapis phrygius crudus acerri-
mus ignitus & cum alijs quibusdam
tritit fit oculorum præsentaneum re-
medium. de theriaca ad Pisonem.

7 Radix pæoniæ astringit estq; o-
mninò resiccatoria, quare ex collo
pueris suspensa comitiat, morbum sa-
nat. idq; aut aliquem ex se fluorem p
infantuli inspirationem immittens,
aut aërem assidue mutans, atq; alteri
reddēs. Nam hoc succus cyrenaicus
columellam phlegmone affectā iu-
uat, & melanthium frictum, palā ca-
tharos

tharrhos & coryzas desiccat, si quid id in calidum linteum rarum liget assidueq; ex eo caporum p̄ inspirationem trahat in nares. 6. de simpl.

8 Si compluribus linis & maximè marinæ purpure, quibus collo uiperæ iniectis præfocaueris, postea cuiuspiam collū obuincias mirifice profueris, tum paristhmīis, tū omnibus iis, quæ in collo pullulant. Ibid.

9 Stercus canis, qui solis ossibus fuerit integrum biduū nutritus, durum cādidum & minimè fœtens, exiccaturq; & redactum in pollinem ad anginam, dysenteriam, & summæ inueterata ulcera accōmodatum est. Ad anginam quidē, iis mistum, quæ alioqui huic affectui conueniunt, si soluentibus ad dysenteriam iniectū lacti decoctum, & quod silices candentes, aut cylindros extinxerit. 10. de simpl.

10 Sic pueri stercus, triduam optimo pane nutriti & lupinis, ac uino modice diluto, quarto die exiccatur, & cum melle attico ad leuorem tritum

tum illitumq̃, gutturis inflammatio-
nibus auxiliatur. Lupinum quod (si
potest) non deciderit in terram uino
albo, aut aqua temperatum, & potū
colicis qualibus hora si uacent phle-
gmone. Et illis appensum uinculo
ex lana ouis à lupo laniata aut cerui-
na pelle confecto.

Caprillum farina fabacea adiecta,
& oxycrato induratis lienis aliarum-
que partium tumoribus, ustum uerò
alopecijs & omnibus uitijs, quæ ex-
tergentia postulat pfore, lepræ, liche-
ni, &c. Eo etiam quidam medicus in
agris utebatur ex aceto ad uiperarū
morsus aliarumq̃ bestiarum ac pro-
fecto ex ijs complures seruauit. Idē
etiam spyrathos ipsas ad auriginem
ex uino propinauit, & ad profluuiū
muliebre, cum thure apposuit.

Acrius tamen est medicamē quod
mulieres urbanas aut pueros, aut o-
mnino qui tenera sunt carne sanare
possit.

Bubulum uesperū morlibus, exic-
cat enim & attrahit. Et hydropicis

Ee obli

oblitum postea in sole expositum : item phlegmonis, sed humidum ab herbis comestis accommodatius, & à puleis.

Ille idem medicus ouillo utebatur acrochordonas mymecias, thymos, furculos aceto uidelicet diluens. ad ulcerum ambustam cerato rosaceo.

Columbino, sicco, trito, & cribrato una cum nasturtij, semine uice napyos utar ad omnes inueteratos affectus, qui rubrificari postulant, coxendicem, hemicraniam, scotomata, uertigines, cephaleam, & laterum scapulatum ceruicis ac lumborum dolores antiquos, ad affectus coeliacos, podagras, arthritidas, quando in articulis nondum concreti sunt.

Gallinaceum tritum propinatūque cum tribus quatuorue oxycrati, aut oxymelitis cyathis, eos iuuat, qui à comestis fungis auguntur. Infirmus autem concludarū, quàm in agris paratarum pallinarum.

Anserinum præ nimia acrimonia inutile, ita etiam accipitrum, aquila-
rum

tum & ciconiarum. hæc omnia Gal.
10. de simpl.

11 Salina ieiuni uētriculi post probam concoctionem, nutrices pueris lichenas curant, paruum, uidelicet digitum rigantes, ac deinde cutem affectam confricantes. Ibid.

12 Triticum mādentes rustici non pauci furunculis imponunt. Nam celeriter eo digerit concoquitq; cum si macerarent aqua, non æque prodesset. Ibid.

13 Maximè digerentem exiccantemq; uim (ut ferunt quidam) ossa humana obtinent. Noui siquidem numerantiū quosdam combusta illa potui exhibuisse, ac multarum sic epilepsiam & arthritum curasse. 11. de simpl.

14 Exuium serpentis quidā cū in aceto bullitur scripsere dentium doloribus mederi. Ibid.

15 Albumen oui opthalmiis, & ulceribus sedis ac pudendorum omnibus contumacibus. Vitellus maximè naturalis proinde ceratis minimè

mordicantibus misceat, exiccat enim
& mitigat. Crudum uero totum ro-
faceo admistum palpebris, mammis
auribus alijsq; partibus inflammatis
adhibetur. Ventrīs quoq; fluxionib.
in aceto coctū & esum, Ambustis u-
tilissimum protinus impositū, siue al-
bunem solum molli lana exceptum,
siue totum cum uitello confusum &
commixtum. 11. de simpl.

16 Intestina terræ contrita ner-
uisq; diuisis imposita mirum in mo-
dum ea prodesse est proditum. Præ-
terea cum uino pota, urinæ mouen-
dæ idonea. Ibid.

17 Acetum quæ ex incidentium
ordine est discutitq; & repellit, ob exi-
guam quam habet substantiæ cali-
ditatem, & summam frigiditatē, quæ
tenuium tamen est partium idoneū
ad achores fauoresq; incidendos, &
facultate sua discutiendos ac re-
pellendos. 2. de com. med.
secundū loca.

DE

DE DEFINITIONIBVS

*morborum et quorundam quibus
ambiguorum distinctionibus.*

SECTIO XXII.

I.



Epletio in uasis dicitur
copia maior sanguinis
quam fuit, qualitate nō
mutata. Repletio in ui-
ribus sanguis in affectū
contra naturam mutatas, ueluti acrē
mordentem crudum, &c. etiamsi nō
sit eius magna copia. Gal. de uenæ se-
ctione, & lib. de Repletionē.

Addit Moyses.

Succus quem crudum & indigestū
dicit Gal. lib. de plenitudine, ex quo
hydropem hypofacrum ait fieri, is est
quē sæpe alibi uocat, Phlegma cras-
sum simile fabaceæ farinæ decocto.

2 Sanguis purus omnino in cor-
pore nullus est, nam ei bilis utriusq;
& pituitæ semp̄ aliquid admixtum.
Propterea cum sanguinis plenitudi-
nem dico humorum quatuor reple-

Ee 3 tio-

tionem intelligo. de plenitudine.

3 Sanguis ærugineus appellatur, cui inest acredo quædam uenenosa, & substantiæ tenuis aquasitas. 2. in 2. Epid.

4 Chymos, id est, humor uel succus humidus propriè in animalibus. Chylus uerò in fructibus dicitur. in 1. de humoribus.

5 Humores plantarum duplices sunt. aut enim comprimuntur, ut in uuis, malis granatis, cydonijs & huiusmodi, & frondibus è quibus exprimitur succus, dicunturq; hi propriè chyli: aut ex ijs profluunt, quorum q subtilissimi sunt Lathrymæ dicuntur, ut in ramulis uere succisis cernitur, q crassiores fæcus, uim liquatis, q deniq; iam spissi, Erumni liquor quidē non dissimilis lacti. Gal. in Timæū.

6 Sudor & uapor in hoc differunt quod sudor humida est ex humorib. exiccata substantia: uapor uerò fumus ex humore ipso resoluto. Gal. in lib. de resolutione humorum.

7 Cibus concoctus dicitur, ubi is
secun-

secundum qualitatem mutatus & particulis, quæ nutriuntur assimilatus est. quæ actio etiam nutritio appellatur. Gal. de Euchym & cacoch. & de consuetudine.

8 Bilem flauam medici solent simpliciter communi nomine bilem appellare, nulla coloris adiecta distinctione, cum interim melancholiam semper atræ nomine dicant. ultimo de uict. ratione, in morbo acutis.

9 Membra & humores corruptos non continuo putres appellamus, sed ubi cum odore foetido corruptio irrepsit, tunc putredinem inesse dicimus. 5. de simpl.

10 Si instrumentorum quibus respiratio fit, resoluti sint nerui, apnoea, hoc est, abolita spiratio, si uero uocales nerui, aphonia, id est, uocis priuatio uocatur, at linguæ paralytis et si sermonem uoluntatis opus omnino tollat, nullum tamen proprium nomen obtinuit. 2. de symptomatum causis.

11 Ex genere arthritidis est, tum
Ee 4 ischias,

ischias, tum podagra. Quod enim in omnibus articulis est arthritis, id in uno iuxta coxēdicem quidem ischia da, iuxta pedem uerò podagram appellant. Incipit igitur plerunq; podagræ generatio, ex uno articulo temporeq; in omnes progreditur. Communem habent hi tres affectus redūdantiam humoris, aliquando quidē sanguinem, ut plurimum uerò pituitosi, qui propriē crudus appellatur. Differentia autem ex colore cognoscitur. 10. de comp. med. secundum loca.

12 Morbi epidemiæ populares dicuntur uulgò, qui quibusdam gentibus, ut plurimum accidunt ex aëre, uel aquis, uel alijs nutrimentis quibus utuntur ipsi. Pestilentialia qui certis annis, ex iisdem corruptis. in 1. de uentis & aquis.

13 Phtisis seu tabes appellatur, quælibet humoris naturalis exiccatio, siue ea ex inflammatione partium solidarum, siue ex intemperie sit, sed propriē, quæ ex pulmonis ulcere nascitur

scitur ea tabes est. 2. in 1. Epid.

14 Matrix aliquando neruus dicitur, & uicissim neruus, aliquando uirile, uel muliebre pudendum. Conueniunt enim hæ partes inter se, in tensione, dilatatione, contractione, albedine, & sanguinis carētia. Sunt quæ pudenda composita ex neruo, ligamento, & tendone. 1. in 6. Epid.

15 Tabes simplex dicitur cum uniuersi corporis partes siccantur, altera uero contrarietas, quæ inter calidū & frigidum existit, intra suos terminos manet. Qualis solet inedijs accidere tam eorum, qui sponte inediā tollerant, quam qui fame conficiuntur. Compositus uero cum præter siccitatem, caloris uel frigoris accedit immoderatio: frigoris, ut in senibus uel ijs, qui affectum senectuti simili detinentur. Caloris, in febribus hecticijs. Quocirca si tabes affectio est uniuersi corporis necesse est, ut in tabidis, ipsius cordis corpus quod est principium animantis, arescat. Galen. de tabe.

Ee 5 Moy,

Moyſes.

Fortaſſe (credo) attendēti, quę Ga-
lenus de rigore, tremore, horrore, &
conuulſione præcepit, uidebuntur.
Rigor & tremor uniuoca. At medici
tamen uocant tremorem eū, qui ex
uirtutis defectu fit, motum, qualis
cernitur in ijs, qui onera grauiora fe-
runt, & ſub pondere gemunt, aut ijs
qui ſublimius gradientes metuunt,
& ijs qui ex longo morbo uacillant.
Rigorem uerò dicunt, eum qui ex
gravi affectu neruo inhærente, & a-
lijs quibusdam repugnantibus qua-
litatibus conficitur.

16 Functionis à uoluntatis impe-
rio prodeuntis noxa eſt, neruorum,
reſolutio, conuulſio, tremor, ſtupor.
Si paralyſis totū corpus inuadat ſym-
ptoma ipſum apoplexia uocatur.

Conuulſio pro uarietate particula-
rū uarias appellationes habet. Man-
dibularum muſculi, dicit ſtridor den-
tium, oculorum peruerſio, & ſtrabi-
lis eius, penis rigidi, gonorrhæa. Vni-
uerſi corporis reſolutio, epilepſia.

At

At stupor, imperfecta neruorum resolutio, mistaꝑ ex coëuntibus in unum, pugnantibus morbo simul & facultate.

Tremor, pugnancia facultatis cum grauitate, actio enim est uoluntaria, sed cū facultatis imbecillitate facta.

Palpitatio est dilatatio præter naturam omni parti, quæ naturaliter dilatari nata est molli scilicet, ueluti musculo, uisceribus, corde & arterijs.

Rigor autem non uniuersi corporis, ut palpitatio & conuulsio, sed expultricis facultatis tantum. Motus igitur est compositus ex causa præter naturam & facultatē animantis, sed in quo uirtus, quā in tremore est uergetior. Gal. 2. de sympt. causis.

16 Hæmodia & torpor symptomata sunt factus. Hæmodia quidem dentium stupor, qui ob acidos acerbosꝑ cibos plurimum oritur.

Torpor autem in toto corpore contingere solet ex sentiēdi mouendiꝑ difficultate affectus cōpositus. Torpescunt uerò nerui obstructi, uel immodica

modica crassitudine nutriti, uel uio-
lento frigore per frigerati, uel laqueo
uel manibus constricti, aut extrinse-
cus à uicinae partis phlegmone, uel
scirrho compressi, aut laxatis fractis-
quē ossibus arctiores facti. 1. de sym-
ptom. causis.

18 Asperæ arteriæ pharmaca mos
est appellare arteriaca. Vocant enim
asperam arteriam uiam illā, quæ du-
cit à larynge ad pulmones ex cartila-
ginosis corpusculis bronchis dictis
conflatam, unde etiā tota arteria in-
terdum dicitur bronchos. Organa i-
gitur uocis cum dico, intellige, arte-
riam & laryngē, & pharyngem, seu
epiglottida. 7. de comp. med. secun-
dum loca.

19 Inæquales pulsus sicuti & cæ-
tera ferē omnia pristinam naturā mu-
tantia, quatenus æquam semper mu-
tationem recipiunt æqualiter dicun-
tur mutari. Quæ uerò minimē parē,
ea inæqualiter inæqualia uocantur.
Ut Myuri pulsus, qui semper magis
ac magis imminuitur. Primò enim
pul-

pulsus secundus est minor. Tertius secundo, quartus tertio & sic deinceps. *Μύουγοι* quasi imminuti sumpto nomine à turbinatis figuris appellantur. 1. de differ. pulsum.

20 Ex myuris pulsibus, qui perpetuò minuuntur nec minui desistunt, donec ad quietem omnino recidunt motuq; deficiuntur, eos deficientes *μυούρους* uocant, atq; ex ijs rursus, qui in quam semel paruitatem destiterūt hanc constantissimè seruant *μύουρος* stabiles dicuntur, qui uerò rursus augetur *μύουροι* reciproci. Ibid.

21 Febris continens & continua homonyma sunt, utraq; enim synoches dicitur, quo nomine & ardens continetur. 2. de Crisib.

Moyse.

Galenus ibidem compositarum febriū duas facit species, inter quas, quæ ex tertiana & quotidiana complicantur, diuersis horis inuadunt, q̄ uerò in totū confunduntur certo eodemq; tempore, de quibus etiam. 2. de febribus.

22 In

22 Incoctas uocant pleuritides, quæ cum febris acuta dolore laterum, ueluti intensorum, uel punctorum spiratione frequenti, pulsu paruo, tussi magna, aliquando cum coloratis sputis, aliquando etiam sine his celerissime hominem rapiunt, uel longo temporis spatio finiuntur. Sed sunt alij etiam laterum dolores cum febris, & cum spiratione exigua, sed sine sputo, ut in eare nihil à pleuritide sine sputo differant. Verum discerni possunt, quod in his nulla omnino tussis molestat illis pleuriticis sicca adsit tussis: Item hi neque duritiem pulsus, neque tensionem, neque perinde acutam febrem, nec adeo difficilem spirationem habent ut illi. Sunt etiam nonnulli, qui extrinsecus presso inflammato loco, dolere sese fatentur, atque non per sputum purgatur minimè, quæ principio nil succi uitiosi ad thoracis spatium peruenit. At inflammatio ne concocta, nisi prius prius discussa fuerit ad cutem usque attollitur inciditurque. 5. de locis affect.

23 Ciuitates orientales dicuntur, quæ uersûs orientem uergunt, quas Sol oriens illustrat & uentus orientalis perflat. Occidentales contra ad quas Sol non fertur usq; ad uesperum. in 2. Hipp. de uentis.

24 Tenuēs exiguæq; pustulæ per summam cutim excitatæ, & serpentes *κρυχίας ἑρπιντες* dicuntur, id miliares tumores exedentes. Si uerò crassiores sint & totâ cutim subiectamq; carnem; usq; ulcerantes serpunt *ἑρπιντες ἐδιδυμμοί*, propriè exedentes herpetes appellantur. in 6. Aphorism. & lib. de tumoribus, cū fluxio biliosa. Hæc quidem magis acris, hæc uerò minus sit sciendum est ab acriori herpetem exedentem ab altera milia rem fieri.

25 Fistula sinus est angustus & longus fistulæ in modum ad quē humores effluunt, ob eamq; causam astringitur, & rursus diducitur. Gal. de tumorib.

26 Carbunculus est tumor ex sanguine tanquam feruenti, inflammationi

tionis propinquo, & cutim exurente excitatus quem bullæ præcedunt, & cum crusta fit, quemadmodum in ambustis, acutamque febrim infert, & vitam trahit in discrimen. Ibid. & 1. de febris. Ex sanguine calidissimo, atram bilem referente nasci dicit.

27 Cutis quæ secundum naturam se habet laxa est, quapropter eius sicut & carnis media quædam spatia inania conspiciuntur: quæ cum implentur sanguine ex uasis quidam paruum tunicas resudante, & in quacunque carnis particula admodum roris permixto, fit tumor qui phlegmone appellatur. cum uero ob incubentem cutim densam duramque, pus ibi detinetur, aut humor alius principio oritur, qui temporis processu excoriet, atque a contentis continetia dispescat, abscessus dicitur. Porro dum pus corpora excoriat, continentiaque a subiectis diducit, ac deinceps eo utcumque uacuato, quæ dissident inter se pristinam constitutionem nequeant recuperare, is affectus uocatur sinus, Gal. de tumoribus.

Ad-

Addit Moyses.

28 Abscessus nomen secundum Hippocratem, ac de omnibus tumoribus dicitur, & in medicina sic ubique usurpatur, ut Galen. etiam 1. in 6. Epid. ait.

29 Scirrhus exquisitus tumor est, præter naturam insensatus durusque ita, ut curationem non recipiat, non exquisitus, qui ex humore viscido crassoque & tenacissime partibus induratis infixus ortus est, non omnino insensibilis, sed uix curationem admittens. 2. ad Glau.

30 Abscessus iam in medio carnis consistens ita, ut membrum efficiat mortuum, nec punctiōem, nec sectionē, nec unctionem sentiens, Gangræna appellatur. denigratus, quod ex sanguine supra modum crasso atque ipsi parti affecte impacto oriatur. Curatur autem copiosa sanguinis impacti euacuatione, ut reliquo exhibeatur transpiratio: & cute uniuersa multis sectionibus. profundis, una cum subiecta substantia multisque scarifi-

Ff

ficat

ficationibus incisa. Ibidem.

31 Interdum miscetur erysipelas
œdemati, diciturq; erysipelas œde-
matosam, quemadmodum ubi ex ni-
mia refrigeratione durum ægreq; so-
lubile est redditum erysipelas scirrho-
sum uocabitur. 14. Methodi.

32 Vocatur impresentiarum scirr-
thus omnis tumor durus & indolēs,
non tamen omnino absq; sensu: talis
enim non est sanabilis. Ibid.

33 Ulcera præter modum maligna
appello in quibus aut pars affecta, tā-
uitioso affectum est prædita, ut uel o-
ptimum sanguinem, qui nutritionis
gratia confluit corrūpat, aut id quod
influit adeò peruersum existit, ut eti-
am si pars rectè se habeat ab ipso, ta-
men solo erodatur. 4. de comp. secun-
dum genera.

34 Distinguenda sunt cacoëthe
ulcera ab ijs, quæ difficulter ad cica-
tricem perueniunt, cum non omnia
cacoëthe ulcera ægrè cicatricem ada-
mittant, id est, non sint dysepulotica.
Porro quæ ulcera ex humorum con-
fluxu

fluxu, uel multorum, uel acrium oriuntur, ita tamen ut locus affectus influente humorem, quamuis bonum non sit corrumpere aptus, ea dysepulotica, hoc est, ægrè ad cicatricem peruenientia appello. Ibid.

35 Scirrhorum duæ species, una quidem ex lenta crassaq; pituita, altera ex fæce sanguinis, quæ nigra dicitur. Vtriq; autem cõmunia sunt, maior quam pro ratione naturæ tumor, tum dolore uacans, tū durus & quandoq; ex se gigni, quandoq; ex mutatione alius tumoris immoderatus refrigerati. Gal. de tumorib.

36 Cancrī ex atra bile facti, si citra feruorem fuerint, cancrī sine ulcere, sin acriorem eam esse contingit cancrī exulcerati dicuntur. Ibid.

37 Omnes huiusmodi affectus & præsertim cancer ab humore melancholico oriuntur. Cæterum ut à calidiori carbunculus, ita ab eo qui minus est, calidus oriri cancer consueuit. Cū autem natura uasorū, quæ ad sedem sunt reserans uenam, huius-

Ff 2 modi

modi humorem excernit commistū sanguini: Hæmorrhoids dicitur. Si uero ad crurium uenas transmittit, uarices: Si denique ad cutē ipsam, lepra. Gal. de atra bile.

38 Si fluxio biliosa in aliquē partem decumbat, eaq̃ ab exquisita bile procedat, quæ sit acus & cum erosionē fiat, affectu semper proximam cutem inuadente, herpes exedens dicitur. de tumoribus.

39 Scabies & lepra melancholici affectus ad solā cutem spectant, quæ admodum si in solis uenis & carne fiant nomen obtinent cancri. Ibid.

40 In hydropicis copia quidē materiæ eadem in regione aggregatur, aquosæ sanè in ascite flatuosa in tympanite, pituitosa in affectu, anasarca, & eo quem leucophlegmatia appellant. Ibid. & in 4. Aphor.

Hydrops tympanites est, quē Hypococrates hydropisim siccam nuncupat.

41 Oedema, tumor est ex tenui pituita, qui latior quidem, & longo maior est

ior est aneurismate, nisi quādo grun-
nus adnatus coalitus ex aneurisma-
te sphacelum, id est, syderationem ef-
ficiat. Sic enim uniuersam solidorū,
corporum corruptionem, ita ut ossi-
bus quoq; insit, appello. Gangrēna
autem & ipsa solidorum corporum
mortificatio est: uerū ossa non cor-
ripit, maximasq; sequitur inflamma-
tiones. Ibid.

42 Differt inflatio ab œdemate, q̃
ille tumor sit laxis digitisq; cedens,
utpote à pituita ortus. Inflatio autem
maximè renitatur tangenti, sonitūq;
uelut tympanum reddat, utpote à fla-
tuofo spiritu in concauitatibus colle-
cta orta. ultimo Methodi.

43 Propter humorum inopiam à
quibus nutriri solent capilli, caluities
accidit, propter uitium autem alope-
cia & ophiasis. Etenim laesa capitis
pars serpenti similis in ophiasis appa-
ret. Alopecias autem sic appellari fe-
runt quod frequenter uulpibus acci-
dant. i. de comp. secundū loca.

44 Achores, tumores sunt præter

Ff 3. natu-

naturam, cum affecta particula foraminibus. quibusdam tenuibus erodit, tenuique humore & modice uiscido redundantibus. His proxime accedit cutis alia affectio quæ λυριόμ Grecis, latinis fauus dicitur, foraminibus in eo maioribus, in quibus humor hyemettio melli similis continetur. Ibid.

45 Achor ulcus est in capitis cute quod facile conſcias pituitæ salſæ, & nitroſæ eſſe ſobolem, ut à quo ſani es quædam, nec aquoſa ſimpliciter, nec ita ut mel craſſa deſluit cuiuſmodi eſt in ceria ſeu fauo. de tumorib.

46 Glanduloſarum partium inflatio ubi ad ſcirrhum peruenit, iſ affectus ſtrumæ & choirades appellatur. Ibid.

47 Vbi indurantur teſtes, σαρκόκνηλοι & Ramex carnoſus dicitur, cum autem in horū tunicis humor aquoſus colligitur: hydrocele. Epiplocele autem & euterocele omenti, & inteſtini deſcenſus eſt in eaſdem tunicas. Κυρσοκήλη, uaricoſus ramex recens nomen in eadem parte dicitur quam
quam

quam ueteres omnes turgentes uenas dixerunt uarices. Ibid.

48 Imaginatricis facultatis corruptio & uniuersa exolutio cataleptis dicitur: functionis eius mediocris offensio & imbecillitas, delirium ac lethargia. Sic ratiocinationis exolutio amentia est, defectus seu imbecillitas, fatuitas, deprauatio, delirium. Plerumque siquidem in utrisque simul consistit delirium, tum parum probe imaginando, tum parum apte ratiocinando. de sympt. differentijs.

49 Ut crassus pituitæ succus, ita melancholicus sanguis comitialem morbum solet efficere, ubi in meatibus uentriculorum cerebri retinere, siue is medius sit, siue postremum. Vbi uero in ipso cerebri corpore abundat, eam insaniam speciem, quam Græci uocant melancholiam, inducit. Quæ admodum alter atræ bilis succus, qui præassata flaua bile nascitur, ferina gignit deliramenta modo cum febre, modo absque febre, in cerebri corpore abundat. Atque hæc ob causam Phre-

Ff 4

nitis

nitis interdum est mitior, ubi à pallida bile ortum traxit, interdum uehementior ubi flaua bilis eam peperit. Deliria autem quæ per febrium uigores fiunt, non propria cerebri affectione, sed per cōsensum fiunt. Quā obrem sic delirātes non appellamus phreniticos: quæ phreniticorum insania non quiescit mitigato febris dolore, sed ardentis febris symptoma, quod fit elatis ad cerebrū multis uaporibus calidis. 3. de locis aff.

50 Veteres apoplexiam, lunam appellarunt, quia interlunio soleat accidere. Plato uerò dæmoniam tanquam diuinæ sedis, id est, cerebri affectum. 4. in Tymæum.

51 Tertium melancholiæ genus, ut epilepsiæ reperitur quod, ortum à uentriculo suscipit, solentq̃ medicorum nonnulli hanc dispositionem hypochondriacum flatulentumq̃ morbum uocare. Cuius morbi causam calorem immoderatum uenarum mesaraicarum, obstructionemq̃ earundem à crasso sanguine ortā Diocles
affi-

assignat. Comituntur eum ructus acidi & flatus, & aestus, uentriculi uehementes dolores, moestitia & metus, &c. ibid.

52 Cephalea est capitis dolor diuturnus, difficulterque solubilis, qui à parua occasione uehementes possidet accessiones, ita ut qui eo torquetur, neq; strepitum, neq; uocem, neq; luminis splendorem, neque motum perferre possit, sed tranquillitatē obscurumq; cubiculum quærit ob doloris uehementiam. ibid.

53 Si quando tota anterior cerebri pars afficiatur supremū eius uentrem, & cogitandi quoq; actiones uitari necesse est. Proinde nec sentit, nec mouetur homo, spirandi tamen facultas in eo non leditur. Vocaturq; hic affectus Caros siue sopor. Qui si uehementer spirationem opprimat, Apoplexia nominatur. Fit aut sapor (authore Hipp.) affectis musculis temporum atq; in acutis morbis. In medio est Epilepsia conuulsionem uniuerso corpori inducens, sed in paralysim

Ff 5

lysim non desinit. Horum trium morborum frigidus crassusq̃, aut omnino uiscidus humor causa est. At in sopore anterior pars magis, in apoplexia & morbi comitiali utraq̃. In Catalepsi & uigilanti sopore posteriora cerebri magis leduntur. 4. de locis affect.

54 Cum omnes pariter nerui, tum sentiendi, tum mouendi uim amiserint, affectus apoplexia dicitur. Vbi uero alteri lateri, aut dextro, aut sinistro id accidit, resolutio nominatur eius, scilicet partis in qua consistit affectus. 3. eiusdem. Potissimum autem dicitur resolutio neruorum ubi motus deperditus est.

55 Conuulsio pro uarietate particularum uarias appellationes sortitur. Nam si mandibularum musculi conuellantur, stridor dentium, si oculorum, peruersio & strabismus. Si rigido penè semen effluat Gonorrhœa. Si inspirationis organorum, singultus. Si uniuersi corporis epilepsia. 2. de causis symptom.

56 Id

56 Id quo tangente afficimur, & quo separato quiescit affectus, causam esse ipsius affectus omnibus in confesso est. 1. de locis affect.

57 Post summi uigoris tēpus sepe quidem nulla fit crisis, sed paulatim soluitur morbus, longo tempore cōcoctionem recipiens: huiusmodi solutionem absolutē crīsim non nominō. Si qua uerō confertim fiat permutatio, & multo magis adhuc agitatio nem quæ illam præcedit ita appellare consueui. 1. de Crītib.

58 Quoniam quo die morbi naturam quis possit cognoscere ostendimus sciendum est, diem per totū sermonem nostrum in ea significatione accipi, ut non solum lucem, sed etiam noctem complectatur. Sicuti & mensem ex triginta diebus constare dicimus, & annum trecentis sexaginta quinq. 2. de Crītib.

59 Ut igitur recta propriaq. nōminum appellatione utar, afficitur quidem caput, quando condolescit uentriculo. Aegrotat uerō, quando proprio

prio morbo laborat. Similiter uentri-
culū affici dicimus, ubi à uitiolis mo-
lestatur humoribus, ægrotare uerò
aut per intemperiem propriam, aut
ulcus, aut inflammationem, aut ab-
scellum. 1. de locis. aff.

60 Parenthyma est trāsfusio, quæ
impresentiārum molem carnis pin-
guitudinisq; significat. Gal. de ple-
nitud.

61 Quæ ulcera omnibus ritè de-
centerq; factis non sanantur, ea me-
dici cacoëthe, hoc est, maligna contu-
macia rebelliaq; nuncupant. 5. Me-
thodi.

62 Diariæ febres, nisi rectè tractē-
tur in putridas & hecticas transeunt.
Putridas enim appello, quæ ex hu-
morū putredine: hecticas uerò quæ
ex immodica solidarum partium na-
scuntur calfactione. 9. Meth.

63 Obstructio ex crassorum glu-
tinosorumq; redundantia orta est, q̃
morbus instrumētalis existit, eorum
quæ obstructa sunt corporum. 11. Me-
thodi.

64 Con-

64 Contemnere quidem nomina oportet, sed non scientiam rerum cuius rei non ignarus Hipp. ait: Medicina appositio est & detractio deficientium appositio, redundantium detractio. Ibid.

65 Exercitationis epileptici scopi sunt, ut priusquam fatigetur quiescat & corpus calefiat. Quod si ultra hos terminos producat nonnihil iam attingit solida corpora, atque habitudinem ipsam colliquat. In articulis autem potissimum atque in musculis colliquationes fiunt, unde uirium infirmitas sequitur: deinde ulcerosus sensus quando æger conatur mouere aliquam particulam. atque id est, quod lassitudo appellatur. Galen. in cōsil. pueri Epileptici.

66 Si exquisita utamur nominum appellatione, quod mediū in singulis est, id *ὑπερμετρώ* siue temperatum dicemus. Quod autem ab huius recedit modo si ad calidius, tum plus, tum minus calidum, sin ad frigidius, plus uel minus frigidum, & sic de cæte.

cæteris. 3. de simplic.

67 Emplastica medici appellantur, quæ citra morsum deiciant, & caloris ac frigoris mediam constitutionem habent, qualem præbet sensum aqua omnis qualitatis uacua terrestres, aut terræ ad frigidius paulum inclinantes, cuiusmodi est cera elota, ex mel le aquasiori, & minimè mordaci. 4. de simpl.

68 Quibus arctiora sunt crura, quæ ordo naturæ postulet magna ex parte fiunt uatij, Vari autem quibus magis curuata. Voco enim uatium, cui in exteriorem partem crus uertitur: uarum cui è conuerso. Gal. de caus. morb.

Sicciores particulae dicuntur, quæ minus carnosæ sunt, cuius generis circa digitos, articulos quæ habentur: præterea quæ circa aures, nasum, oculos, dentes, atque ut semel dicam ubi crebre cartilagines, & membranulae, & ligamenta, & ossa, & nerui adsunt. Adeps uerò & caro uel omnino nulla est, uel perexigua. 4. Meth.

69 In

69 Inherens corneæ membrana si phlegmone sit obsessa, etiam ex accidenti potest impedire uisionem, quæ affectio dicitur ophthalmia. At chymosis & unguis non ex accidenti, sed primaria ratione pupillam ipsam obscurant, quemadmodum genarum ingentes tumores præter naturam. 4. morb. & sympt.

70 Proptosis est uncix membranae procidentia ab erosionem rptione uel corneæ contingens. Hypopius est quando pus sit cornea nunc altius, nunc in fumo colligitur. Et, Trachoma interna palpebrarum scabrities, & asperitas. Et, Psorophthalmia, pruriginosa, palpebrarum scabies cum robore, & pilorum defluuium. Rhas caruncula circa maiorem oculi angulum imminutio. 4. de comp. per partes.

71 Aegilops est inter nasi os, & maiorem oculi angulum, paruū quoddam exiguo abscessui per simile tuberculum cui nisi naturæ occurratur, infistulam abit ad os usque. 5. eiusd.

72 Surc

72 Surdaſtri ſunt, qui exiguas qui-
dem uoces omnino nō audiunt Ma-
gnas autē uix percipiunt, quod ſym-
ptoma paulatim progreſſu tempo-
ris augeſcens perfectam ſurditatem
inducit. 3. eiſdem.

73 Ex genere tumorū præter na-
turam eſt Polypus in naribus, Oze-
næ uerō ex genere ulcerum. Ibid.

74 Vicerationes oris ſuperficie
obortas aphtas appellant. Habentes
quippiam igneę caliditatis. Fiunt au-
tem plurimum pueris lactentibus,
quum aut uicioſum fuerit lac nutri-
cis, aut non probē ipſum concoxerit
infans idēq; ſine putredine, cum uerō
putredo accedit depaſcentes uocant.
6. eiſdem.

75 Pars illa, quæ cum faucibus a-
ſperam arteriam cōnectit, & quæ ſur-
ſum nobis tranſglutientibus fertur,
cuiq; uocem aſpera arteria parat La-
ryn timer uocatur. Primum & principalif-
ſimum uocis inſtrumentum, uas au-
tem quod à faucibus in pulmonem
deſcēdit aſpera arteria, & Bronchis
dici-

dicitur. 5. de usu partium.

67 Cum gutturis musculi inflammantur is affectus angina dicitur, cuius genera sunt quinque. Primum ubi inflammantur fauces, hoc est, internus oris locus, ubi & gulæ, & gutturis partes extremæ coeunt. Secundum ubi nec fauces, nec reliquæ oris partes, nec etiam externarum partium ulla inflammata uidetur. Laborans tamen suffocationis periculum, in gutture sentit. Tertium ubi extrinsecus circa fauces inflammatio apparet. Quartum ubi gutturis partes tam externæ quam internæ inflammatae uidentur. Quintum cum ad anteriores partes colli luxantur uertere. 3. de locis affectis.

77 Qui citra febrem dense respirant ob id symptoma dicuntur asthmatici, id est, anhelosi, & orthopnoici, quod thoracem recto spirare cogatur metu suffocationis. Cuius causa est coarctata interna capacitas ipsis præter naturam, purulentis ob collectum inter thoracem & pulmones, hu-

Gg morem.

morē Peripneumonicum ob pulmō
nis inflammationē. Angustia autem
spiritus fit, quum humorum crasso-
rum & uiscidorū multitudo pulmo-
nis bronchijs fuerit impacta, aut tu-
mor abscessui similis in ipsis constite-
rit. 7. de com. per partes.

78 Concoctio tota corrupta, & in
alienam qualitatem conuersa dicitur
cruditas. Cum uerō remittitur appe-
titrix functio, abolita appetentia. Et
ubi excremēta ipsa expellere partes
similares nequent, aut languidē, aut
perperam, hoc est, citius uel tardius,
quā animali expediat. Intestinatorū
uitium dicitur. 3. morb. & accido.

79 Deprauata fit appetentia si ue-
hementiæ modū excedat, uocaturq̃
à nonnullis canina, ubi uel ob acidi
humoris uitium uentriculus mordi-
cus infestatur, uel dum totū corpus
exhaustum assidua nutritione indi-
get. 4. eiusdem.

80 Os uentriculi nonnulli hodie
communiter stomachum nominant,
quam partem olim frequentius car-
dian,

lian, hoc est, cor appellabant. Vnde uox caldialgia est deducta, quæ minime quidem cordis, sed oris uentriculi dolorem & mordicationem significat. Fiunt quippe in ipso tū morsus, tum inexplēbiles fames, tū nauſeosæ dispositiones, in quibus omnibus comuniū attingentium pharmacorum usus iuuentus est, ad mista autem plerisq; ipsorum sunt excaſcientia simul, & resiccantia. 8. de cōp. per partes.

81 Affectio hepatica peculiariter appellata, ueluti cœliaca, stomachicæq; citra tumoris præter naturā circa ipsas partes ortum contingit. Si quidem quum citra manifestum aliud quod in uiscere malum, in actionib; proprijs languescit hepar, tunc ægrū uocant hepaticum. Ibid.

82 Lienosi sunt seu splenetici quibus induratus est lien, sanguine nimirum in uenis ipsius obturato, & ob crassitudinem, nec excerni, nec discuti ualente. 9. eiusdem.

80 Verè dysenterici sunt, quod nul

Gg 2 la alia

la alia infestat affectio præter ulcus
intestinatorum, aut nudum, aut cū pu-
tredine, quod *νομήν* erosionē uocant.
Ibid.

84 Lienteria est frequens cibi non
dum concocti lapsus. Diarrhoia ue-
rò copiosius liquidorum excremen-
torum siue exulceratione, & inflam-
matione fluor. 4. in 1. Epid.

85 Dysenteria intestinatorum ul-
cus est, cuius initio bilis mordax ex-
cernitur, quam deinde interaneorū
abrasiones sequuntur. Postea uerò
paulum cruoris deijci simul uidetur,
quando uidelicet ipse affectus iam
esse dysenteria cēsetur. 6. de locis af-
fectis.

86 Dolor ille acerbissimus quem
ileon, uoluulum & chordapson uo-
cant, sublimiores intestinatorum par-
tes infestat, adeoque ob mordendi
uim impellit ad uomitū, ut nonnulli
stercus per os reddentes, miserrima
tandem morte moriantur. atq; uix a-
liquis unquam euadere potuit. Vbi
autem in huiusmodi affectib. mate-
ria

riæ minimè mordaces existunt. Liē-
terias cœliacas nominant. Intestino-
rum imbecillitate idem quod illi pa-
trentes, quæ retinere contenta ne exi-
guo quidem tempore possunt. Ibid.

87 Vlcera quæ in recto intestino
oriuntur Tinesmos uocant, quæ ue-
hementi quidem tensione, & prom-
pta deijciendi cupiditate infestant,
paucis admodum sequentibus ex-
crementis, quæ quidem ab initio pi-
tuitosa & pingua, progressu uerò tē-
pus etiam ramenti specie deijciunt.
Ibidem.

88 Profluuium urinæ quidā dia-
betem, alij matellæ hydropen, alij di-
psacon uocant, quod ex morbo affe-
cti inexplibili siti uexentur. Quare
& exuberanter bibunt, & totum red-
dunt minimè à qualitate mutatū. Est
autem hic renum uesicęq; affectus, si-
milis uentriculi & intestinorum læ-
nitati, id est, Lienterie. Ibid.

89 Os matricis & collum matri-
cis, idem significat: Dicitur enim ca-
put colli illius os, quemadmodum id

Gg 3 quod

quod propriè os est, dicitur collum,
in 5. Aphorism.

90 Mola est caro quædam infor-
mis, in utero ex tumoribus toto ge-
nere præter naturam existens.

91 Medicamenta Polychrsta di-
cuntur, quæ ad multos usus sunt uti-
lia, ex cōtrarijsq; pharmacis constāt,
non tantū iuxta primas qualitates,
calid. frigid. humid. & siccit. sed etiā
iuxta secundas ex his compositas. 5.
de comp. med. per genera.

92 Medicamenta quæ cutis mea-
tus referūt, ea rarefacientia dicimus,
natura quidem modicè calida mini-
meq; siccantia, & tenuium partium
ut chamemelum, althea. Quæ uerò
uasorum oscula, aperientia, natura,
crassa, acria & mordacia, ut sunt al-
lia, cepæ, fel, &c. libr. 5. de simpl. me-
dic.

93 Quod emplastico contrarium
est, dici queat repurgans & infarctu
liberans: estq; nec uiscidum, nec mor-
dacitatis expers, sed subtile & nitro-
sum, nam in ratione tantum maioris
& mi-

& minoris differunt, tum emplastica ab ijs, quæ sordes nutriunt, tū repurgantia ab extergentibus. Quæ enim poros obstructos referant, subtiliora sunt extergentibus, & emplasticis contraria. 5. de simpl.

94 Emplastica sunt, quæ terrena uiscidaq; substantia minimeq; mordaci prædita, meatibus corporis illiata tenaciter herent. Ibid.

95 Quæ uerè putrefacientia dicuntur, calida simul & humida sunt, colliquareq; possunt, potissimum carnē tenellam absq; dolore auripigmentum (quod arsenicum uocant) chrysocolia, dryopteris, pityocampe acconitum & Sandaracha. Ibid.

96 Nuces regię dictæ, sunt quæ uulgò habentur. Minores uerò & tenuiores sunt, quæ alio nomine Ponticæ, uel auellanæ dicuntur. 2. de alimentis.

97 Panicum uocarunt ueteres melinen, cuius generis est milium. part. 6. de Euchym.

98 Pinguedo humida quædā res
Gg 4 est,

est, oleo longa uetustate incrassato
assimilis. Adeps uerò pinguedine
multò est siccior, ideoq; fusus ac li-
quefactus concrescit facile, 3. de ali-
mentis.

99 Lac cui butyrum est sublatum,
ubi acescit dicitur oxygala. Ibid.

100 Oua diu cocta, dura appellā-
tur, quæ uerò mediocriter tremula
seu mollia, quæ minimum sorbilia,
Ibid. & part. de euchym.

101 Melicratum est mel cum aqua
coctum, alio nomine malsa dictum.
Ibidem.

102 Veteres corruptum dicunt,
quod in aliam substantiam & speciē
mutatum est, ut unum in acetum,
& trabes in cineres, &c,
2. in Timæum.

DE

DE QVIBVSDAM NATVRA
 miraculosis rebus apud
 medicos lectis,

SECTIO XXIII.

I.



Oannitius quidam (inquit Moyses) Hippocratis librum de doloribus mulierum transtulit, exposuit Galenus. Ibi miranda quædam leguntur ex quibus hoc unū est quod credo ab alio quodam postea adiectum fuisse. Quod eclipssi Solis magna in Sicilia facta, mulieres eodem anno monstra duorum capitum pepererint, & mēstrua per os uomuerint.

2 Semen in utero augetur non minus quā in sinu terræ, & quicquid augetur nutritur. part. ultima de significationibus. med.

3 Galenus ægroti cuiusdā cui nō acciderat uti dixerat crisis, cum causam indagasset, & domum frigidiorē deprehendisset, statim ea excalfacta

Gg 5 crisis

crisis per sudorem accidit. part. 6. de
examinatione med.

4 Galenus puerū Marylli cuiusdē
mimographi pectore ad sternon in
palestra percussū, & negligenter a
primo medico usq; ad quartum men-
sem curantū, cum iam ille aperuisset
thoracem, ut pus natum in parte le-
sa tolleretur, nec successisset, aduocatis
omnibus medicis in quib. erat Gal.
ut huic affectui prospicerent, cumq;
ceteri non auderent aggredi ad exci-
dendū ne (ut aiebant) fieret στήθος-
σις perforatio Thoracis. Galenus nu-
dato loco, uidens nil aliud ex sterno
affectum esse, quā quod primum
apparebat os cordis, eo loco in quo
nascitur Pericardij, uelut apex: nudo
corde aperte uiso, quæ iam putrefa-
cta erat pericardij membrana qua te-
gitur, audacter coram omnibus exci-
dit, & puerum paulō pōst sanauit. 7.
Anatom.

5 In Ionia uidimus quendam ado-
lescentem uulnere, in alterum ante-
riorum cerebri uentriculum accepto
fuisse

fuisse superstitem, qui ne minimum quidem temporis potuisset uiuere, si uulnus utrunq; uentriculum simul uiolasset. 8. de us. part.

6 Ego aliquando monitus p quēdam insomnia, secui dextræ manus arteriam, inter indicem & pollicem sectam, permisiq; ut inde flueret sanguis, donec sponte sisteretur subito, quē mihi extinctus est diuturnū dolor, qui in illa parte erat, qua iecur septo transuerso committitur. Et minister Dei Pergami à cruciatu lateris similiter liberatus est, arteria in summa manu monitu diuisa. part. 6. de uenę sectione.

7 Quæ unā cum lotio excernūtur pilis similia, probabilius uisum est mihi, ea in uenis, quam in renum capacitae gigni, idq; ex crassa lentaq; materia, quam calor calfecit, exiccauitq; quemadmodum in quibusdā locis Arabiæ, an ferunt in tibijs nasci *σπασμόν* (sic enim uocant) neruosas partes lumbricis, & colore & crassitudine similia. 6. de locis aff.

8 Præ

8 Præter has, (urinarum scilicet) fiunt etiam aliæ purgationes, sed raro ut cum thorax, & pulmo per alium purgatur, quæ sub septo transuerso sunt partes per urinas. Vidimus etiã nos pulmonis uomicam expurgari per urinam reiecto uidelicet pure de pulmone per leuem arteriam. In sinistrum cordis uentriculum, & à corde per magnum arteriam ad renes, unde postea per urteras ad uesicam delatum est. Ibid.

9 Hepar suillum cum quidam forte ab urbe rediens super herba quadam collocasset, ac dum uentrem exonerabat, dissolutum uidisset esse, ex ea capiens, & ad solutionem uentris utens multos interfecit, qui cū à magistratū captus, & quæ esset, aut ubi cresceret interrogat, nil respondit aliud quàm esse illius magnam copiam ubique. part. 6, de medicamen. purgantib.

10 Abscessus incisi omnimodam speciem humidorum ac solidorū corporum intus habere apparent, uelut
tilu.

tiluti, lapillorum unguium. Pultis in atheromatis, mellis in meliceritidibus, senij in steatomatibus, & non raro etiam animantium omnibus ferè, quæ ex putredine ortum habent simillimarum. part. 6. de tumorib.

11 Accidit nonnunquam ut ex cerebro ad pulmonem humores quidam superflui delabantur, & à pulmone ad testiculos ob uinculum naturæ, quod utrasq; partes spiritus & generationis complectitur. in 1. Epid.

12 Sanguis ex uenis ad cutem pfluens, colorem facit melongianum. 4. in 2. Epid.

Addit Moyses.

Hæc uerba (inquit Rodoan) ostendunt, Gal. hunc colorem cognouisse cuius tamē nusquam alibi meminit. Ego uerò credo Gal. non uidisse, sed nigrum & rubeū scripsisse, quod noster barbarus interpres uerit melongianum.

13 Venæ sectio tremore correptis, hydropicis & huiusmodi nonnunquam præcipuè confert, ubi scilicet ex obstructione

structione

structione uenarum ani, aut matricis sanguis suppressus, ultra consuetudinem autem calorem naturalem plenitudine sua suffocare potest. Ibid.

14 Galenus mulierem ab octo iam mensibus menstrui suppressione patientem & extenuatam, sanguinis missione (uidebat enim uenas eius nigras & planas) primo die ad libram unam, & iterum secundo tantundem & tertio ad uncias octo repetita sanitati restituit. 3. in 6. Epid.

15 Pubescētes & iam sperma mitentes si testiculum dextrum sinistro maiorem habeant, masculos gignūt, sin dextro sinistrum, foeminas. Idēq; in mamillas adolescentium puellarum iudicare licet. 4. in 6. Epid.

16 Pruritas, tussis, sternutatio, singultus, & huiusmodi leues affectiones quiescunt, si spiritus cohibeatur. in 1. de humorib.

17 Qui primū ophtalmiam cōspicit, cum ante nūquam uiderit, humidi ei fiunt oculi, & si intuendo persistat, eandem patitur. Sic qui oscitan
tem

tem aut mingentem, aut cacantem,
aut membra extendentem uidēt, eo-
dem desiderio plerunq; afficiuntur.
part. 6. de motu necessario.

18 Sedentes quidam dormiuerūt
& deambulantes nonnulli, ob mus-
culos membra sua, figura quadam
inter extremā & mediam conseruā-
tes. Id quod mihi olim contigit, qui
fermē stadium integrum dormiendo
peregī. 2. de morb. muscul.

19 Tredecim diebus mentē quen-
dam carētem uidi Romæ, qui Athe-
nis iacere se existimabat: puerumq;
sæpe uocans, iubebat adferre, quæ ad
exercitationem erant opus. Paulūq;
intermittens, statim heus (inquebat)
ad Ptolemæi balneum, uolo enim in
eo aut lauari, surgens deinde & in-
duens se exire uolebat, sed retinen-
tibus, qui ei aderant & febris adhuc
laborare dicentibus, humanissime
respondebat, spire se quidem quod
reliquum adhuc febris sit aliquid,
sed minimum illud esse, & ex balneo
non posse nocere, (tum ad puerum
aliquan-

aliquando conuersus, an nescis inqt) nos heri contendisse Megaris Athenas? Hoc autem agens & dicens. 13. die hemorrhagia ex naribus copiose, & deinde sudore facto conualuit, neq; eorū, quę ante egerat ullius meminit. Ibid.

20 Quod totum opus respirationis uoluntarię, & sponte ab ipsa anima non a nobis fiat, declarauit barbarus ille seruus, qui ex ira & indignatione mortem oppetijt in terram se conijciens & respirationem cohibens. Ibid.

21 Mulier quędam uterū gerens, menstruis fluentibus, primò sanguineis, tum saniosis, abortū passa est. Postridie & cæteris diebus secunda, iam putrefacta purgabatur, & cū totam eiectam crederent obstetrices & reliq; medici, pulsum tetigi, quo etiam superesse aliquid superflui cognoui: id uerò indicaui ut cauerent, quod cum ad decimum sextum diem obseruassent, alterum abortum foetus putrefacti fecit mulier. part. 6. de

6. de examinatione meden.

22 Amicissimā mihi propter philosophiā, & flammationis lectionis studium Arrhiam, stomachi conuulsione grauitē ægrotantē, & ita supinam iacentē, ut ne cibum quidē capere posset, & iam ad atrophiam accederet, peritissimi medici premōstrante me, eam absynthide uīno propinante curarūt, statimq; stomacho ualuit, & appetitionem recepit. part.

6. de theriaca ad Pisonem.

23 Puerum tuum apostasi affectū, cū lentius tanquā bonus pater excludendum curares, & tamen urgeret inuatus humor ulceris, scis quā magna cura liberauit nos applicatum emplastrum, resēcut enim quicquid supra ulcus erat, & pus omne purgauit ad imum. Ibid.

24 Vno aspidum genere prohibent Aegypti Reginam Cleopatram, cū uellet latere custodes, citra suspicionem sibi mortem subito cōsciuisse (nā Augustus Deniceo, Antonio eam capere incolumem studebat, ut

Hh

Ror

Romanis tam insignem mulierem, in triumpho ostenderet: hæc uerò, re intellecta, duas mulieres fidissimas sibi Nairam & Carmionem, quas ad pulchritudinem corporis sui, ut ornarent se habebat, hanc quidem ad ligandos & texandos capillos: illã uerò ad ungues & excrescētias refecandas. Has (inquam) uocatas iussit absconditam uuis & ficubus calatho, aut alio uase sibi uiperam afferri. quã cum in ipsis prius experta esset, brachio ad carnem commorso, ut aiunt, uenenum apposuit & statim concidit. Ibid.

25 Promptissimæ ad occidendum sunt aspides, uidi enim in Magna Alexandria eius ueneni acumen.

Cùm enim ibi damnatum capite hominem subito & immanius occidere uolunt, appposito pectori serpente, & uersari aliquantulũ sinentes hominem citissimè conficiunt. Ibid.

26 Indicauit mihi antiqui cuiusdã liber quòd cum deformis quidam, elegatẽ puerum gignere uellet, for-

mo-

mosum prius puellum, in abaco effinxit, uxoriq; in complexu dixit, ut hunc aspiceret, quæ cū attentissime intuita imaginem, similem edidit infantem. Ibid.

27 Quem hominem non persuadeat fateri, naturam quiddam supra humanum esse, ursæ generatio? Siquidem parit & ipsa similiter cæteris animantibus. Cæterum caro est ipsa, quæ editur informis, & sine articulis, sed post statim ab ipsa, quæ peperit naturali arte efformat. Lingua enim tanquam manu artifice mater ipsa, quod natum est perficit. Ibid.

28 Quidam uiperas intempestiue uenantes, postquam exuerunt pelles, & cum nondum satis sunt ualidæ cicurant plerumq; , & carnibus nutriunt, coguntq; semper mordere aliquid, quo uenenum ex ore amoueant, tum etiam mazam præbent, quo dentium asperitates obturent, & sic minime mordaces reddunt, unde apud ignaros suæ uerutia plerumque admiratione consequunt. Ibid.

Hh 2

29 Quem

29 Quemadmodum cōstat diuū illum Hippoc. per solam alterationē aëris, discussisse olim ab Athenis pestilentem eius constitutionem, nimirum per totam urbem ex aromaticis lignis & suauissimis floribus, uarijs pyris extractis, ut aërem purum hoc modo redditum inspirarēt homines in mali subsidium: simili ratione Theriace ceu ignis existat præsumentes ipsam, pestilenti aëris statu, neutiquā a malis corripī sinit. Ibid.

30 Si animali fœminæ excindas testiculos, neq; libidine comitabitur, neq; marem admittat, sed amittet fœmineam naturam. Quo nomine scro fæ castrantur, fiuntq; sic castratis masculis similes, atq; uberius alimentū accipiunt: pinguioremq; & suauiorē carnem quā reliquæ scrofe habent, quemadmodum & mares maribus est, inde testium ablatio in fœminis periculosior. 1. de semine.

31 Semen concipit mulier sicut & uir in complexu, & in somnis. Ibidem.

32 Ges

32 Genitalis seminis tum excretionem, tum comprehensionem ingens comitatur, & cupiditas, & uoluptas. 4. de morb. & sympt.

33 Glandes quæ dicuntur castaneæ, hominibus iucundæ sunt, aliquandoq; crudę eduntur, aliàs tostæ aut elixæ: At longiores & quærcinæ suis magis quàm hominibus conueniunt, nisi si quando cogunt, ueluti in famæ part. 6. de euchym. & in 2. de alimentis.

Glandes æquè nutriunt atq; frumenta eorum eduliorum pleraq;.

34 Ego noui hominem, qui ex esu paulo liberaliori boletorum (etsi omnium frigorum sunt maximè noxi) in oris uentriculi conuulsionem & grauitatem incidit in stenochoriam, & dyspnœam, & deliquium animi ac frigidum sudorem, ut uix attenuantibus & incidentibus medicamentis, quale est oxymel per se & cum hyssopo & oryano ebullitum, potuerit seruari. 2. de aliment.

34 Notum est, quemadmodum in-

Hh 3 fans

fans priore nutrice mortua, cum altera quæ plena malo succo erat diuturno ex uictu agrestium olerum, famis tempore & uerè ineunte, repletus est ulceribus toto corpore sicuti & nutrix ipsa, & omnes qui huiusmodi uictu uisi erant, atq; id in multis alijs nutricibus, uidimus eodem tempore. 3. de alimentis.

36 Maximam adesse utilitatem intestinis, ad securitatem & iniuriæ propulsionem ex duabus suis tunicis, dysenterici affectus monstrant. Siquidē sæpè & in multis uidimus ob grauem & diuturnum morbum totam interiorem tunicam, ex putredine perisse, & tamen homines illos uiuere, alioqui non uicturos, nisi & altera superfuisset exterior, quæ intestina contineret. 4. de us. part.

37 Quibus Ceratoidis tunicæ pars illa, quæ pupillæ est obiecta, insigniter exulcerata est, aut uulnerata usque adeò, ut uulnus ad interiora pertingat, & magna ex parte obcæcatur. Vidi tamen equidem puerum, cum
iuxta

iuxta pupillam punctus fuisset stylo,
sicut aquosus humor efflueret, ac to-
ta omnino cornea corrugaretur, ui-
sum (incredibile quiddā) recuperasse
instaurato, scilicet paulatim humo-
re, q per uulnus effluxerat. 4. de caus.
& lymp.

38 Cū nuper fuisset quidem i-
ctus a scorpione, uideor mihi (inqt)
percutus esse grandine, eratq omni-
nō frigidus, frigidoq sudore perfu-
sus, quippe exicta parte in subiectas,
mox ex illis in alias eis continuas uis
ueneni spargitur, donec ad principē
aliquam peruenerit, quō tēpore mor-
tis periculum instat. Ad hāc rē con-
ferunt, in primis uincula partibus su-
pernis iniecta, abscissioq partium ue-
nenatarum. Noui equidem rusticū,
qui epoto ē uiperis medicamēto: re-
scissoq prius digito euasit: & alium,
qui sola sectione citra medicamē est
liberatus. 3. de locis aff.

39 Aegritudinem quidē hanc ra-
rō uidimus. Rusticus quidam primū
pus tenue expuere coepit, itaq diu

Hb 4

peusti-

perstitit, aliquanto post putredinem expuit. Post aliquot uerò menses etiam sanguinem, postremò totum ei corpus liquatum est, & ita præ thoracis & pulmonis infirmitate periit. 4. de locis affect.

40 Cùm semel arteriam cuiusdam medici tetigissem, & inæqualem sine febre motum omnem eius sensissem ex angustia & coarctatione uenarum pulmonis, seu ex humorib. crassis glutinosisque, seu ex eiusdem ulcere adhuc cruda uenas illas obstruente esse dicebam, at (inquit) si sic sit, dyspnœa laborem. Cui minime (inquam) necesse, siquidem tunc aspera arteria est obstructio, non in uenis. Ibid.

41 Carnes suum similes humanis existunt. unde quidam, cum à prauis hospitib. essent appositæ, auidissime eas comederunt.

42 Exemplum hoc unum (credo) satis esse debet, ne cuilibet primò occurrenti fidem habeamus. Ipse in quadam urbe uidi cum uasculum mellis plenum uenale proponeret quidam

dam medicis duobus. Ipsiq; statim gustassent, non probato eo quid sit prius, ubi diu de precio egissent, nec conuenissent, abiit ille, hi uerò deinde paulò post interierunt. Ibid.

43 Si nudaueris cor, contuderisq; ipsum atq; depresseris, nec uoce, nec spiratione, nec ulla prorsus uoluntaria actione impediri animal cernes, & si minimè perforaueris concauitatem thoracis, licebit uniuersum ac semel cor ipsum eximere. Id quod in sacrificijs quandoq; cōtingit, ubi animalia cernuntur corde iam aris imposito, non respirare tantum, aut clamare uehementer, sed etiā fugere, quoad profusione sanguinis moriantur, 2. de pl. Hipp & Plat.

44 Cerebrum ossibus si detexeris aut quemcunq; ipsius sinum compresseris, non mutum duntaxat, ac protinus spirationis expers effeceris: sed omnino & sensu, & arbitrarijs actionibus animal priuabis. Ibid.

45 Apud Gallos Scythas & Barbaros ira dominatur rationi, & apud

Hh 5 nos

nos in pueris, & ineruditis hominibus. Si uerò adsit alicui robur & scientia, omninò ratio iræ dominabitur. 3. eiusdem.

46 Appetitoriam uim in hepate delitescere Homerus docet, cum Tityo fingit à uulturibus hepar exedi, quòd Latonam compellasset stupri. Quemadmodum nunc quoque factitant, qui peccantes famulos puniunt: eorum sanè qui fugitiui sunt crura exurentes, scarificantes atque ferientes: eorum qui in furto deprehensi, manus: gulosorum, uentrem: garrientium & mugantium, linguam in summa denique eas particulas plectentes quibus prauas obierunt actiones. 6. eiusdem in finem.

47 Multos ego uidi, & uiros, & mulieres, quibus ualens natura corpus erat, animus autem infirmus & fractus, morbis stupidis, ueluti Apoplexia, paralyti, epilepsia, catalepsi, plerumque laborasse, mulieribus autem matricis suffocatio prius fiebat, tum paralytim patiebantur. At quibus

bus corpus imbecillum, animus uero natura cōstans, fortisq; fuerit, paucos admodū uidere licuit: unius meminī Aristonis Mysij eloquentissimi uiri, cui ex ui eloquēdi corpus tenue colliquatum est. 4. in Timēum.

48 Cicuta celeritate distributionis hominem interficit, sturnos autē tarditate ipsa nutrit. Si autem exiguum quippiam sumatur mortem nunquam inferet, id quod anus illa Atheniensis experimento docuit, quæ ab exigua cicutæ portione auspicata nullo detrimento permagnam edere potuit copiam. Adeo consuetudo uidet̃ esse ascititia natura. 3. de sim.

49 Concoctioni uentris nil æquē conferre nouimus, atq; humanum ei corpus admotum. unde nonnulli tū infantulos, tum catullos, noctu uentri & stomacho apponentes, miram inde utilitatem quietis & concoctionis sentiunt. Familiariora enim sunt & cognatiora huiusmodi naturæ humanæ, quàm quæ per excalfactorios lapides, & similia fiūt. lib. 5. de simpl.

DE

DE QVIBVSDAM LOCIS

sibi contrarijs apud Galenum.

SECTIO XXIII.

I.



Go in his recēsendis (inquit Moyſes) dabo operam, ne quid à medicina alienum adferam, ſicut olim Rhaſis fecit ſophiſticè magis quàm medicè diſputans. Verùm ipſa maximè quæ medicinae uſū, & Galeni intelligentiā pertineant, conabor perſequi: idq̃ breuiter, appoſita contraria cōtrarię ſentētia, ut inde quod uerū eſt, uerè indicantibus liceat colligere.

De hepatis neruo.

Primū igitur ait lib. 4. de uſ. part.

I Minimum quidē neruum hepatis dedit natura, utpote, neq̃ ad motū, neq̃ ad ſenſum futuro ex uſu animalis: quare cū aut non omnino in uiſcum, aut non in totum inſeruit,

Tum in 6. eiſdem. Nullus autem uidetur in cor diſtribui, quemadmodum

dum in hepar, renes, lienemque. Solum namque pericardiam propagines tenuium nervorum recipit à quibus diuisis sensibiles alias ac manifestas, in tunicam ipsius inseri, in maioribus saltem animalibus constat, hæc Galenus. In quibus si hepatis, lienis, ac renum membranis sparsum nervum, ut in corde voluit, non minus in ijs debuit distinguere.

2 In 2. de facultat. natur. Perfecta Cruditas pituitæ acidæ, uel acris intelligenda est, in secunda concoctione, hoc est, in hepate & uenis eius, non in prima, quæ in uentriculo perficitur. Et in 5. de locis affect. Frigida iecinoris intemperantia quod ad ipsum pituitæ suggeritur crudum, semiconcoctum reddit. Spectanda hæc relinquo. Hoc uno adiecto, quod hic perspicuum est crassos succos potius digerî, quàm acidos, ut qui in hepate concoquantur, acidi non omnino.

3 In 3. de caus. puls. quem librum uocat Moyses mag. partem de pulsibus. Quæ pulsui accidunt secundum

dū tēpora, mutationes ad has trēs causas referunt, ad usum, facultatē, & instrumētum. ut medio ferē facultas est robustissima, calor moderatissimus & instrumenta ab omni excessu libera.

Tum in 2. de sanit. Vna mutandi pulsus causa est, naturalis caloris augmentio & diminutio pro anni tempore nutrimento balneo, somno, &c. Altera secundū quantitatem animalis spiritus alteratio pro uolūtario motu. Tertia quæ ex robore uel imbecillitate uirtutis accidit, id est, ex cordis & arteriarum temperamento. Quarta quæ ex instrumenti ipsius malo affectu æstimatur. Hic sunt plures, quā ibi, nisi fortē hæc, quæ superest animalis spiritus affectio, ad superioris diuini usum referatur.

4 In 2. de temperamentis. Quemadmodum aër aut lapis aliquādo pari colore cum aqua esse potest, nullū eo facientē discrimen, quod lapis siccus sit, aqua humida: Sic nimirum caloris æqualitas in pueris, florētibusque

que. Inuenietur etiam si in humida il-
le, hic in sicca substantia representet.
Idē, Duplici ratione cōsumit corpus,
etatis cursu assiduoq; fluore & excre-
mentorū copia: hęc iudicio re linquo.

5 In 7. Methodi. Facillimē quidē
curatu uentriculi alterationes sunt,
quæ ex calido & frigido oriuntur.
Aegriores quę in humido siccoq; ha-
bentur. Et paulò post. At uentri-
culi intemperies humida, utcunque
accidat facillimē omnium curatur.
hoc item relinquo lectorum iudicio.

6 In lib. de Euchym. Lac camelo-
rum præfert asinino. In 5. de sanit. A-
sininum non solum camelino, sed re-
liquis omnibus. Item in illo, ex pede-
stribus (inquit) suilla caro, cibus pro-
batissimus est, deinde hedina, mox
uitulina. Et paulò antè ibidem dixe-
rat. Alica sicut & suilla aliquid glu-
tinosi in se habent, ob idq; in hīs secur
obstruunt, & renes quibus hæc a na-
tura astrictos meatus sortiuntur, ac
proinde distributionem impediunt,
hæc uident quodāmodo contraria.

7 In

7 Incipientes phlegmonas reuul-
 su euacuandas, inueteratas uerò iam
 & induratas, ex ipsis si fieri potest
 particulis affectis, sin minus, ex uici-
 nis Hippocrates & Gal. multis locis
 docuerunt, atq; unum quidem illud
 est medicinæ præceptis maximum &
 usui ualde necessarium. Quo quidē
 præcepto Galen. oculorum & guttu-
 ris dolores, & inflammationes maxi-
 mus uenæ humeralis ē directā sectio-
 ne, aut certē medianæ curari iubet.
 Induratus uerò in gutture quidem,
 uenis quæ sub lingua sunt ambabus
 incisis, in oculis incisa, quæ ad mag-
 num oculi angulum decurtit uena:
 In capite si grauitate aut inueteratis
 iam ex plenitudine doloribus labo-
 rat, ea quæ est in fronte quoque a-
 deo nil non rectē dictum ab illo in
 hac parte est. lib. de uenæ sec. & in 6.
 Aphorism.

At in eadem particula. Quemad-
 modum (inquit) superiores omnes
 hepatis partes, secta in cubito uena
 auuantur, sic eo inferiores ut coxen-
 dix,

dix, uterus, uesica & incisus, quæ per poplites, & malleoles decurrunt uenis, curantur. Tum ibidem sequit̃.

Podagricos euacuabis ex cubito, comitialibus uerò morbus uertiginebusq; obnoxios potius ex cruribus. hic nisi aliquid in traductione operis defecerit, contrarium sibi dicit.

8 In prima parte cōmementariorū, in 1. Epid. Febrē ardentem, ex accensione bilis esse ait, non in quolibet mēbro, sed uētriculo aut stomacho, aut hepatis concauo. In secunda uerò eiusdem ex ipsius humoris putredine, in uenis ijs maximē, quæ hepatis, pulmōni & uentriculo sunt proxima: hoc spectato.

9 In 3. de locis affect. Ex oleribus sola brassica melācholicum succum gignere consuevit, & in 2. de alimentis. Lens & brassica æquali inter se mensura siccant, ob idq; uisum hebetant. At in 7. de simpl. Desiccandi uim (inquit) habet non tātūm admodum acrem. Præterea uulnera glutinat & phlegmones induratas, erysi-

li

pelata

pelata herpetas epinyctidas curat,
ex quibus & habere caliditatē quan-
dam uelle eū uidere est propterea q̃
in hac re sibi contradicere. Potest ta-
men conuenire, si succos inesse hanc
caliditatem dicatur, quo sublato, re-
manet ipsa frigida substantia sola.

10 In 6. parte commentariorum in
2. Epid. Ulcera capitis ex humore ad-
summum ipsum sublato nata ex uici-
nis partibus per uomitum sunt pur-
ganda.

Addit Moyses.

Hic me locus torfit plurimū, &
in eo adhuc hereo, quæ secūdum de-
monstrationem est.

11 In 4. morb. & sympt. Omnis
sensus offensio, a neruo læso prius cō-
tingit. Ergo uisui suffusio & Arge-
mon ex neruo prius læso accidit: ue-
rum in primo eiusdem, non simplici-
ter affici sensum dixerat, sed aliquan-
do ratione instrumenti, aliquādo ue-
rò ratione uirtutis & functionis ipsi-
us, quod hunc locum soluendo sa-
tis est.

12 In

12 In commentario in 2. de uen-
tris & aquis. Ignitis cauterijs non
est aubus, aut pedibus, aut lumbis
utendum. Et in 6. Epid. Exulcera-
to pulmone maturè cauterium in pe-
ctore adhibendum erit, & in 5. Me-
thodi. Ignitis ferramentis necessario
utendum animaduerti, ubi ab erosio-
ne putrescentis alicuius profluuium
sanguis excitatur, ut in pudendis &
sede. Non igitur solum in manibus,
pedibus & lumbus.

13 In 2. de locis affect. Pulsatilis
dolor arterias ipsas primariò afficit,
tum per consensum etià cæteras par-
tes sensibiles, eo quòd à uicinatorum
contactu primantur. Et ibidē. Quin-
etiam sine arteria pulsatilis dolor ue-
hementer inflammationes sequitur.
ut inflammatis intercostalibus mus-
culis, qui morbo. lateralis est, pro ma-
gnitudine inflammationis dolorem
æger sentiet. Vbi cum 4. conditiones
posuerit dolorem pulsatilem phleg-
monem (magnitudinem eius) partē
sensibilem, & arteriam, fieriq; tamen
li 2 dicat

dicat ubi hæc concurrant. in pleuriti-
de tamen fieri dicit in hepate & reni-
bus, qui sine arteria sunt; sed credo
mendosum esse interpretē nostrum
qui addiderit, sine arteria. Nam sic in-
telligo Galenum uoluissē: non ex se
sentire hepar, sed causa membranæ
quæ ipsum ambit.

14 In 1. morb. & sympt. Est unus
morbus cōmunis similaribus iuxta
& dissimilaribus. Nempe unitatis di-
uortium seu continui solutio. Item,
alijs plerisq; locis omnem morborū
causam ad continui solutionem re-
fert, aliās ad intemperiem, ut libr. de
inæq. intemp. Tum 2. de locis affect.
In uniuersum (inquit) primæ doloris
species sunt duæ, una quidem dum
temperies subitò mutatur, altera dū
continuitas soluitur. Atq; hæc eius
optima est diuisio, cui etiā nos assen-
tire æquum est.

15 In Consilio Epileptici pueri.
Fructus & herbas recenset, quas per-
mittit atq; inter eas numerat porrū,
apium, & smyrnium. Paulò pōst uerò
ab

ab ijs uerò abstineat hortor quæcun-
que ob caliditatem caput replent, ui-
ciososq; succos producant, sicut ui-
num, synapi, petroselinum, pastina-
ca, cepa, & smyrnium. Duo hîc me
torquent, quòd idem prohibeat, &
permittat, tum quòd porrum potius
concedit, quàm cepas.

16 Galenus in distinguendis fe-
bribus continuis & intermittētibus,
sicut & continuis ueris, & continen-
tibus rursus uariè affici mihi uisus est
mutareq; subinde sentētiā ita ut in
eius uerbis uariè perplexus adhuc
steterim. Eas igitur adferam intrica-
tiones, ut nos aliquando dubitatio-
ne aliquis liberet.

Primum dicitur in primo de febris
humores in uasis, ac potissimū
maximis putridi continuè fluunt, &
quicquid obuiam ijs est, corrumpūt.

Deinde in 2. eiusdem. Febres inter-
mittentes, quæ nimirum ad integri-
tatem desinunt ortum habent ab hu-
more, qui per omnes corporis partes
suo motu defertur. At in continuis

li 3 hu-

humor delitescit atque continetur in uenis.

Tertio ibidem ad priorem sententiam reuersus ait. Reperies etiam aliam accessionis genitæ causam, præter eam, quam iam diximus.

Rursus in eadē. Excrementa putrefacta per interualla & circuitus eijciuntur, uel expultrice, aut quantitate eorum grauata, aut qualitate puncta. Postea & in accessionum breuiū, & longarum discrimine. Cū primæ accessionis (inquit) tempus adeo breue fuerit, ut antequam superueniat, secunda iam prima quieuerit, omne id tempus spaciū quod secundæ principium, & primæ finem interiacet sine febre est. Si uerò secunda inuadere anticipauerit, priusquam omnino prima soluatur nil interuenit mediū, quò purgari possit febris.

Ex quibus omnibus intelligit̃ primum humorem omne principio corruptum in uenis, & quietem tam diu dari quoad calor præter naturam eius humoris ab inflammato mēbro
ad

ad uicinum transmittitur. Tum ex secundo loco, febrem ad integritatem manifestam desinere, ubi humor extra uenas est corruptus. Ex tertio autem in quo ipsum constat, superfluitatem ab uia in alteram partem transferri, & ibi manere donec, qui sanguis in ea est simul corruptus, accensus, & humiditatem consumpta, ueluti in cinerem redactus est, & inde ab alia accedente superfluitate expellitur. Ex quarto denique continuam febrem esse cum accessio accessioni aggeritur.

17 Quod sequitur, non est locus ambiguus, sed notatio Galeni in Aristotel. agentis. Arguit enim Galenus Aristotelem tanquam ignarum usus testiculorū, quod eos cordi postposuerit, atq; in priori de semine sic agit, cor uiuendi tantum, testes uero bene uiuendi principium existunt. Quanto autem melius est bene uiuere quàm simpliciter & solum uiuere, tanto in animalibus testes sunt corde præstantiores. Sed quæso animad-

li 4 uertite

uertite iudices, nū corde sublato, bene uiuere aliquod animal possit, at testiculis sublati nil minus animal uiuit, quod in tastratis cernit. Taceo igitur ne iam satis notatum ex se hominem, nigriorem liquendo reddā.

18 In 5. morb. & sympt. Apoplexia, epilepsiaq; ex subitanea colluui-
one pituitæ replentis uentriculos cerebri nasci uidentur, proinde horum symptomatū subita est generatio, & discussio, qualis esse per corporū intemperies non posset. Et in 3. de locis affect. Morbus comitialis similiter ut melancholia tribus claudit dominis. Verum omnibus cōmune est, quod afficitur cerebrum siue ex se, siue alio. Prima igitur ante affectus in ipso est cerebro. Secundū per consensum ab ore uentriculi ad cerebrū, sicut per suffusiones contingit.

Tertia rara quidē cum ab alia quadam parte incipiens affectus, sentiente agro ad cerebrum usq; perrepat, quod uidi in adoles. 13. annum agente, qui à crure per femur & lumbos dice-

dicebat ad caput sibi accessisse, aliud autem ueluti frigidam quandam aurem passum esse dicebat, cum interrogaretur quale id esset. Pelopi autem præceptor placebat aut qualitatem aliquam per membra contiuatè diffusum, aut spiritale & uenenosam quādam substantiam. In prima igitur harum est dubitandi locus cum hic dicat, ex ipso cerebro per se, ante uerò ex intemperie ipsius pituita repleti esse dixisset.

19 In 2. de semine. Masculos non solum calidior fœmina, sed etiam siccior à principio existit.

Et in Commentar. in lib. Hipp. de morbo mulierum. Velox augmentum mulierum, eorum caliditatis, superatis est iudicium, quod etiam ex menstruorum singulis mensibus accidentium fluxione intelligitur. Vbi enim sanguinis est copia, maiorem esse calorem oportet. Hæc sunt uerba Galeni, hæc uerò me conturbant, cum uideam solidas mulieris partes esse uiri partibus longè frigidiores ac hu-

li 5 midio;

midiores & uenas uirorem ampliores quam mulierum. Quanquam puto alium ante Galenū hæc uerba introduxisse, qui Hippocratis librum quoque exposuerit. Is uerò quisquis fuerit, Aristoteli contradicit, cuius de hac re sententia est, 18. de animalib. Calore nimio esse præditas fœminas, nec obstare sanguinem menstruū dictum, siquidem is non sanguis uerè est, sed sanguis impurus.

20 Galenus ferè ubicunq; meminit lactis hoc sentit. Ex triplici dissimiliq; substātia constare, serosa, crassa, & pingui. atque ex his camelinum asininumq; serosi humoris plus habere crassi & caseosi ouillum, pinguitudinis seu butyri uaccinum. libr. 3. de aliment. & de euchym. at in lib. de attenuante uict. crassum caseosumq; eidem uaccino tribuit, in quo apparet contradictio.

21 In 3. de aliment. Plurimo sero lactis ad deijciendum aluum utebantur ueteres, cui tamen mellis optimi & salis adijciebant quantum suaue,
& ci-

& citra stomachi subuersionem redderetur. In 10. uerò de simpl. Seru extergendi uim habet, adhibeturq; ad aluum subducendam siue clysmo extergens & abluens, siue mordacitate intestinorū acrimoniam. Ex priore loco patuit acre fuisse, hīc sunt mordacitate esse ait.

22 In 1. de natural. facult. Quęcūque partes duabus tunicis constant, ut uentriculus, stomachus, arteriæ intestina, eorum ipse sunt elementa. Et paulò pōst. Omnes facultates naturæ particulares & alterandi uim habentes, ipsam tunicarum uentriculi intestinorum matricis substantia sic perfecerunt qualis cernitur. In 3. uerò eiusdem. Si quod uelox unica tunica instrumentum constat ueluti ambę uesicæ uterus & uena, utrunque fibrarum genus obtinet, rectarum & transuersarum. Credo culpa traductoris hoc esse factum. Si uerò dicas, interiorem esse quidem uesicę uel uteri, superiorem uerò continens membri, ergo continens illud tribus

bus erit tunicis præditum. Non igitur rectè docetur duas tantū habere.

23 In 1. morb. & sympt. Qui affectus primò cedunt operationem, ij sunt, & uerè dicuntur morbi. At operationis oblesio, passio aut symptoma non morbi appellanda. Et 3. eiusdem. Morbi sunt qui primo ledunt actiones. Symptoma uerò morbum ueluti umbra sequitur, ut phlegmonem febris. In 1. uerò ad Glauconē. Quæ (inquit) ex humorum putredine accenduntur febres, & dicuntur putridæ, & sunt non morborū symptomata, sed ipsi morbi. Ergo contraria habet nomina febris.

24 In 2. de aliment. Cydoniorum corticem calidum & acrem esse dicit, ob idq; cōuenire ijs, qui cruditate laborent. In 7. de simpl. temperatum, aut paulò à temperamento remotū, in quo priorem uirtutem diminuit.

25 In ultimo de simpl. ubi de melle agit. Cūm flauæ bilis genera introduxit Prasīnam, seu porraceam, non nisi grauissimis affectibus eñci ait.

ait. Tum paulò post, omnes species
eijci dicit. plerunq; uerò etiã uomitu
sine prauo quodam affectu.

26 In 16. de us. part. Nullum pro-
priè cuti esse inditum neruum, sed q;
sentiat à particule subiectæ neruo es-
se, quò tanquam instrumento ad sen-
sum utitur. In ultimo uerò de locis
affect. Medicos ignorare in cute ma-
ius produci neruum quo sentitur, in
eaq; radicem habere. Crediderim pri-
ori sententiæ, siquidem sensum cutis
eius lèdi motu integro cõtingere po-
test. cuius causa est non neruus mus-
culi subiecti, sed eius quædam parti-
culæ & rami in cutem distributi.

27 In 1. de morb. & sympt. Humo-
res inter se ferè commisceri, & simpli-
cem reperiri, cùm alijs non mixtam
nequaquam posse. In 2. eiusdem.
Singulos interdum puros & synce-
ros, interdum inuicem mixtos solere
in partem imbecilliozem confluere,
ob idq; tumores partium uariari.

28 In lib de atra bile. Excrementa
nigra sæpius euomi & educi salubri-
ter se

ter se reperisse. Atra bilis autem exa-
cta humorem semper ad perniciem
excerni. Eandem uerò in 4. Aphor.
Plerumq̃ salutem portendere maxi-
mè ubi natura conuicerit. Ego prio-
rem ut ueram accipio. Posteriores
non possum, nisi de excrementis ni-
gris dicatur.

29 In 2. de temper. Succorum op-
timum ac maximum familiarem esse
sanguinem. Huius ueluti fecem & se-
dimentum, atram bilem: quæ idcirco
frigidior & crassior sanguinis est sicut
ti flaua bilis longè calidior, frigidissi-
mum ac humidissimum omnium, quæ
in animali sunt, Pituitam, instrumen-
tum quo id cognoscatur, ipsum esse
factum. In 2. sympt. & morb. Cor-
pora interdum à solis qualitatibus al-
terari, quandoq̃ etiam illis acceden-
te aliquo affluxu. Humido quidē spe-
cie facultate uerò non item. Flauam
siquidem bilem potestate calidam et
siccam, atram siccam & frigidam, san-
guinem calidum & humidum. Pitui-
tamq̃ frigidam & humidam esse, ibi
factu

tactu ipso & actu, hic potestate repugnant.

30 In lib. Hipp. de humana natura, Ver esse temperatum se dixisse, in lib. de temper. Hippocratem tamē recte dicere esse calidum & humidum, quod confirmavit in comment. Hippoc. de aquis & uentis.

31 In 7. Methodi. Vbi ægrum qui ab alijs medicis iam adeo siccatus erat, ut simillimum Marasmodibus. i. senili ariditate macescentibus habitum referret. (Rhoris enim succū bibere cogebant, & absynthium asparagus, bulbos arnacos, extrinsecus imponebant.) hunc mos (inquit) sanauimus omni ratione humectātes. Tum paulò post. In eo meatus contractos, dilatari ac quod in uicinas particulas est cōpulsum, reuelli: præterea singulas similarium partiū propria humiditate humectantis nutrimenti opus, repleti curauimus. Is enim in ea contrarietate, quæ in frigido & calido consistit, nullā euidenter uincētem habebat intemperie

nes

nec in uniuerso corpore, nec in uentriculo Priori loco omnis madoris expertem fecerat, iam temperatum reddit. Ergo contraria dicit imparē.

32 In primo de pulsib. Inæqualē fieri pulsum ob grauem aliquam noxam: & in 13. eiusdem. Pulsum inæqualem imparē, inæqualitatis causam esse incertam morbi mutationē. Transmitti enim uel in partem ignobiliorē, & tunc salutem esse, uel in principem & mortem sequi, ex quo incertum tunc esse pulsum constat: Ibi magnam noxam, hic neq̃ a commodum, neq̃ incommodum significari ait.

33 In lib. de temporib. morbo. Vbi quatuor ea recensuit, initiū, augmentum, statum & inclinationem. Accidunt & graues quædam affectiones, ut apoplexia & epilepsia, quorū principium & augmentum uix sunt sensu perceptibilia. In primo uerò de Crisib. Ex statu cuiusq̃ morbi, iudicare oportet ipsius tempora, quæ febris ardēs pleuritis, peripneumonia breue

breue principium habent. Epilepsia
uerò arthritidis mulierum dolores &
nephritis longum. Non potest intel-
ligi de causa generationis epilepsiae,
cum in statu causa non incipiat. qua-
re aut error est in exemplari, aut con-
trarium sibi dicit.

34 In 4. de simpl. Ferro lapidique
ignito ea purgantia medicamenta,
quæ per erosionem interimunt, simi-
lia omnes, quæ à corporis nimirum ca-
lore huc perducuntur, ueluti chalci-
tides, misij, fori arsenicū, lithargiron,
hydrargyron & similia. Crassarum e-
nim partium id genus omnia, & po-
testate calida esse, uentremque exulce-
rare & exurere non aliter, quàm fer-
rum aut lapidem ignitum. In nono
uerò, interimatque adeuoratum, aut
extrinsecus admotum nondum fe-
cisse se periculum. Cur igitur in quar-
to gradu exurere dicat peto.

35 In 11. Methodi. Venam statim
in principio sectam non in acutis tã-
tum, sed putridis etiam febribus sum-
mum esse remediū, nisi cruditas sub-

Kk sic

fit & ætas, aut aliquid aliud obfit, in particula tamen de uenę sectione, in quartana pura phibet, nisi sit ex sanguine superante. quod ita interpretor, si humor nō simplex, sed cūm alia sit corruptus, ueluti phlegma, uel melācholiā cum sanguine, uenam tuto secari, si uerō pituita aut atrabilis sola sit putrefacta, non tutō posse.

36 In 6. de simpl. Vrticas flatuofum quiddam exhibere, dū coquuntur, quo extimulant uenerē, & maxime cum semen ex musto bibitur, tum statim & partes quas flatu suo affici, inflari contingere, ubi concocta est. Non enim actu, sed potestate inflare, iuxta id, quod alibi dictū est. Nullum medicamē frigidum aut calidum actu dicitur, sed potestate.

37 In 3. de locis affect. In affectu hemycranij, si ex spirituum repletionē est, agrum tensionem partium patī, cum ex humorum replenitudine, præter tensionem sentire etiam grauedinem. At in parte de uenę sectione dixerat. Signum repletionis spirituum

tiuum, & uirtutum esse corygam seu grauedinem. uasorum uerò intensiōnem, in quo sic suspiror, quod signū dixit in lib. de uenæ sectione, sine dolore membrorum debere intelligi utranq; repletionem. In locis affectis uerò cum dolore cuiusdam membri, cuiusmodi est hemycrania in capite, non enim sola repleto est humorum, sed humorum uitiosorum.

38 In 5. Methodi. Vbi uas aliquod in pulmone rumpitur citraq; dolorē confertum sanguis feruens, florendus multusq; cum tussi expuitur. In uiscere uulnus esse significari, propterea iniungendum laborāti, ut nec respiret uehementer, ac semper silentium agat, & tum uenam cubiti internam incidendam. At in primo de humoribus affectum hominem, pulmonis uel pectoris, uel œsophagi, uel asperæ arteriæ ulcere, quanq; non clamare, nec inspirare permittit, tamen motum manuum & pedum mediocrem præcipit.

39 In 8. de simpl. Psyllium semen
Kk 2 habet

habere admodum utile ex secundo ordine refrigerantium. In desiccando uero & humectando quodammodo symmetrum. In 2. uero ad Glauconem. Herpetes quidem qui exedentes sunt, refrigerari desiderare, ut alijs herpetes & erysipelata, non tam ferrē medicamenta, quæ simul refrigerēt, qualia sunt lactuca, polygonum lenticulæ, eleia lotum uel nympha aqua, Psyllium, Portulaca & eius Aëzoon, &c. Hic igitur Psylli est frigidum & humidum prorsus. Ibi uero temperatum humidum & siccum.

40 In 13. Methodi, de liene & hepate. Similia genere medicamentorum & nutrimenta ambo uiscera postulant. Cæterum tantò ualentiora & acriora lien, quanto crassiore utitur alimento. In 4. de usu partium. Nutrit (inquit) Pulmo ex purissimo sanguine, flauo subtili & spirituofo, tantumquam delato à corde, Splenis autem corpus, quum tãto rarius hepate sit, quantò est crassius pulmone, merito ex tenuiori sanguine nutritur.

E

Et paulo post. In summa hepar ex
 rubicundo & crasso splen ex subtili,
 & nigro, Pulmo ex elaborato ad un-
 guem ac puro, alimentum capit ex
 his contrarijs de splenis cibo senten-
 tijs posteriorem eligimus ut ueriorē.
 cæterum in priori, potest dici nutri-
 menti uocem largè sumptam esse, ut
 uulgò usurpatur, quo non & sicla, &
 panis sunt etiam eorum nutrimentū.
 sicquē crassiori lien quam hepar nu-
 trietur.

De Lingua Græca.

41 Sophiste hodie nos multas di-
 scere linguas uolunt, cæterum barba-
 rissimas, cū tamen præstaret ipsos
 doceri unicam græcam adeo ornatā
 & cultam, præterea omnibus com-
 munem, & humiditatis plenā. Qua-
 quidem imbuti si fuissent, nunquā
 omnia prima genera pulsuum, quali-
 tates existere credidissent. Hæc & a-
 lia Gal. de præstantia linguæ Græcæ
 retulit in 2. li. de differentijs pulsuum,
 ubi præ cæteris colendam hominib.
 esse cupit.

Kk 3 Pch

Pthilis & alij quidam contra uoluerunt omnes æquo honore, & præcio linguas esse, nec referre, si ab ignavis earum quædam uituperentur. Ego certè Galeni sententiã non reñcio credo ueriores pro climatum & incolarum modo ac proportionem instrumentorum uocis linguarum & laryngum, Deum cuius suauem aut asperam linguam dedisse. Cum uerò Græci in oïum climate temperatissimo & humano generi familiarissimo medio ferè mûdi habitat, mollissimam quoque & temperatissimam eis linguam fuisse datam, sicque de cæteris pro climatis & instrumentorum mediocritate. Quod si in hos & durissimam aliquando quædam audiantur, non ex uitio naturæ loci, sed ex cõmigratione alienarum & remotissimarum à medio climate gentium, id euenire existimetur.

Moyse.

De Pthiano sui amore Græcè φιλαυτίας. Notum est ex libris Philosophicis & ex alijs, quemadmodum animæ mor-

morbi sunt, & affectionem nō aliter
quā corporis, tanto q̄ ipse grauior
res quanto potior est anima corpo-
re. Inter ceteros autē, una præcipuē
grauibus uiris, & qui in quadam arte
excellere uidentur, qui tales existima-
ri cupiunt ipsi Philautia, hoc est, ni-
mia superba & insolens ac se se opi-
nio plurimum accidi. Qua, qui labo-
rant, si qua in arte præponi, & existi-
mari præ alijs si senserint, non solum
in hac uinci ab alijs nulla de re uolūt,
sed etiam in alijs quas ignorant, si
quid absurdum dicunt, uerū non
esse fateri uerentur, unde aut in earū
statim condemnationē feruntur, aut
in sua hæresi manere potius habent,
quam errorem fateri. Hoc morbo la-
borasse grauitè inter ceteros Gale-
nus uidetur, qui ut in medicinæ arte
excelluit, eiusq̄ partem præcipuē a-
natomicam & sphynicam plurimū
exornauit, in ceteris scientiæ parti-
bus tantundem putauit se ualere, at-
que hac opinione elatus plurimū au-
sus, & multis locis Aristotelē & cate

ros philosophos notare tanq̃ igna-
 ros in ijsq̃ maximè, quibus ipsi excel-
 luerint Physica, Logica, & Metaphy-
 sica, & librum suū de Probatione o-
 mnibus Aristotelis præponere, nec
 modo Philosophos, sed summos om-
 nium hominum doctores Moysem
 & Christum attingere conatus est, q̃
 quæ nimia fuit imbecillitatis & sui
 amoris, non inutile puto, referre in
 quibus repræhendit Moysem, ut po-
 stea mea tanquam sequestri proposi-
 ta sententia, uideatur potissimum
 credere nos conueniat, Prophetæ &
 legislatori maximo: an uerò homini
 medico, & digno quo alios afficit,
 conuicio. Sic igitur in 11. & ul. par-
 tium arrepta ex pilorum palpebræ &
 supercilij perpetuò eadem magnitu-
 dine, rixandi occasionē quærit. Vtrū
 igitur præcepit his pilis opifex no-
 ster ut æquale semper magnitudinē
 seruarent? Si uerò mandatum obser-
 uantes, & præceptorem reuerentes
 Deum, aut certè ipsi per se melius sic
 esse credentes, hanc seruent magnitu-
 dinem

dinē, quam iussi sunt. An uerò Moy-
ses quidem sic de natura disputabat
& melius quàm Epicurus. Voluit e-
nim principium generationis esse o-
pificem mundi Deum, & hanc illum
ex materia primū fecisse. Propterea-
que uoluisse hos pilos eandem semp
seruare magnitudinem, quæ sicerat
melius. Postea uerò quam eiusmodi
facere pilos constituit Deus, his qui-
dem durum corpus subiecit, illis au-
tem cutem duram cartilagini per su-
periora connexam. Non enim sat e-
rat uoluisse tantum tales esse, siquidē
ne si lapidem repentē uelit facere ho-
minem, id possit atq; illud est, in quo
opinio nostra & Platonis, & omniū
Græcorum à Moyse dissidet. Huic e-
nim satis est, quod uelit Deus orna-
re materiam, statim enim perficitur.
Omnia uerò ipse facere Deum posse
arbitratur, etiam si ex cineribus equū
aut bouem facere uelit. Nos autem
affirmamus quædā esse, quæ neque-
at facere natura, eaq; Deū ne aggre-
di quidem omninō, sed ex his, quæ fa-

Kk 5 cere

cere potest, quod melius est, eligere. Etenim quum pilos in palpebris satius esset æquales semper esse magnitudine & numero, non ipsum. Id quidem uoluisse affirmamus, illos autem mox factos fuisse (neq; enim id potuisset) sed contendimus potius eos etiam si millies uoluisset, nunquam tamen tales futuros, si ex cute molli producti fuissent quum nec recti quidem stare possent, nisi in duro fixi essent. Hęc igitur duo tribuimus Deo, eligendi eius quod melius est uoluntatem in ijs, quæ facienda sunt, & materiæ electionem. Quod si substantiæ cuiuspiam molli & carnosæ pilos eos infixisset, non Moyse modo, uerum etiam aliquo malo duce uideretur, ineptior, qui murum in palude, aut uallum iaceret. Sed quoniam oportuit eos rectos stare in chondrum, & cartilagineam cutem infixit.

Hactenus Galenus. Præclare uerò philosophatus est, qui totam potentiam Deo non tribuit, sed illi metiri nititur potentiæ suæ metas. quasi me dico

dico homini. Medicamini cuiusdam regulam præscribat, non credit igitur Moyſi Deum omnia poſſe, nondum enim ſatis uiderat ſupra ea, quæ fieri non poſſunt Deum eſſe, nec ſi uelit equum ex cinere creare, unquã poſſe quod eodem pertinet. Eligere autem fatetur quod in quaquẽ re ſit optimum, & ex eo opus facere eſt id quidem aliquid, ſed in eo non ſunt omnia. Moyſes quidã Deum uidiffe ait quęcunquẽ fecerat, & omnia uiſa eſſe illi optimẽ cõſtituta, nec inutile quicquam inter illa reſeciſſe: Sed à principio quoquẽ creaffe cœlum & terrã, & omnia quæ in eis ſunt ex nihilo, idquẽ iam antẽ propoſuiſſet, quod non credit Galenus nec Plato, & hinc omnis eorum naſcitur error, ſed putãt Deũ cum mundo ſurrexiſſe quemadmodum dies cum ſole, umbra cum corpore, & febris cum calore oritur. Motũ uerò credunt eſſe æternũ ſecundũ corruptionẽ. Et in his rebus nil eorũ, quæ impoſſibilia appellant fieri, ueluti uirgam, in ſerpentem aquam, in ſanguĩ-

sanguinem mutari & similia. Pluviā & serenitatem Deum pro suo uelle non mutare posse, sed hoc ex aëris & aque dispositione fieri secundum naturam, ex quo dat nullam relinquūt uoluntatem propriam.

Cui Moyses omnia tribuit, & ex ea inuentionem primæ materiæ, dispositionem planetarum & elementorū formam, cuiq; datam esse credit, * Erroris igitur illorū causam esse credo huius principij ignorantiam mūdum esse recēs ita creatum à Deo & Deum quando mundum fuisse. quō ignorato multa ab eo extra medicinæ materiam ineptè & falso disputata sunt contra Moysen cui nos assentire, & credere perpetuò uolum⁹. * in summa illorum omnis philosophia his duobus consistit. Deum nil uelle fieri, quod sit impossibile in natura, hoc est, Deum stupendas res miraculosas ultra quam natura soleant fieri, nunquam facere uelle nec posse si uelit, ut ex ligno, uel ex lapide, uel ex osse, uel ex nihilo nasci, aut plā tam,

tam, aut hominem, seu contra ex homine, & carne facere lapidem & statuam subito, quale quid accidit in uxore Loth. Credimus id non ut Galenus. non posse fieri, quæ non sit ex his, quæ fieri possint, sed ut Moyses omnino ita esse, quæ Deus uoluit & quæ potest quicquid uult. Alterum eorum est dogma Deum, quæ nouit omnia quæ sunt bona, inter ea quæ fieri possunt semper, quod melius est eligere, & hac ratione pilos in palpebris non ex carne omnino, quæ non erat bonum ut promissius creuissent, & impedissent uisum, neq; ex ossibus, quæ fieri non poterat, etiamsi uoluisset non magis, quam ex lapide triticum non fit, sed ex chartilaginea pelle oriri, quæ id poterat fieri, & erat melius. Rursus de fide hominibus habenda, hoc monere libet nemini quolibet perito, uero aut bono quicquam tale esse continuo credendum, quale dicit se uidisse aut expertum esse, siue is sit solus, siue multi idem affirment, antequam diligenter id

ter id ex quisiſſeris. Idēq; præſertim ubi
 rixari aduerſus aliū uides: tum enim
 multa etiam falſo multi dicunt, quæ
 aliter habere ſciunt. Galenus igitur
 aduerſus Ariſtotelem ubiq; conten-
 dit, tres eſſe principes animalis par-
 tes: primas, quarum nulla ab alia aut
 uim, aut robur ſuum accipiat. Cere-
 brum, cor & hepar. Ariſtoteles uerò
 eo eſſe fontem à quo cætera membra
 motum & uirtutem hauriant, non ſo-
 lum uenter, caput, tibiæ, ſed etiam ce-
 rebrum, hepar, pulmo, &c. Iam ue-
 rò alij quidam ante me pro Ariſtote-
 le ſententiam tulerunt aduerſus Ga-
 lenum, imaginationis, memoriæ, mo-
 tus ſenſusq; principium unicum eſſe
 cerebrum, & non cor aſſerentem.
 In 2. de placit. Hipp. & Plat. adeoq;
 id exemplo ſacrarum uictimarū eti-
 am corde exenterato fugientium ac
 uocem edentium confirmant.


Cui planē in 5. de locis aff. Ipſe con-
 tradixerat, Vbi rectē aſſeruerat non
 poſſe fieri, quin pateretur cor ipſum,
 ubi mors accederet, & intemperiem
 cate-

ceterarum partiū non continuo mor-
tem sequi, sed organicarum, ex quib-
us præcipuum est cor, quæ si uera
sunt omnia, cui credemus: ad primū
igitur quod attinet, animalia uicti-
marum etiam sublato corde, currere
& boare, nec cadere, nisi effuso toto
sanguine, si simpliciter intelligendū
est, ergo & uenis cōstrictis, & sup-
presso sanguine poterūt etiam uiuere si-
ne corde. Ac non est ita, imò ex cor-
de affecto moriuntur. Quod uerò eo
remoto, etiam moueantur & sentiāt
inde est, quia perpetuo motu uirtus
à corde ad caput & cæteras partes
transmittitur, ibiq; aliquandiu uiget,
dum alia subijciatur quod si non sub-
ijciatur, tum deficiente illa etiam pars
moriatur, & cadit animal: quemadmo-
dū in fontibus riuulis uidetur. Quā-
diu scaturigo fluit, etiam riuulus no-
ua aqua alluitur & uiuit: at ea obtura-
ta aliquandiu post remanet in riuu-
lo quidem aqua, sed paulatim nō af-
fluente, alia exiccatur & perit.

F I N I S.

IO. D. A.

IO. DAMASCENI APHORISMI

ad filium.

Eus arceat te (fili amantissime) à uia erroris, & in uia salutis ac uirtutis conseruet, meumq; in te desiderium, & tuum in me obsequium dignetur perficere. Aphorismos tibi scribere quos petieras à me non alia de causa distuli, q̃ ut animi tui in me & eorum studium tentarem uoluntatem, eos uerò quoniam hanc ego iam satis cognitā habeo, tibi mitto. Cæterum hanc nostram moram, si forte iam cœpisti, desine fastidire. Siquidem maiores nostros sæpe impatientes arguisse nosti, & nostram in te beneuolentiā & studium præ omnibus iam præsentire potuisti. Vale. Deus te item conseruet & animum tuum ad seruorū suorum utilitatem pro diuina uoluntate sua instituat.

Accipe fili, primū amplissimos
esse

esse, medicinæ campos, & in ijs tantum ex libris non etiam ex indagaci, & diligēti industria ac sedulitate uersari, plus molestiæ quam utilitatis adferre. Indagax autem ingenium & sedulitatem plurimum iuuare artem. Et ueterum doctorum lectionem ac secretorum cognitionem augere scientiam.

2 Vita breuis, eorum autem quæ e terra gignuntur omnium cognitio longissima. Tu quæ in his palam sunt, quæque in dubitationem non ueniunt, & quæ probatis maximè teneto, cætera seu controuersa, seu incerta relinquito, neque te etiam sapientum huiusmodi dicta conturbent.

3 Qui luxuriæ & uoluptatibus dediti sunt medicinæque & philosophiæ, & cæterorum artium fundamenta negligunt, ijs non est habenda fides, in his maximè quibus Aristot. & Gal. consentiunt. Nam in quibus dissentiant difficilis est ueri ratio.

4 Humana natura non potest non deperdere aliquid medicaminis, præ-

LI

sertim

sertim attenuantibus.

5 Animal ex frigido & humido nutrit: at ex calido & humido uſuit.

6 Virtutes naturales & ſpirituales una eademq; uirtus eſt: ſed pro uarijs ſubiectionum partium officijs, uaria ſortitur nomina.

7 Temperamentum naturæ re ipſa ſeparari non poteſt à ſubiectione, at deriuari poteſt. Sicuti ab auis & parētibz quædam uicia & animi, & corporis in filios deriuantur, & maximè morbus diuturnus ſi in principie quadam parte conſtiterit.

8 Medicamen temperamento corpori uicinum & amicum ſi ſimul odore eſt, nutrimentum quoque optimum & familiariffimum erit.

9 Corpus & anima ita à natura cōparata ſunt, ut nō niſi iuncta hic ſubſiſtant. quo cauendum eſt ne medicamen ualentius detur, quod poſſit ſe iungere.

10 Temperies corporis figuram & tēperiem nerui ſequitur, quare in propinādo medicamento fugere oportet

portet quod eam dissoluat.

11 Id tibi primū curandum, ut naturam iuues & reficias, hac enim neglecta, nil profeceris si deficere sinas. Quare medicamen stringens & odorum, temperamento corpori proximum reficiendis partibus principibus prodest.

12 Hepar & uenter in numero sunt eorum, quæ naturæ fouendæ ac nutriendæ sunt præcipue idonea, quocirca his læsis, naturæ etiam cursus minuitur.

13 Calidi morbi sunt frigidis læthaliores propter ignei motus uehementiam.

14 Si quid corpori acciderit non est dandum quod principibus partibus noceat, hoc modo enim parum proderis.

15 Vitia animi sequuntur corporis temperamentum, cum igitur corpus offendetur, præcipue si partibus illis principibus, medicamenta animæ propria dare memineris: utpote quibus recreetur, uisu, auditu, gustu,

Ll 2 &c. hge

&c. hæc enim bona medicamento-
rum pars censetur.

16 Medicamenta, eaquæ maximè, quæ
summo capiti sunt profutura sub som-
num sunt propinanda, ut natura in-
terioribus tantum intenta, facilius in-
ipsa purget. Item quæ morbo iam ue-
hementer aucto præcipuarum parti-
um, adhibentur. partis temperamen-
to quàm fieri potest maximè similia
esse oportet, aut certè, quæ eam nutri
re possint.

17 Medicamenta contraria cōtra-
rijs depellendis adhibenda idonea,
non temperamento semper. eadem.

18 Gracilibus exhaustis, & sicca-
tis, nequæ medicamenta, nequæ nutrimē-
ta danda sunt, nisi quantum & qualia
ferre natura possit.

19 Medicamenta tibi sunt certa
& pauca usurpanda, eaquæ quibus ma-
ximè usu fidere possis. Nam si uolue-
ris multa assequi, multiplici sensuum
uarietate eò uenies, ut nulli confide-
re tutò possis.

20 Varia est rerum natura & quali-
tas,

tas, quidam enim earum uī affici cre-
diderunt, quod natura per se effice-
bat: quare uidendum est semper, ut
hanc maximē sequaris.

21 Natura hyeme & uere plus hu-
morum intra corpus colligit, quā
aestate nec autumno. Quare ijs tem-
poribus medendum pro ratione na-
ture semper erit.

22 Morbi frequentia in principib.
partibus, corporis dissolutionē prae-
nunciat. Quare sic affectos calfacere
& naturam sustinere, quā maximē
oportet potius quā solutione uen-
tris aut uomitu uti. Neutrum enim si-
ne detrimēto adhiberi potest. Quod
si solui humores patiuntur, soluantur
quidem, sed fluxio ad principes par-
tes uitetur.

23 Tumorem innatum ex morbo
conualescentibus expellere semper
curato, ne si intrò compellas partes
principes afficiat.

24 Sanguinem pro climatum de-
trahere oportet, quinto quidem &
sexto plus, primo uero 2. 3. quarto,

L1 3

aut

aut septimo minus.

25 Cibaria conualescentibus etiā contraria permittendū, sed prius qualitatē noxiam minuere oportebit.

26 Spem promittere ægroto, etiā si desperes de curatione. Affectio. n. animi sperantis naturam ut plurimū iuuat.

27 Medici indocti, & adolescentes luxui dediti, ut plurimum homicidæ.

28 Aegrotum sciscitari nō solūm, quæ extra accidunt, sed quæ int'a puerdere non oportet. Urina enim ubi morbus intra uenas existit, ut plurimum fallit.

29 Aegroto in memoriam reuocare, quæ antè morbis cupere noueris, aut in quibus delectari sit solitus adducere, multum aliquando profuit, quare hæc diligenter tibi sunt inquirenda.

30 Paralyticos multum iuuat, adolescens puella lateribus apposita, caloris naturalis causa.

31 Ex duobus medicamentis æquali

qualibus, semper quod leuius est eligendum.

32 Medicamenta temperamento naturali ægrotantis proxima esse cōueniūt, ne si fortē sint uehemētiora, ea deſiciant naturam potius, q̃ iuuent.

33 Antequam purges, mouendi sunt humores & resoluendi, aut medicamento cum bario, aut cibo medicamentoso. Tum ieiunis medicamē purgans propinandum.

34 Theriaca resoluendis humoribus est aptissima, sed pueris, siccatis, & senibus minus præbendam, quàm cæteris.

35 Morbi acuti minus in iuuenibus, quàm senibus metuendi. Illi enim nutrimenta citiùs in similitudinē uertunt. Si uerò ob defectum caloris acumen morbi ferre non possunt.

36 Labori & exercitio assuetos minus offendunt dolores morborum: siquidem labor, & exercitium ipsum quidā dolores sunt, quos nisi superet morbus qui accidit, non grauius afficiuntur.

37 Conuulsio epileptica, iis adole-
scentibus, qui in 1. 2. 3. & quarto cli-
matibus habitant, ferè fit ex calorìs na-
turalis & temperamenti inopia. Vnde
eorum curatio est per calida & tē-
perata.

38 Purgationi capitis cerebri aut
sensuum, pilulæ maiores sub somnū
post cœnam adhibentur.

39 Principibus corporis partibus
siccatis aut ex natura imbecilib. nō
sunt medicamenta in summo gradu
purgantia, sed moderatè calida & hu-
mida adhibenda.

40 Humidiōri uentriculo, tenuē
puluerem damus ut confirmetur.

41 Clystere purgamus eos, qui ex
siccatis aut defectis principibus par-
tibus laborant.

42 Omne purgans medicamentū
necessariò choleram flauam mouet.
Propterea quadragenaria atq; senio-
rum purgationi nil tale ad miscendū
erit.

43 Simplicia inter se mixta, faciūt
in corpore singula pro uirib. suis of-
ficium,

ficiū, & musculos atq; carnem pro se singula gignunt.

44 Infirmum nitendum est primū in priorem statum reducere, non continuo in exactum & perfectum temperamentum.

45 Singulis morbis si cum sibi medicamen commodum ex ingenio, & industria excogitare, id uerò ad artis medicæ perfectionem accedit.

46 Nihil eorū quæ sub lunari globo sunt posita ad eundem, quo principio fuerit natum, statum reuerti potest. Corpus enim humanum in perpetuò fluore est.

47 Omnis febris ex calore præter naturam est, sed pro materia differunt ægritudines. Quapropter ei, qui ex flaua bile febricitat, uehementia, qui uero ex atra, remissiora & lentiora adhibenda sunt medicamenta.

48 Membrum semel uel morbo, uel casu quodam læsum, nunquā ad priorem naturam, seu constitutionē reducetur.

49 Filiū, parentum morbum, maxi

LI 5 me

mē diuturnum & imbecillitatē membrorum præcipiorum hæreditant: quanquam minus uehementem, præcipuē ubi alter parētum fuerit sanus.

50 Nulli medicorum citò habenda est fides, nisi sit & ætate, & experientia multa probatus.

51 Vrina morbi diuturni, urinæ hominis sani similis, si eadem qualitate permanferit, restitutionem sanitatis non prænunciat.

52 Medicum mediocriter habere se oportet, ita ut nec mundum spernat prorsus, nec omninò sequantur.

53 Mulier in dextra matrice concipiens rarò foeminas pariet.

54 Si medicamen catharticum seu purgans uterum gerenti præbebitur, principes infantis partes perpetuò debiles erunt.

55 Verna aëris mutatio si ex humido in siccum fiat, gignuntur æstate proxima pustulæ, febres, Phrenitides & abscessus, nullo medicamento purganti curabiles.

56 Quemadmodum ex humorū pleniz

plenitudine fiunt morbi, ita & ex inanitione, atq; inopia, id uerò sepe medicos fallit.

57 Mutatio stellarum in longitudinem aut latitudinem, nec uitia, nec consuetudines mutat:

58 Naturæ hominum, temperamenturæ, cibi, medicamenta & uitia, pro interstitio regionū differunt: adeo ut quæ in una, secūdo gradu sint calida, in alia, ad quartam gradum ascendant.

59 Emplastra atq; unguenta qualitati & temperaturæ, membrorum quibus applicantur, uicina quàm maximè potest fieri debent.

60 Atram bilem in pueris ualido medicamento purgari non cōuenit. Vasa enim in ijs adhuc sunt parua & uires imbecillæ.

61 Sola diætā medicari si potest, à potione abstinendū est. Hic enim tutius & melius erit.

62 Vomitus aut uentris solutionem, post diuturnam intermissione erumpentem, ne subito restringito.

63 Hæ

63 Habitus & uapores duo sunt, cum ferè unum esse tātū credant.

64 Cuius urinam non prænoueris sani, uix ægroto commodum parabis medicamentum.

65 Delirantibus ex frigiditate & siccitate cerebro inuectis, tumum, oderem calidum & humidum, subministramus, intus forasq̃. Nonnunq̃ uerò etiam ad iram excitamus, ut inde calefiat corpus.

66 Qui uenam secare quadragenarij quater in anno consueuerunt, quinquagenarij ter, & sexagenarij semel. Postea uerò, ne semel quidem debent.

67 Senes à quadragésimo anno Cephalicam, à quinquagesimo medianam, à sexagesimo basilicam incidere desinant.

68 Iuuenes sectioni uenæ assuefacti, si frigido sint temperamēto, post sexagesimum in frigidam & siccam naturam abeunt.

69 Vires uegetant membra, & uicissim mēbra uires, his enim constantibus

tibus illa quoque constabunt.

70 Qui à iuuenibus parentibus nati sunt semper bene constituta membra habent, contra uerò à senibus & imbellibus iudicandum.

71 Qui aromata & odores abhorrent, corruptioni sunt proximi.

72 Quibus regionibus ex uento nubes fiunt, in his ferè coryzæ & grauedines gignuntur sæpius.

73 Muscæ numero abundantes, putridos morbos prænunciant.

74 Ieiunium æstate corpus exiccatur, colorem flauum inducit, melancholiam gignit, & uisum offendit.

75 Quibus inualidæ sunt uires, principes quoque partes morbosæ, & iniurijs quibuslibet obnoxia.

76 Regionum uarietas, solis recessus, temporum mutatio uaria quoque corporum temperamenta faciunt: ut Aegyptijs, quæ bis hyemen & æstatem habent fructuum copia est, memoriam & ingenij subtilitas &c.

Conclusio.

Accipe igitur (fili charissime) quos petie-

petieras Aphorismos. atq; ex his fideliter & cum iudicio non temere discito mederi. In his enim paulò sudavi amplius, ut tutò ijs credi posset, quòd ad alios quoq; pertinere existimabam. Veritatem uerò te præ omnibus diligere credo, quod te facere semper cupio, atq; etiam si dignū est oro. Congratulor profectò tibi de translatione tua in Galeni artem Medicam qui liber, omne medici opus continet: gratiasq; Deo Opt. Maximo ago, quod te tanti authoris æquum traductorem esse uoluerit. Vale.


*Finis Aphorismorum Ioan.
Damasceni.*

B A S I L E A E,
EX OFFICINA HENRICI
PETRINA, Anno Salutis,
M. D. LXXIX.
Mense Martio.

11

per huius
in unum
noster
redire
necesse
est
ut
dignetur
de
no
bis
dicere
in
honor
e

12



Allegre p. 28d

m

3